

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







18949 e. 303





CAROLI LIB. BAR. DE GEER

REGIAE AVLAE MARESCH, R. ORD. WASIACI COMMEND, CRYCIG. R. ORD. DE STELLA BOR. EQVIT. AVRAT. R. ACAD. SCIENT. SVEG. MEMBR. ET PARISINAE CORRESPOND.

GENERA

E T

SPECIES INSECTORVM

E

GENEROSISSIMI AVCTORIS SCRIPTIS

FXTRAXIT, DIGESSIT, LATINE QUOAD PARTEM REDDIDIT, ET TERMINOLOGIAM INSECTORVM LINNEANAM ADDID1T

ANDERS IAHAN RETZIVS -

PHIL. MAG. PROF. REG. ET BOTAN. DEMONSTR.
SOCIET. PHYSIOGR. LVND. SECRET. SOC. REG. PATR. SVEC. ET HASSO-HOMB. MED. HAFN. NAT. CVBIOS. BEROL. ET SCIENT. AC ELEG. LITT. GOTH.
MEMBR. SOC. OECON. LIPS.

CORRESPOND.

LIPSJAE,

APVD SIEG'FRIED LEBRECHT CRVSIVM,

MDCCLXXXIII.



B. L.

Excellentissimum Opus Illustrissimi de Geer multi noscunt pauci possident. Ordines Ejus a perpaucis forte naturales judicantur, Genera a pluribus; Specierum autem descriptio et historia omnibus Entomologis acceptissima. In observandis et describendis Insectis Reaumurium Gallorum illud lumen primo quidem imitatus est, dein vero mul-

multum superavit. Hinc tanta inter primum et sequentes tomos differentia. Dolendum est a b. Authore, matura nimis morte praevento, Additamenta et Correctiones in ordinem redacta non suisse, de editione enim nova Primi Tomi et Supplementorum serio cogitabat; sed dignum, qui ad Nestoreos vixisset annos, nimis cito desideravimus virum.

Quem in proprium usum conferipsi Catalogum Systematicum, vidi demum etiam aliis utilem fore; non vero illis tantum, quibus copia sit ipsius Operis De Geeriani, sed iis quoque, quibus illud sibi comparare non contigerit. Quamvis enim ipfa Generum ordinatio a Linneana methodo abscedat, quamvis denique nomina specifica ab Illustrissimo Auctore adhibita secundum rigorem Systematicorum non sint concinnata et trivialia saepissime mutata; egregie tamen ejus definitiones ad Insectorum cognitionem conducere judicavi, inprimis si cum definitionibus Linneanis conferantur.

Qui forte errores in citatione nominum III. a Linné a b. Auctore commissi sint, lubentissime emendatos voluissem; sed quoniam Insectorum collectione, ad hoc prosequendum sufficiente, destitutus sum: parcissimus in his sui, ne consusomem

nem augerem, quam evitare studebam.

Nomina Ordinum et Specierum trivialia ab Ill. Auctore Gallice tantum data, qua potui fide latine reddidi. Exoticas species indigenis immiscui. Si vero in his coordinandis nonnunquam erraverim, id factum esse sine inspectione subjectorum oculari scias velim.

Laborem itaque pro scopo et aeque judices quaeso. Vale.

R.

i. Lepidoptera. G. 1 — 5. 2, Elinguia. G. 6 mnoptera. 3. Neuroptera. G. 8---13. 4. Hymenoptera. 6. Denmaptera. 7. Hemiptera. G. 8. Coleoptera.G. 70 - 81. 10. Proboscidez, G. 82. 2. Apte-

- Ord. T. ALATA alis instruuntur.
 - 2. APTERA alis destituuntur.

Subordo i. GYMNOPTERA Alae IV.

- 2. VAGINATA Alae II. Thecae II.
- 3. DIPTERA Alae II. Thecae o.
- 4. SALTATORIA Alae o. Larvae
 Pupaeque statum trans agunt.
- 5. Gressoria Alae o. Sine metamorphofi ex ovo prodeunt.
- Classis 1. LEPIDOPTERA Alae IV. farinosae.
 Rostrum spirale.
 - Arum o. Dentes o.

Classis

- Classis 3. NEVROPTERA Alae IV. nudae, aequales, reticulatae. Os dentatum.
 - 4. HYMENOPTERA Alae IV. nudae, inaequales, nervis longitudinalibus plerumque. Os dentatum. Anus armatus aculeo plerisque.
 - 5. SIPHONATA Alae IV. membranaceae. Rostrum sub pectore flexum.
 - 6. DERMAPTERA Vaginae II. semicoriaceae et semimembranaceae cruciato-complicatae. Alae II. membranaceae. Rostrum sub pectore sexum.
 - 7. HEMIPTERA Vaginae II. coriaceae aliformes. Alae II. membranaceae.
 Os dentatum.
 - 8. COLEOPTERA Vaginae II. durae, crustaceae. Alae II. membrana-ceae. Os dentatum vel maxillossum,
 - 9. HALTERATA Alae II. membranaceae. Halteres II. Os edentulum proboscide instructum.

A 3 Classis

Classis 10. PROBOSCIDEA Mas, Alae II. membranaceae. Halteres nulli. Dentes nulli, nec Rostrum.

Foemina aptera, sub pectore rostrata.

- II. SVCTORIA Alae o. Pedes VI. Os proboscideum. E nympha Imago.
- 12. AVCENATA Alae o. Pedes VI.
 Caput a Thorace distinctum.
- 13. ATRACHELIA Alae o. Pedes VI. vel plures. Caput thoraci adnatum.
- 14. CRVSTACEA Alae o. Pedes XIV. et ultra. Caput a thorace distin-

GENERA.

J. PAPILIO. Papillon.

Anteunae clauatae. Alae quiescentis erectae.

Fam. 1. Ped. 6. ambulatorii. Alae inferiores ventris latera tegentes, vt abdomen occultetur.

- 2. Ped. 6. ambul. Alae infer. dorff latera tegentes, vt venter appareat.
- 3. Ped. 6. ambul. Alae versus posteriora inclinatae.
- 4. Ped 4. ambul. 2. spurii villosi, penduli.
- 5. Ped. 4. ambul. 2. spurii oecultati.

2. SPHINX. Papillon-Bourdon.

Ant. clauatae vel prismaticae medio craffiores. Alas horizontales abdomen non tegentes.

Fam. 1. Ant. clauatae. Anus crassus, barbatus. Lingua spiralis.

- 2. Ant. prismaticae. Ante acuminatus. Lingua spiralis.
- 3. Ant. prismaticae. Anus acuminatus. Rostrum breve.

A 4

3. AD-



2. Adscita. Popilion Phalene.

Ast. clauatae. Alse subcestexae, invicem in-

4. PTEROPHORYS. Phaiene-Tipule.
Ant. fliformes. Ause fifiae.

S. PHALAENA. Phalene.

Ant. letaceae. Asse deflexae vel horizontales.

Fam. 1. Ant. pectinatae. Rojiran o. vel breve.

Sectio I. Alae horizontales.

2. Alae semitectae.

3. Alse deflexae. Derfus laeve.

4. Alae deflexae. Dorsum cristatum.

Fam. 2. Ant. pectinatae. Lingua spiralis. Sectio s. Alae deflexae postice dentatae l. sinuatae.

2. Alne deflexae postice integrae.

3. Alse horizontales postice dentatae l, sinuatae.

4. Alae horizontales postice integrae.

5. Alae horizontales: inferiores medio postice acuminatae.

Fam. 3. Ant. feliformes, breves. Lingua o. Fam. 4. Ant. fetaceae, longae. Lingua o. Fam. 5. Ant. fetaceae. Lingua fpiralis.

Sectio 1. Alae superiores horizontales l. deflexae supra dorsum invicem incumbentes. Inferiores pli-

catiles,

2. Alac deflexae. Dorsum laeve.

3. Alae deflexae. Dorsum crifta-

Sectio

Sectio 4. Alae horizontaliter extensae L. patentes.

Art. 1. Alae mediocres, minus exacte horizontales.

- 2. Alae majores, horizontales.
- 5. Alne convolutae.
- 6. Alse rhombeae.
- 7. Alae pendentes.
- 8. Alae lanceolatae, compressae, postice elevatae simbriatae.

6. PHRYGANEA. Frigane.

Ant. setacea thorace longiores. Os edentulum, palpis 4. Alae deslexae, inferiores plicatiles. Stemmata 3. Tars artic. 5.

Fam. 1. Ant. longitudine circiter alarum.
2. Ant. longiores alis.

7. EPHEMERA. Ephemere.

Ant. breves. Os fine dentibus, lingua, palpis. Alae erectae, inferiores minores. Stemm. 2. 3. Cauda fetosa. Tarsi artic. 5. Fam. 1. cauda triseta.

2. cauda biseta.

8. LIBELLVLA. Demoiselle.

Ant. breves. Os maxillis 4. Alae extensae, aequales. Stemm. 3. Tarfi artic. 3. Cauda foliolis terminata.

Fam. 1. Caput grande fere sphaericum,
Alae horizontales.

a. Caput grande, sed breve. Alae erectae.

9. H K-

9. HEMEROBIVS. Hemerobe.

Ant. filiformis thorace longiores. Or dentâtum, palpis 4. Aim deflexae, aequales. inferiores non plicatae.

10. MYRMELEON. Fourmilion.

Ant. clavatae. Os dentatum. Palpi 4. Alae deflexae, aequales, inferiores non plicătae. Scemm. o. Tarsi artic. 5.

11. PERLA. Fauffe-Frigane.

Ant. setaceae thorace longiores. Of dentibus et palpis. Alae aequales, horizontales, invicem incumbentes. Stemm. 3. Tarsi artic. 3.

Fam. 1. cauda simplici. 2. cauda biseta.

12. PANORPA. Mouche-Scorpion.


Ant. filiformes thorace longiores. Caput productum in rostrum cylindricum apice dentibus ac palpis instructum. Aiae aequales, horizontales. Stemm. 3. Tarsi articul. 5. Cauda maris chelata.

13. RAPHIDIA. Raphidie.

Ant. filiformes. Os dentibus et palpis 4. Thorax longus, angultus, cylindricus. Alas deflexae, acquales. Stemm. 3. Tarfi 4. artic. Cauda foeminae feta recurua.

14. APIS. Abeille.

Ant. fractae: articulo primo longo. Os dentibus et rostro slexili fracto sursumque plicato. Alae planae. Abdumen thoraci petiolo brevi adnexum. Aculeus punctorius in abdo-



abdomine reconditus. Oculi reticulati, ovales, integri.

15. NOMADA Proabeille. Apis-ichneumon.

Ant. clavatae, vel filiformes àrticulis 12. Os dentibus et rostro porrecto, vagina cartilaginea cylindrica. Alae planae. Abdemen petiolatum. Aculeus punctorius in abdomine reconditus. Oculi reticulati, ovales, uniti.

16. VESPA. Guespe.

Ant. fractae articulo primo elongato. Os dentibus et proboscide retractili membranacea. Alae longitudinaliter plicatae. Abdennen petiolatum. Aculeus punctorius in abdomine reconditus. Ocult reticulati, lunati.

17. SPHEX. Guespe-ichneumon.

Ant. fractae vel filiformes artic. 12. Os dentibus, elingue. Alde planae. Abdomen petiolatum. Aculeus punctorius reconditus. Ocule reticulati, ovales, integri. Fam. 1. Ant. fractae, clavatae.

. 2. Ant. filiformes.

18. CHRYSIS. Guespe-Dorde.

Ant. fractae, filiformes, articulis 12. primo longiore. Os dentatum, elingue. Alae planae. Abdomen subtus fornicatum. Anus, plerisque dentatus. Aculeus vaginatus reconditus.

19. SIREX. Ichneumon-Bourdon.

Ant. filiformes articulis pluribus. Os dentatum. Alae fubfornicatae. Abdomen sefsile, los en enun **Acuer entens igua**, Veguie buntari exceptus.

20 Int a la sur Care Tempenmen.

- As, ve server renous dimens, we de verse ve emolae. O nemane. Le pense automates. Assure renous total Americ existent vague bilding ex-
 - Fan. 1. Am. feranceae. Adda. cylindricum.
 - 2 Am. letaceae. Absing infineme.
 - 5. - Incom
 - ultumo giodalo.
 - 5. . thoraci if
 - 6. Ans. furiormes.
 - 7. fractae, clavatae.
 - 8. ramoiae.
 - 9. Foeminge apterae. MVIIIIa Line:

21. CYNIFE. Cenips.

Any, filiformes : longae : articulis 13 — 14.

Os Gentatum, elingue. Alae horizontales.

Abdom fabovale, compressum, subtus carinatum. breviter periolatum. Acutes


Spiralis in abdomine intra vaginam bivalvem reconditus. Larvae Gallarum.

22 TENTEVELO. Mouche-à-Scie.

Ant variae. Os dentatum, elingue. Alee subfornicarae, 'tumidae Linn.) inconditae. Abdom. sessie. Acuteus laminis duabus serrates sub abdomine.

Faus. 1. Antennis capitatis.

Fam.



Fam. 2. Antennis triarticulatis clavatis.

- 3. novemarticulatis filiformibus.
- 4. Antennis pectinatis.
- 5. fetaceis, articulis 9. plubus.

23. FORMICA. Fourmi.

Ant. fractae, artic. 1. longiore. Os dentatum.

Alae horizontales maris et foeminae, spadonis nullae. Abdomen petiolatum.

Fam. 1. Squama verticalis in petiolo abdominis.

2. Sqnama nulla. Petiolus ex articulis globofis.

24. THRIPS. Trips.

Ant. filiformes longitudine thoracis. Rostrum fub capite. Alae lineares, horizontales, fimbriatae. Corpus elongatum, subcylindricum, Tarsi vesiculis terminati.

25. Aphis. Puceron.

Ant. thorace longiores. Rostrum subtus recurvatum. Alae erectae vel nullae. Pedes ambulatorii. Abdomen postice cornibus vel tuberculis 2, Tarsorum articulus 1. Fam. 1. abdomen corniculatum.

2. - tuberculatum.

26. CHERMES. Faux-Puceron.

Ant. thorace longiores. Rostrum sub pectore.

Alae deflexae. Pedes saltatorii. Caput tub
berculis 2. conicis terminatum. Tarsi artic. 2.

27. CICADA. Cigale.

Am. thorace breviores filo terminatae. Rofrum sub pectore inflexum. Alae deflexae et fornicatae: inferiores saepe plicatae: superiores saepe coriaceae et coloratae. Pedes saltatoris. Tarsi artic. 3.

Fam. 1. Caput in formam roffri elongatum.

- 2. Thorax magnus, compressus, elevatus.
- 9. Therax utrinque cornutus.

 inermis. Alae deflexae, membranaceae omnes. Stemmata 3.

 Thorax inermis. Alae deflexae, fuperiores coloratae et femicartilagineae. Stemmata 2.

28. CIMEX. Punaise.

Aut. thorace longiores. Rostrum sub pestore recurvatum. Hemelypera 2. plana, cruciato-complicata. Alae 2. membranaceae. Tarsi artic. 3.

Fam. 1. Antenn. siliform. articulis 5.

- 2. - 4
- g. fetaceae, acuminatae, rofrum curvatum capite vix longius.
- 4. Antenn. setaceae, acuminatae, roftrum longum rectum capitis et thoracis iongitudine.
- 5. corpus depressum, planum.
- 6. angustum, elongatum fere cylindricum.
- 7. elyptris coadunatis.

29. NEPA. Punaise d'eau.

Ass. capite breviores, sub oculis. Rossrum sub thorace slexum. Hemelyera 2. cruciato-complicata. Atae 2. membranaceae. Pedes anteriores saepe chelati et posteriores saepe natatorii. Tarsi artic. 1. 2.

Fam. 1. Ped. anter. cheliformes. Neps.

2. - fimplices. Notone-

30. MANTIS. Mants.

Ant. setaceae. Os dentibus palpisque. Can put declinatum. Thorax elongatus, angustus. Pedes antici a reliquis remoti: omnes ambulatorii. Alae horizontales. Tarsi artic. 5.

- 31. Locysta. Sauterelle. Gryllus Tettigonia Linn.
 Ant. setaceae corpore plerumque longiores.
 Os dentibus palpisque. Caput verticale.
 Hemelytra deflexa. Alae plicatae. Cauda
 ensidera foeminis. Ped. saltatorii. Tarsi
 artic. 4.
- 32. ACRYDIVM. Criquet. Gryllus Locusta Linn.

 Ant. filiformes corpore breviores. Os dentibus palpisque. Caput verticale. Hemetyera deflexa. Alae plicatae. Cauda simplex. Pedes saltatorii. Tarsi artic. 3.
- 33. GRYLLYS. Grillon. Gryllus Acheta Linn.

 Ant. setaceae corpore longiores. Os dentibus palpisque. Caput rotundatum. Hemelystra horizontalia. Aiae plicatae, hemelytris postice longiores. Cauda setis 2. Pedes laltatorii plerisque. Tarsi artic. 3.

34. BLAT-

24. BLATTA. Blatte.

Aut. setaceae, longae. Os dentibus palpisque. Caput sub thorace plano marginato inclinatum. Hemelytra horizontalia. Alae plicatae. Cornicula 2. articulata caudae. Pedes cursorii. Tarsi artic. 5.

3. FORFICVLA. Perce-Oreille.

Ant. filiformes. Os dentibus palpisque. Elytra dimidiata alas occultantia. Forceps mobilis caudae. Tarfi artic. 3.

*. Tarfi omnes articulis 5.

36. STAPHYLINVS. Stapbylin.

Ant. filiformes. Elytra dimidiata alas occultantia. Cauda exferens 2. vesiculas oblongas.

37. LAMPYRIS. Lampyre.

Ant. filiformes. Thorax planus, femiorbiculatus, margine caput occultans. Elytra flexilia. Abdominis latera papillofa.

38. TELEPHORYS: Telephore. Cambaris Linn.

Ant. filiformes. Thorax planus, marginatus.

Caput exfertum. Elytra flexilia. Abduninis latera papillofa.

39. COLLIVRIS. Colliure.

Ant. filiformes. Caput conicum, postice attenuatum. Oculi magni, nitidi. Thoraw longus, angustus, cylindricus.

40. CARABVS. Carabe.

Ant. filiformes: articulis subconicis. Thorax utrinque truncatus, lateribus marginatus, medio convexus. Abdom. ovale, convexum.

xum. Elytra marginata. Appendix femorum posticorum. Fam. 1. apteri alis nullis sub elytris.

2. alati.

I. CICINDELA. Cicindele.

Ant. filiformes. Caput magnum, thorace rotundato submarginato latius. Oculi magni, nitidi. Dentes magni, porrecti, intus serrati. Appendix semorum posticorum major.

L. BYPRESTIS. Bupreste.

Ant. ferratae longitudine thoracis. Capitis dimidium thoraci intrusum. Corpus elongatum. Non salit.

Fam. 1. Elytra serrata.

2. - integra.

ELATER. Taupin.

Ant. filiformes, dentatae. Corpus elongatum, acuminatum. Thorax postice mucronibus binis angulatis terminatus. Dorso impositus exfilit.

L SILPHA. Bouclier.

Ant. extrorium craffiores, plerumque truncatae vel perfoliatae. Thorax planiusculus, marginatus, caput non tegens. Elytra marginata, replicata.

DERMESTES. Dermeste.

Ant. clavatae: clava articulis 3, perfoliata vel truncata. Thorax convexus elytraque non marginata. Tibiae inermes. Fam. 2. alati.
***. Tarsi omnes articulis 4.

58. CERAMBYX. Capricorne.

Ant. setaceae articulis conicis. Oculi lunulati, circa basin antennarum. Elyara sublinearia.

Fam. 1. Thorax planius culus, marginato-dentatus.

2. Thorax subcylindricus, non marginatus spinosus.

3. Thorax fubcylindricus, non marginatus inermis.

4. Thorax orbicularis, planiusculus, inermis.

59. LEPTVRA. Lepture.

Ant. filiformes ante oculos. Oculi integri.
Thorax elytris angustior, inprimis antice.
Elytra fastigiata.

Fam. 1. thorace spinoso.

inermi.

60. NECYDALIS. Necydale.

Ant. filiformes. Elytra alis minora, breviora vel angustiora. Oculi lunati, circa basin antennarum. Abdom. elongatum.


Fam. 1. Elytris dimidiatis.

2. ,- postice angustatis.

61. CLERVS. Clairon.

'Ant. moniliformes extus crassiores. Thorax convexus postice attenuatus, Caput declinatum. Corpus elongatum.

62. CAS-



62. CASSIDA. Casside.

Ant. clavato-incrassatae. Caput sub clypeo marginato occultatum. Elytra marginata, abdomine majora.

63. Irs. Ips.

Ant, fractae, clavate capitatae. Caput globofum, parum deflexum. Thorax magnus,
cylindricus, gibbus. Abdom. cylindricum. Tibiae dentatae,

64. CVRCVLIO. Charanson.

Ant. capitatae in capitis rostro elongato.

Fam. 1. longirostris antennis fractis, femoribus dentatis.

2. brevirostris antennis fractis, femoribus dentatis.

3. longirostris antennis fractis, femoribus muticis,

4. brevirostris antennis fractis, femoribus muticis.

5. longirostris antennis strictis. .

6. brevirostris - -

7. femoribus posticis crassis saltatoriis.

65. BRYCHYS, Bruche.

Am. sensim incrassatae, articulo vltimo rotundato. Caput productum in rostrum breve depressum apice rotundatum. Oculi lunati. Thorax marginatus. Elytra abdomine breviora, apice rotundata.

66. ANTHRIBUS. Antribe.

Ant. clavatae vel incrassatae articulis tribus; capiti impositae. Thorax largus, marginatus.

Antipe. 67. ANTIPVS.

Ant. serratae. Caput magnum, maxillis por Thorax largus, parum convexus, rectis. elevato-marginatus. Corpus fubeylindri-Pedes anteriores longiores.

8. CHRYSOMELA. Chryfomele.

Aut. moniliformes, extrorium craftiores, corpore breviores. Thoracis latera margi-Abdom. cvale, plus minus elonnata. gatum.

Fam. 1. cerpore ovali, thorace largo.

- cylindrico, thorace gibba caput excipiente.
- 3. corpore elongato, therace angusto fubcylindrico.
- 4. Sattatoriae, femoribus posticis incraffatis.

****. Tarsi omnes articulis 3.

69. Coccinelle. Coccinelle.

Ant. clavatae: clava compressa truncata. Palpi clava triangula. Corpus hemisphaericum fubtus planum. Therax et Elytra marginata, Fam. 1. Elyeris rubris l. flavis, maculis nigris.

- 2. Elytris rubris I. flavis, maculis albis.
- 3. Elytris nigris, albo-flavo-l. rubromaculatis.

70. Mysga. Mouche.

Ant, aristatae. Probestis labiis carnosse, Fam. 1. Anteun, filo fimplici, corpore pilofo.

Fam. 2

- Fam. 2. Amena. filo barbato, corpore pilofo.
 - 3. Antena. filo fimplici, corpore villoso.
 - 4. Antenn. filo barbato, corpore villoso.

71. STRATIOMYS. Strations.

١

Ant. cylindricae, fractae, articulis 3. Proboscis labiis carnosis. Scutellum spinis duris. Alae invicem incumbentes.

72 NEMOTERVS, Nemotele.

Ant. cylindricae vel moniliformes, articulis 3, capite breviores. Prohofis labita carnofis.

Fam. 1. Ant. articulo 3, filo terminatae.

- 2. nullo,
- 3. ftylo rigido termi-
- 4. Ant. clavatis aristatis.

B. TABANYS. TAON.

Ant. longitudine capitis, articulis 3. ultimo demum articulato. Probofiis labiis carnosis, aculeis compressis lanceolatis parallelis, testa palpis 2. magnis. Asae sub-extensae. Farsorum articulus vitimus tripenicillatus.

Fam. 1. Ant. lunatis, articulo ultimo articulis 4 confiante.

2. Ant. rectis, articulo ultimo articulis 4 pluribus.

74. ASILVS. Afille.

Ane. cylindricae, fractae, articula tertio ultimo longiore comprello rotundato. Ro-B 4 frum frum elongatum, rigidum, corneum, porrectum.

Fam. 1. Ant. non ariftatis.

z. - aristatis.

75. EMPIS. Empis.

Ant. longitudine capitis, articulis 3. conicis.

Rostrum longum, rigidum, corneum, perpendiculare vel nutans.

....

76. Conors. Conops.

Ant. capite longiores, basi approximatae, articulis 3. ultimo conico, hamato. Rosserum fractum, angustum, rigidum, palpis nullis. Abdomen clavatum.

77. BOMBYLIVS. Bombille.

Ant. longitudine capitis, fractae, articulo tertio vltimo crassiore elongato. Rostrum longum, setaceum, porrectum, bivalve: valvulis horizontalibus intra quas aculei setacei. Abdomen breve, crassum. Alae subextensae.

78. HIPPOBOSCA. Hippobosque.


Ant. brevissimae, setaceae, basi tuberosa. Rostrum setaceum, vagina bivalvi.

79. OESTRVS. Oestre.

Ant. subglobosae, 3. articulatae, aristatae. Rofirum nullum. Paipi nulli.

30. CVLEX. Coufin.

Ant. filiformes, pilofae, plumatae. Rostrum vagina flexilis aculeis fetaceis. Abdomen elongatum cylindricum.



81. TIPVLA. Tipule.

Ant. setaceae l. filiformes, villosae, plumosae, pectinatae etc. Rostrum porrectum labiis terminatum, palpisque duobus longis articulatis recurvatis. Abdomen elongatum, cylindricum.

Fam. 1. Ant. setaceis l. filiformibus, saepe plumosis in maribus.

- 2. Ant. pectinatis.
- 3. nodosis.
- 4. incrassatis, brevibus, subulatis.

32. Coccvs. Gallinfelle.

Foemina aptera, rostro inter pedes anteriores.

Mas exdens, elinguis, alis 2. et filis 2. setaceis caudae.

Fam. 1. Foem. gallae similis, cute aequali.
2. - insecto similis, cute annu-, lata.

83. PVLEX. Puce.

Pedes 6; postici longi, saltatorii. Oculi 2.
Proboscis brevis, recurva. Ant. filiformes.
Annuli ventris cute cartilaginea tecti.

84. LEPISMA. Forbicine.

Pedes 6. Oculi 2. compositi. Palpi 4. Ant. setaceae. Gauda filis 3. Corpus squamis tectum.

85. PODVRA. Podure.

Pedes 6. Oculi 2. compositi ex 8. Ant. filiformes. Cauda bifurcata sub abdomine inflexa, faltatrix.

B 5 Fam. 1.

94. ASTACVS. Ecrevisse.

Pedes 10. quorum anticum par chelatum. Ant. fetaceae longae. Oculi 2. pedunculati, mobiles. Palpi 2. articulati. Thorax cylindrico-convexus. Cauda extenía, terminata laminis foliaceis.

Fam, t, therace laevi l, inermi.

- z. spinoso l. muricato.
- 3. Parasitici in testis inhabitantes.

95 CANCER. Crabe.

Pedes 10. (rarius 8.) quorum anticum par chelatum. Ant. fetaceae broves. Oculi 2. pedunculati, mobiles. Palpi 2. articulati. Thorax latus, planiusculus. Cauda triangula 1. ovata, recurvata et corpori appressa.

Fam. 1, thorax laevis margine integro.

- a. dentato.
- 3. fupra spinosus,

96. Manocytys. Monocle.

Pedes ramosi, natatorii. Brachia 2. articulata, ramosa. Corpus testa bivalvi conchiformi. Oculi capitis congesti, unicum mentientes. Cauda surcata plerisque.

Fam. 1. Brachiis ramosis extra testam.

- 2. intra testam,
- 3. simplicibus extra testam.

 Couda furcata exserta.
- 4. Cauda simplici resta ad apicem corporis, exserta.

97. SQVILLA. Squille.

Pedes 14, primum par chelis adactylis. Ant. 4. fetaceae. Cauda nulla vel laminis foliaceis sub cauda.

98. ONISCYS. Cloporte.

Pedes 14. Oculi 2. reticulati. Ant, 2. filiformes, fractae. Corpus ovatum, articulatum.

99. SCOLOPENDRA. Scolopendre.

Corpus depressum, articulatum. Pedes numerosi totidem utrinque quot segmenta corporis. Ant. setaceae, Oculi plures, distincti, hemisphaerici. Dentes 2, curvati. Palpi 2. articulati sub capite.

ioo. Ivrvs. Jule.

5 .50

Corpus cylindricum, articulatum. Pedes numerosi, segmentis utrinque duplo plures.

Ant. filiformes, breves. Oculi 2. reticulati. Dentes 2.

SPECIES.

E. PAPILIO.

Fam. 1.

- 1. P. canicularis, alis angularibus citrinis, macula rotunda aurantiaca notatis. T. 1. p. 132. t. 15. f. 1—9. T. 2. p. 182.
- P. Rhamni. Linné Syst. Nat. ed. 12. p. 765.
- 2. P. nigro nervojus, albus, nervis alarum nigris.
 T. 1. p. 235. t. 14. f. 13 19. T. 2. p. 182.
 P. Cratacci. I. S. N. 2. 772
- P. Crataegi. L. S. N. p. 758.
 - g. P. Argus marginatus, alis coeruleis margine nigro, subtus cinereo-coerulescentibus nigro-punctatis. T. 1. p. 288. t. 4. f. 9—15. T. 2. p. 182.
 - P. Argiolus. L. S. N. p. 790.
 - 4. P. candidus, alis ovatis albis, macula superiorum nigrescente in nonnullis individuis. T. 2. p. 183. t. 1. f. 1.
 - P. Sinapis. L. S. N. p. 760.
 - 5. P. Reginae, alis flavis maculis lineisque nigris, inferioribus caudatis ferie macularum coerulearum. T. 2. p. 185. t. 1. f. 2. 3.
 - P. Machaon. L. S. N. p. 750.
 - 6. P. alpicola, albus nigro-maculatus, alis inferioribus ocellis quatuor, iride rubra, extus nigra: pupilla alba. T. 1. p. 282. t. 18. f. 8 13. T. 2. p. 136.
 - P. Apollo. L. S. N. p. 754.

Fam, 3.

Fam. 3.

7. P. Virgula, alis supra sulvis lineola nigra, infra viridescentibus maculis quadratis albis. T. 2. p. 189. t. I. f. 4. 5.

P. Comma. L. S. N. p. 793.

8. P. Malvae, alis fusco-nigricantibus maculis pun-Etisque albis. T. 2. p. 189.

P. Malvae. L. S. N. p. 795.

Fam. 4.

9. P. Morio, alis angulatis obscure ruso-suscis, limbo albo-slavescente serieque macularum coerulescentium. T. 1. p. 305. t. 21. f. 1 — 9. T. 2. p. 192.

P. Antiopa. L. S. N. p. 776.

bro, fuperioribus albo-maculatis. T. 1. p. 310. t. 22. f. 1 - 5. T. 2. p. 193.

P. Atalanta. L. S. N. p. 779.

11. P. C. album, alis profunde angulatis fulvis nigro-maculatis, inferioribus C albo notatis. T. 1. p. 298. t. 20. f. 1 — 10. T. 2. p. 193.

P. C. album. L. S. N. p. 778.

gro-maculatis, inferioribus fubtus flavoviridibus maculis 27. argenteis nonnullisque rufis. T. 2. p. 193. t. 1. f. 6 — 9.

P. Adippe. L. S. N. p. 786.

13. P. argenticollis, alis rotundatis fulvis nigro-maculatis, inferioribus fubtus maculis 9. argenteis nonnullisque flavescentibus. T. 2. p. 197. t. 1. f. 10. 11.


P. Euphrofyne. L. S. N. p. 786.

14. P. flavo-maculatus, alis dentatis fulvis nigromaculatis, inferioribus fubtus flavo-maculatis latis serieque punctorum violaceorum. T.
2. p. 198. t. 1. f. 12.

- 15. P. Abacus, alis rotundatis fulvis, radiis transversis nigris undulatis; inferioribus subtus exalbido-flavis nigro-punctatis, fasciis 2. fulvis abruptis. T. 2. p. 199. t. 1. f. 13 18.
 - P. Cinxia. L. S. N. p. 784.
 - 16. P. Satyrus, alis fuscis transversim subundulatis, superiorum ocello unico supra tribusque subtus: inferiorum ocellis 7. subtus. T. 2. p. 202. t. 2. f. 1. 2.
 - P. Maera. L. S. N. p. 771.
 - 17. P. Pamphius, alis rotundatis pallide aurantiis limbo griseo, superioribus ocello unico, inferioribus subtus cinereis fascia exalbida. T. 2. p. 205. t. 2. f. 3.
 - P. Pamphilus. L. S. N. p. 791.
 - 18. P. Hero, alis rotundatis pallide aurantiis, ocellis superiorum 2. inferiorum 6. fasciaque undulata exalbida omnium. T. 2. p. 206. t. 2. f. 4.
 - P. Hero. L. S. N. p. 793.
 - 19. P. Arcanius, alis rotundatis, superioribus pallide aurantiis ocello unico, inferioribus suficis ocellis 5. l. 6. fasciaque alba subtus, T. 2. p. 207. t. 2. f. 5. 6.
 - P. Arcanius. L. S. N. p. 791.

Fam. 5.

- 20. P. Alexis, alis dentatis fuscis fascia rufa, superioribus ocellis quatuor, inferioribus tribus. T. 2. p. 210. t. 2. f. 7. 8.
- P. Ligea. L. S. N. p. 772.



21. P. Triffan, alis rotundatis fuscis, subtus ocellis superiorum 3, inferiorum 5. T. 2. p. 211, t. 2. f. 9, 10.

P. Hyperanthus. L. S. N. p. 768.

g. SPHINX.

Fam. 1.

22. S. flovida, longirostris, antennis clavatis, alis superioribus fusco-cinereis obseure radiatis: inferioribus pallide aurantiis. T. 2. p. 226.

S. Stellatarum. L. S. N. p. 803.

hyalinis nigricanti-rufo-marginatis, alis hyalinis nigricanti-rufo-marginatis, corpore pilis grifeo-rufis flavisque tomentoso.

T. 2. p. 227.

\$. Fuciformis. L. S. N. p. 803.

hyalinis fusco-marginatis, corpore nigro cingulis flavis, thorace maculis binis flavis, pedibus rusis. T. 2. p. 227. t. 2. f. 11.

S. Apiformis. L. S. N. p. 804.

hyalinis nigro-fusco-marginatis, corpore nigro incisuris alternis margine slavis. T. 2. p. 230. t. 2. f. 12.

S. Tipuliformis. L. S. N. p. 804.

hyalinis nigro-fusco-marginatis, corpore nigro cingulo unico fuluo. T. 2. p. 222. t. 2. ft. 13.

& Culieiformis. L. S. N. p. 804.

. Fam. 2.

27. S. Pinastri, longirostris, antennis prismaticis, cinereo-fusca, alia postice albo-margina.

tis: fuperioribus lineis 3. nigris disci, thorace maculis 2. nigris longitudinalibus. T. 2. p. 234. t. 2. f. 14. T. 1. p. 169. t. 10. f. 1 — 4.

S. Pinastri. L. S. N. p. 802.

28. S. Galii, longirostris, antennis prismaticis, obfeure viridis, alis superioribus vitta bidentata alba, inferioribus macula rubra. T. 2. p. 236. T. 1. p. 162, t. 8. f. 6 — 11.

obs. Simillima S. Euphorbiae ad quam retulit à Linné in S. N. p. 802. sed Larva diversa.

- 29. S. Porcus, longirostris, antennis prismaticis, olivacea, alarum superiorum fasciis tribusobliquis roseis, inferioribus roseis basi nigris. T. 2. p. 236. T. 1. p. 154. t. 9. s. 1 9.
- S. Elpenor. L. S. N. p. 801.
- 30. S. Porcellus, longirostris, antennis prismaticis, olivacea, alarum superiorum fascia maculisque binis roseis, inferioribus suscis fascia olivacea. T. 2. p. 237.
- S. Porcellus. L. S. N. p. 801.
- 31. S. Ligustri, longirostris, antennis prismaticis, alis superioribus suscis cinereo-nebulosis, inferioribus abdomineque roseis nigro-fasciatis. T. 2. p. 238. T. 1. t. 1. f. 6 12.
- S. Ligustri. L. S. N. p. 799.

Fam. 3.

32. S. Populi, brevirostris, antennis prismaticis, alis dentatis cinereis strigis undatis suscila, inferioribus basi rusis, superioribus macula alba. T. 2. p. 243. T. 1. p. 148. t. 8. f.

S. Populi. L. S. N. p. 797.

33. S. Semi-Pavo, brevirostris, antennis prismaticis, alis repandis: superioribus suscis nereo-nebulosis, inferioribus rubris ocello coeruleo nigroque. T. 2. p. 243. t. 3. f.

S. ocellata. L. S. N. p. 796.

34. S. Tiliae, brevirostris, antennis prismaticis, alis angustis repandis testaceis maculis viridibus angulatis: inferioribus griseo-flavis.

T. 2. p. 246. t. 3. f. 5 — 7.

S. Tiliae. L. S. N., p. 797.

3. ADSCITA.

35. A. Aries, antennis clavatis fimplicibus, alis fuperioribus coeruleo-viridescentibus nitidis rubro-maculatis, inferioribus rubris. T. 2. p. 252. T. 7. p. 591. t. 44. f. 1 — 8.

Sphinx Filipendulae. L. S. N. p. 805.

36. A. Turcosa, antennis clavatis pectinatis, viridiaurea nitens, alis inferioribus fuscis. T. 2. p. 255. t. 3. f. 8 — 10.

Sphinx Statices. L. S. N. p. 808.

4. PTEROPHORYS.

37. Pt. albo-fasciatus, alis fuscis fasciis albis: superioribus 2-inferioribus 3-fidis, simbriatis.

T. 2. p. 260. t. 4. f. 1 — 12.

Phalaena didactyla. L. S. N. p. 899.

38. Pt. fuscus, alis fuscis immaculatis: superioribus 2-inferioribus 3-fidis, simbriatis. T. 2. p. 267. t. 3. f. 11. 12.

5. PHALAENA.
Fam. 1. Sect. 1.

39. Pb. pavunculus, elinguis, antennis pectinatis, alis extensis cinereis fusco-undulatis ocel-C 2 loque loque instructis. T. 2. p. 290. T. 1. p. 270. t. 19. f. 1 — 12/

Ph pavonia. L. S. N. p. 810.

40. Pb. paradoxa, elinguis, antennis pectinatis, alis planis ferrugineis macula alba; foemina cinerca aptera. T. 2. p. 292. T. 1. p. 253. t. 17. f. 1 — 18.

Ph. antiqua. L. S. N. p. 325.

41. Ph. dispar, elinguis, antennis pectinatis, alis extensis albis nigro-maculatis, foeminae: fuscis lineis undatis nigris maris; pedibus antennisque nigris foeminae. T. 2. p. 293.

Ph. difpar. L. S. N. p. 821.

Fam. 1. Sell. 2.

42. Ph. Folium siccum, elinguis, antennis pectinatis, alis reversis dentatis susco-rusis cinereo-nebulosis albo-marginatis, striis transversis undulatis nigrescentibus. T. 2. p. 298. T. 1. p. 229. t. 14, f. 1 — 9.

Ph. ilicifolia, L. S. N. p. 813.

43. Ph. tesseraia pratensis, elinguis, antennis pectinatis, alis reversis: foeminae fuscis fasciis 2. obliquis flavis, maris exalbido-flavis fasciis fuscis. T. 2. p. 299. T. 1. p. 216. t. 13. f. 1 — 6.

Ph. castrensis. L. S. N. p. 818.

44. Pb. bicaudata, elinguis, antennis pectinatis, alis fubreversis cinereis, fascia superiorum latiore obscura. T. 2. p. 300. T. 1. p. 193. t. 11. f. 18 — 21.

Ph. Crataegi. L. S. N. p. 823.

Fam. 1. Sect. 3.

45. Ph. erinacea, elinguis, antennis pectinatis, alis deflexis: fuperioribus fuscis rivulis albis, inferi-

p. 301. T. 1. p. 198. t. 12. f. 1 — 9.

Ph. Caja. L. S. N. p. 819.

46. Ph. apparens, elinguis, antennis pectinatis nigris, alis deflexis albis, pedibus nigro-annulatis. T. 2, p. 302. T. 1. p. 191. t. 11. f. 13 — 17.

Ph. Salicis. L. S. N. p. 822.

47. Ph. Lepus, elinguis, antennis pectinatis nigris, alis deflexis albis vel flavescentibus nigropunctatis, abdomine flavo serie quintuplici punctorum nigrorum. T. 2. p. 304. T. 1. p. 178. t. 11. f. 1 — 11.

Ph. lubricipeda, L. S. N. p. 829.

48. Pb. Ramus ficcus, elinguis, antennis pectinatis fubhorizontalibus erofis flavis, strigis 2. fufcis, thorace citrino. T. 2. p. 305. T. 1. p. 349. t. 10. f. 9 — 14.

Ph. Alniaria. L. S. N. p. 860.

49. Ph. birtipennis, elinguis, antennis pedinatis, alis subhorizontalibus canis villosis, punctis strigarum nigris. T. 2, p. 306. T. 1, p. 354. t. 22. f. 6 — 9.

Ph. hirtaria. L. Faun. Suec. 1236.

50. Ph. tubifex, elinguis, antennis pectinatis, alis fusco-nigricantibus, foeminae nullis. T. 1. p. 506. t. 29. f. 19. — 22. t. 30. f. 22. 23. T. 2. p. 307. t. 3. f. 13. 14.

Fam. 1. Sect. 4.

51. Ph. Ziczac viituberculata, elinguis, antennis pe-Etinatis, thorace criftato, alis pallido fufcis cano-nebulofis: fuperioribus macula magna ovali nebulofa linea fufca obfcuriore circumfcripta. T. 2. p. 309. T. 1. p. 116. t. 6. f. 1 — 9.

Ph.

Ph. Ziczac. L. S. N. p. 827.

52. Fb. Ziczac quinquetuberculata, elinguis, antennis pectinatis, thorace subcristato, alis sufco-nigricantibus: superioribus transverse ferrugineo-undulatis maculaque sulphurea ad basin. T. 2. p. 309. t. 4. f. 13 — 17.

53. Ph. diura major, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato nigro-punctato, alis hirsutis cinereis nigro-punctatis nebulosisque.

T. 1. p. 318. t. 23. f. 6 — 12. T. 2. p. 312.

Ph. Vinula. L. S. N. p. 815.

54. Ph. diura minor, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato nigro lineis slavis, alis canis lineis transversis undulatis nigris margine aurantio, nigro-punctatis. T. 2. p. 313. t. 4 f. 18 — 21.

55. Ph. Lunula, elinguis, antennis pectinatis, thorace criftato flavo lineis rufis, alis superioribus albo-cinereis macula anguli exterioris flava. T. 1. p. 221. t. 13. f. 7 — 21. T. 2. p. 317.

Ph. bucephala. L. S. N. p. 816.

56. Pb. porrecta alba, elinguis, antennis pectinatis flavis, thorace cristato, alis cinereo-albis, lineis transuersis undatis suscessive que. T. 1. p. 243. t. 16, f. 7 — 20. T. 2. p. 317.

Ph. pudibunda. L. S. N. p. 824.

57. Ph. porretta cana, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato cano, alis superioribus strigis duabus nigris slavo-marginatis maculaque nigra albo-marginata. T. 1. p. 261. t. 15. f. 12 — 15. T. 2. p. 318.

Ph. fascelina, L. S. N. p. 825.

58. Ph. Coryli, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato griseo fuscoque striato, alis fuperioribus antice fuscis, postice cinereoalbis, macula ovali alba nigro-marginata. T. 1. p. 265, t. 18. f. 1 - 7. T. 2. p. 319.

Ph. Coryli. L. S. N. p. 823.

50. Pb. alticauda alba, elinguis, antennis pectinatis, thorace criftato macula rhombea nigro-fusca; alis cinerascentibus lineis 4. transversis albidis maculaque ferruginea, T. 2. p. 319. t. 4. f. 22 - 26.

60. Ph. alticauda grifea, elinguis, antennis pectinatis, thorace cristato macula ovali nigrofusca, alis griseo-fuscis ferrugineo-nebulofis, lineis transversis undulatis pallidis. T. 2. p. 322.

Ph. Anastomosis. L. S. N. p. 824.

61. Pb. alticauda furcata, elinguis, antennis pelinatis, thorace criftato macula ovali fusconigra, alis murinis lineis 4. transversis albidis puncto albo maculaque ferruginea. T. 2. p. 323. t. 5. f. 1. 2.

Ph. curtula. L. S. N. p. 823.

Fam. 2. Sect. 1.

62. Pb. delicatula, spirilinguis, antennis pectinatis, thorace criftato, alis deflexis erofis grifels aurantio-nebulofis lineis punctisque 2 albis. T. 2. p. 332, t. 5. f. 3 - 5.

Ph. libatrix. L. S. N. p. 831.

63. Ph. palpina, spirilinguis, antennis pectinatis, thorace cristato, alis desfexis dentatis grifeis; palpis elongatis forma probofcidis depressae. T. 2. p. 334. T. 1. p. 60. t. 4. f. 7. 8. Contract of the

Ph. palpina, L. S. N. p. 1146.

64. Pb. lacertina. fpirilinguis, antennis pectinatis, thorace criftato, alis eroso-denticulatis deflexis flavo-griseis lineis 2. transversis suscess punctoque nigrescente. T. 1. p. 340. t. 10. f. 5 — 8. T. 2. p. 335. t. 5. f. 6. 7.

Ph. lacertinaria. L. S. N. p. 860.

Fom. 2. Sect. 2.

65. Ph. fusca trimaculata, spirilinguis, antennis petinatis, thorace cristato linea nigra, alis deslexis griseo-suscis, maculis 3. ovalibus suscenigricantibus: inferioribus albis. T. 2. p. 337. t. 5. s.

66. Ph. triftis, spirilinguis, antennis pectinatis, thorace cristato, alis deslexis integris susco-nigricantibus margine exteriore albido-punctato. T. 2. p. 338. t. 5. f. 9.

Ctato. 1, 2, p, 338, t, 3, 1, 9,

67. Ph. C. sigrum, spirilinguis, antennis pettinstis, alis deflexis integris griseis susco-nebulosis C. nigro notatis. T. 2. p. 338. t. 5. f. 10.

68. Pb. cinerea bisligmata, spirilinguis, antennis pe-Etinatis, alis deslexis cinerasoentibus nebulis striisque nigris maculis 2. ovatis albidis nigro-cinclis, T. 2. p. 339. t. 5. f. 11.

69. Pb. Graminis, spirilinguis, antennis pectinatis, alis deflexis fusco-griseis, linea longitudinali ramosa alba maculisque 3. flavescentibus superiorum. T. 2. p. 340.

Ph. Graminis. L. S. N. p. 830.

70. Pb. flava nigro-punctata, fpirilinguis, antennis pectinatis, alis deflexis rotundatis flavis nigro-punctatis, abdomine nigro apice flavo. T. 2. p. 342. t. 5. f. 12.

The irrosella. L. S. N. p. 884.

Fam. 2. Sect. 3.

71. Pb. fusca bistrigata, spirilinguis, antennis subpestinatis, alis erosis planis susco-griseis strigis 2. undulatis nigricantibus albo-marginatis punctoque disci nigro. T. 1. p. 378. t. 25. f. 1 — 7. T. 2. p. 343.

Ph. bidentata. L. Faun. Suec. 1255.

72. Ph. otomaria, fpirilinguis, antennis pectinatis, alis dentatis planis aurantiis punctis lineo-lisque transversis griseis numerosis. T. 2, p. 344. t. 5. f. 14.

Ph. atomaria. L. S. N. p. 862?

Fam. 2. Sell. 4.

73. Ph. alba nigro-punctata, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis albis maculis punctisque numerosis nigris, thorace lineis nigris. T. 2. p. 344 t. 5. f. 15 — 18. T. 1. p. 344 t. 17. f. 19 — 22.

Ph. betularia. L. S. N. p. 862.

74. Pb. grifea fasciata, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis cinerascentibus fasciis 2. fuscis repandis albo-marginatis lineaque alba fulminata. T. 2. p. 348.

Ph. fasciaria. L. S. N. p. 862.

75. Pb. olivaceo-fasciata, spirilinguis, antennis pechinatis, alis planis cinereo-fuscis, fascia undulata olivacea, subtus cinereo-flavis, T. 2. p. 350, t. 5. f. 19,

Ph. pulveraria. L. S. N. p. 862?

76. Pb. fusco-fasciara, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis cinereis fascia undulata susco-ferruginea nigro-marginata, subtua carneis. T. 2. p. 351. t. 5. f. 13.

77. Ph. cristata albo-lineata, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis rusescentibus: info-C 5 rioririoribus punctis olivaceis lineaque longitudinali alba. T. 2. p. 351. t. 5. f. 20.

Ph. piniaria. L. S. N. p. 861.

78. Pb. cristata slavo punctata, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis suscis, punctis maculisque flavis, subtus flavis punctis striisque suscis. T. 2. p. 353. t. 5. f. 21.

79. Pb. falcata, spirilinguis, antennis pectinatis, alis horizontalibus falcatis pallide ochraceo-fuscis lineis, fascia obliqua maculaque fuscis. T. 2. p. 353. t. 6. f. 1. T. 1. p. 333. t. 24. f. 1 — 9.

Ph. falcataria. L. S. N. p. 859.

- 80. Pb. parvula, fpirilinguis, antennis pectinatis, alis planis albis linea undulata duplici nigrefcente ad marginem posticum maculisque binis repandis ferrugineo-variegatis ad marginem exteriorem. T. 2. p. 355. t. 6. f. 2.
- 81. Pb. testacea, spirilinguis, antennis, pedinatis, alis planis: superioribus testaceis fascia pallida, inferioribus albidis. T. 2. p. 356. t. 6. f. 3.
- 82. Pb. Alchemillae spirilinguis, antennis pectinatis alis planis griseo-fuscis, fasciis binis lineaque sulminata albis in superioribus. T. 2. p. 357. T. 1. p. 358. t. 22. f. 10 16.

Ph. Alchemillata. L. S. N. p. 869.

- 83. Pb. parallelo-lineata, spirilinguis, antennis pe-Linatis, alis planis albo-cinerascentibus: superioribus lineis 2. parallelis suscis. T. 2. p. 357. t. 6. f. 4.
- 84. Ph. longipalpis, spirilinguis, antennis pestinatis, alis planis albo-cinerascentibus lineolis binis transversis suscis, palpis longitudine anten-

antennarum. T. 2. p. 358. T. 1. p. 59. t. 5. f. 1 — 3.

Ph. tentacularis. L. S. N. p. 881.

85. Pb. cinerea undulata, spirilinguis, antennis pelinatis, alis planis cinereis fasciis 2. duplicatis undulatis nigris maculaque albida superioribus, cingulo abdominis albo. T. 2. p. 358. t. 6. f. 5.

Fam. 2. Sect. 5.

86. Ph. straminea, spirilinguis, antennis pestinatis, alis planis pallide stramineis fascia saturatiore albo-marginata: inferioribus angulatis. T. 2. p. 360. t. 6. f. 6.

87. Pb. fuspensa, spirilinguis, antennis pectinatis, alis planis exalbido-cinerascentibus, lineis
2. transversis nigro-punctatis ocelloque ferrugineo: inferioribus angulatis. T. 2. p. 360. t. 6. f. 7.

Ph. pendularia. L. Faun. Suec. 1244.

88. Ph. semipedinata, fpirilinguis, antennis semipedinatis, alis planis virescentibus lineis 2transversis undulatis albis: inferioribus angulatis. T. 2. p. 362. t. 6. f. 8.

Ph. vernaria. L. S. N. p. 858. Fam. 3.

89. Pb. bumuli, elinguis, antennis brevibus filiformibus, mare albo, foemina ochracea. T.
1. p. 487. t. 7. f. 1 — 11. T. 2. p. 366.

Ph. Humuli. L. S. N. p. 833.

90. Pb. clavipes, elinguis, antennis brevibus filiformibus, alis maris rufo-fulvis maculis niveis, foeminae fuscis fasciis fulvis. T. 7. p. 596. t. 44. f. 14. 15. T. 2. p. 366. T. 1. p. 495. t. 7. f. 12 — 15.

Ph. Hecta. L. S. N. p. 833.

91. Pb.

91. Ph. fusto-nebulosa, elinguis, antennis filiformibus brevissimis, alis albido-cinereis maculis fuscis nebulosis. T. 7. p. 598. t. 44. f. 16.

Fam. 4.

92. Ph. Cossus elinguis, antennis filiformibus lamellatis, thorace cristato fascia nigra collarique albo, alis cinereis lineolis numerosis transversis nigris. T. 2. p. 368. T. 1, p. 32. t. 2. f. 9. 10.

Ph. Cossus. L. S. N. p. 827.

93. Ph. pinguedinis, elinguis, antennis filiformibus, palpis elongatis, alis planis canis firiis maculisque fuscis et nigris. T. 2. p. 371. 4. 6. f. 9 — 12.

Ph. pinguinalis. L. S. N. p. 882.

94. Ph. tubulofa, elinguis, antennis filiformibus, alis grifeo-fuscis nitidis, capite flavo, foe-mina aptera. T. 2. p. 375. t. 6. f. 13—21, E larva tinea Lichenum.

95. Ph. trigono tubulosa, elinguis, antennis filiformibus, foemina aptera. T. 2. p. 380. t. 11.f. 1—8. E larva-tinea murorum tubum prismaticum e frustulis lapidum conficiente. An mas quoque apterus? videtur.

Ph. lichenella. L. S. N. p. 899.

Fam. 5. Sett. 1.

96. Ph. Nottua major, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis incumbentibus fuscis vel grifeis: inferioribus flavis fascia marginali nigra. T. 2. p. 399. T. 1. p. 109. t. 5. f. 17. 18.

Ph. pronuba. L. S. N. p. 842.

97. Ph. Lignum ficcum, spirilinguis, antennis filiformibus, alis oblongis invicem incumbentibentibus, colore ligni putridi, fupra dorfum castaneis, thorace cristato trituberculato. T. 2. p. 401. t. 7. f. 1 — 5.

Ph. exfoleta. L. S. N. p. 849.

98. Ph. murina, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis invicem incumbentibus murinis maenlis 4. nigris: inferioribus fubalbidis. T. 2. p. 406. t. 6. f. 22.

99. Ph. Cerefolii, spirilinguis, antennis filiformibus, alis invicem incumbentibus susco-grifeis nitidis albo-bimaculatis. T. 2. p. 406. T. 1. p. 424. t. 29. f. 1 — 8.

Ph. Heracleana. L. S. N. p. 880?

100. Pb. Heraclei, spirilinguis, antennis filiformibus, alis invicem incumbentibus griseis nigro-striatis, palpis recurvis, pedibus postricis hirsutis. T. 2. p. 407.

Obs. vix Heracleana Linnei est; praecedens etiam palpos habet recuruos.

Fam. 5. Sect. 2.

101. Pb. viridis bilineata, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis: fuperioribus viridibus firigis binis obliquis flavescentibus,
Inferioribus albis. T. 2. p. 410. T. 1.
p. 58. t. 3. f. 1 — 3.

Ph. prafinaria. L. S. N. p. 875.

filiformibus, alis deflexis grifeis aurantiomaculatis, maculis binis albis utriusque. T. 2. p. 410. t. 6. f. 23.

103. Pb. lanata, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis albis punctis maculisque albis.
T. 2. p. 411. T. 1. p. 210. t. 10. f. 17.

Ph. leporina. L. S. N. p. 838.

104. Ph.

- 104. Ph. cinerea bimaculata, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis cinereo-nigricantibus ftriis undatis nigris maculisque binis albis ad marginem interiorem. T. 2. p. 411. T. 1. p. 185. t. 9. f. 14 23.
- Ph. Rumicis. L. S. N. p. 852.
- 105. Ph. viridis maculata, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis viridescentibus fasciis undulatis albis nigrisque, maculis 2. albis disci. T. 2. p. 412. t. 6. f. 24.
- bus, alis deflexis: fuperioribus cinereo-nigricantibus maculis 2. exalbidis lineisque nigris, inferioribus albis. T. 2. p. 412. T. 1. p. 280. t. 11. f. 25 — 28.
- 107. Pb. macrocepbala, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis cinereis, firigis undatis nigris, ffigmate submarginali exalbido. T. 2. p. 413. t. 7. f. 6 9.
- 108. Pb. nervosa, spirilinguis, antennis filisormibus, alis deflexis griseis, lineis longitudinalibus albidis. T. 2. p. 415. t. 7. f. 10
- bus, alis deflexis cinereo hepaticis nitidis ftrigis 2. undulatis maculisque 2. nigricantibus. T. 2. p. 417. t. 7. f. 25.
- mibus, alis deflexis cinereis nitidis, puntis tribus disci, capite luteo. T. 2. p.
- Ph. Tragopogonis. L. S. N. p. 855.
- mibus, alis deflexis fusco-rufescentibus nitidis

tidis fascia ferruginea punctoque nigro. T.

2. p. 419. t. 7. f. 16.

112. Ph. ferruginea fasciata, spirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis susco-ferrugineis macula alba et flava fasciaque undulata alba. T. s. p. 420. t. 7. f. 17.

Ph. L. Faun. Suec. 2290.

Obf. maculae et fascia in foeminis griscae.

filiformibus ferrugineis, alis deflexis canis firigis nigris maculisque 2, fulphureis, T. 2.

p. 422, t. 7, f. 18, 19.

114. Ph. 2. graecum, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis deflexis canis violaceo-nebulofis fasciis nigris undulatis 2. sulphureo scriptis. T. 2. p. 423. t. 7. f 20 — 23.

bus, alis deflexis cinereis l. fuscis puncto albo nigro-marginato: inferioribus albis strigis nigris. T. 2. p. 426. T. 1. p. 517. t. 37. f. 1 — 18.

Ph. Stratiotata, L. S. N. p. 873.

mibus, alis deflexis pallide flavis nitidis ftrigis binis punctatis fuscis, margine postice fusco. T. 2. p. 426. t. 7. f. 24.

Fam. 5. Sect. 3.

117. Ph. meticulofa, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis deslexis erosis griseis suscential macula trigona carnea viridi-marginata, T. 2. p. 427. T. 1. p. 240. t. 5. f. 12 — 14.

Ph. meticulofa. L. S. N. p. 845.

118. Ph. aureo-fasciata, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis deflexis sufeo-grifeis fasciis 2. aureo-viridulis. T. 2. p. 488.

Ph. Chrysitis. L. S. N. p. 843.

119. Ph. aureo-argentea, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis deslexis sufcis aureo mixtis, maculis 3. argenteis. T. 2. p. 429. Act. R. Ac. Scient. Suec. 1748. p. 210. t. 6. f. 3. 4.

Ph. Festucae. L. S. N. p. 845.

120. Pb. flava flrigata, fpirilinguis, antennis fillformibus, thorace cristato, alis deslexis slavis strigis 4. annulisque 2. oblongis ferrugineis. T. 2. p. 429. t. 7. f. 25.

Ph. Citrago. L. S. N. p. 857.

bus, thorace bicriftato, alis deflexis exalbido-grifeo-nebulofis firigis maculisque marginis exterioris nigris. T. 2. p. 430. t. 8.

122. Pb. Aprilis, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis deslexis suscentibus albido - viriduloque - nebulosis macula ovali viridi-suscentibus albo-nigroque marginata. T. 2. p. 434. T. 1. p. 113. t. 5. f. 19 — 23.

Ph. Aprilina. L. S. N. p. 847.

123. Ph. Filicis, fpirilinguis, antennis filiformibus, thorace criftato, alis deflexis nigro-cinereo-que fasciatis, maculis 2. cinereis tertiaque cum striga flavidis. T. 2. p. 435. t. 7. f. 26.

bus, thorace criffato angulato, alis deflexis lateritiis maculis albo-grifeis: duabus ferrugineis strigisque nigris. T- 2. p. 436.

bus, thorace cristato, alis deslexis susceptibles furgis undatis nigris, macula grisea aliaque griseo-alba strigaque albida: T. 2: b: 438:

Ph. Brafficae. L. S. N. p. 852.

ta6. Pb. albo fulminata; spirilinguis, antennis siliformibus; thorace cristato; alis deslexis
ferrugineis maculis strigisque suscis, nigris
griseisque, linea marginis postici sulminata
alba. T. 2. p. 440.

Ph. Pisi. L. S. N. p. 854.

127. Pb. grisco-reticulata; spirilinguis; antennis filisorinibus, thorace cristato angulari, alis deflexis suscis rivulis reticulatis griscis. T. 2: p. 44i. t. 7. f. 27.

128. Pb. |Confpicillum; spirilinguis!; antennis filiformibus, thorace cristato, alis deflexis fulsco-canis lineis 2. curvis maculaque trianigula nigris. T. 2. p. 442. T. 1. p. 123: t. 6: f. 13 — 23:

Ph. triplasia. L. S. N. p. 854:

Fam. 5. Sect. 4. Art. 1:

128. Ph. flavicauda, spirilinguis; antennis filiformibus; alis planis albis maculis ovatis nigris, thorace anoque flavis. T. 2: p. 445: T. 1. p. 418. t. 28. f. 12 — 19:

Ph. urticata. L. S. N. p. 873;

bus, alis planis fucco-grifeis maculis alboflavidis nitidis; T. 2. p. 446.

Fam. 5. Sect. 4. Art. 2.

filiforniibus, alis extensis strainineis strigis

duabus luteis: inferioribus angulatis pun-Etis 2. fuscis. T. 2. p. 447.

Ph. Sambucaria. L. S. N. p. 860.

132. Ph. alba trilineata, spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis albis: superioribus strigis 3, inferioribus 2. griseis. T. 2. p. 448. t. 8. f. 10 — 12.

Ph. pufaria. L. S. N. p. 864.

133. Ph. albida biundulata, spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis exalbidis griseo-nebulosis strigis binis susco-nigricantibus. T. 2. p. 449. t. 8. f. 13 — 16.

134. Pb. byemalis, spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis griseo-fuscis, strigis obscurioribus; foemina aptera. T. 2. p. 452. t. 8. f. 17. 18. T. 1. p. 36c. t. 24. f. 11—24.

Ph. brumata. L. S. N. p. 874.

135. Pb. bastata, spirilinguis, antennis siliformibus, alis extensis albis utrinque fasciis undulatis maculisque excisis nigris. T. 2. p. 455. t. 8. f. 19. 20.

Ph. haftata. L. S. N. p. 870.

136. Ph. violacea nigro-firingata, spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis violaceis grifeo-albidoque mixtis, strigis tribus angulatis nigris. T. 2. p. 457. t. 9. f. 1 — 5.

137. Ph. fexalata, spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis albido-griseis fasciis tribus dentatis slavis punctoque nigro, maris tertio alarum pare. T. 2. p. 459. t. 9. f. 6 — 9.

138. Ph. Tinea Pini spirilinguis, antennis filiformibus, alis extensis griseis, strigis undulatis nigris griseisque, puncto nigro fasciaque feruginea. T. 2. p. 462. t. 9. f. 10 — 12.

Fam.

- Fam. 5. Sect. 5.

129. Ph. argentea convoluta, spirilinguis, antennis filiformibus, alis convolutis fupra albo-argenteis subtus susco-griseis. T. 2. p. 464.

Ph. pratella. L. S. N. p. 886.

140. Pb. argenteo-lineata, spirilinguis, antennis filiformibus, alis convolutis flavescentibus lineis argenteis, palpis elongatis. p. 465.

Ph. pascuella. L. S. N. p. 886.

141. Pb. albo-flava, spirilinguis, antennis filiformibus, alis convolutis albido-flavis: inferioribus fubtus ochraceis. T. 2. p. 466.

141. Pb. convoluto-plana, spirilinguis, antennis filiformibus, alis convolutis albo-cinereis firigis 2. obliquis atomisque fuscis, p, 466.

Ph. fociella. L. S. N. p. 883.

142. Pb. cana nigro-punctara, spirilinguis, antennis filiformibus, alis convolutis canis strigis 2. undulatis punctoque intermedio nigris. T. 2, p. 467.

Ph. colonella. L. S. N. p. 883.

Fam. 5. Sett. 6.

144. Pb. Pallium reticulatum, spirilinguis, untennis filiformibus, alis rhombeis fuscis maculis strigisque obscuris: inferioribus supra nigrescentibus, palpis recurvis. T. 2. p. T. I. p. 403, t. 27. f. I - 8. II 468. - 14.

Ph. Rofana. L. S. N. p. 876.

145. Pb. Pallium fuscum, spirilinguis, antennis filiformibus, alis rhombeis fusco-castaneis, fascia obliqua obscura, palpis porrectis. T. 2, p. 468. T. i. p. 409. t. 27. f. 9, 10. 146. D 2

146. Pb. Pallium luteum, spirilinguis, antennis siliformibus, alis rhombeis luteis, strigis obliquis nebulisque suscis. T. 2. p. 469.

117. Ph. Pallium aurantium, spirilinguis, antennis filiformibus, alis rhombeis aurantiis nitidis strigis 4. fusco-argenteis. T. 2. p. 469.

Ph. Bergmanniana. L. S. N. p. 878.

148. Ph. Pailium excifum, spirilinguis, antennis filiformibus, alis rhombeis margine postico interiore exciso: obscure suscis striga inflexa flavescente. T. 2. p. 470. T. 1. p. 413. t. 28. f. 1 — 11.

149. Ph. Pallium cristatum, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis rhombeis fusco-olivaceis annulis 2. ovatis strigisque 3. griseis. T. 2. p. 470. t. 9. f. 16 — 19.

150. Ph. Pallium fasciatum, spirilinguis, antennis filiformibus, thorace cristato, alis rhombeis albis canisve, fascia undulata susce maculaque lunulari ferruginea. T. 2. p. 472. t. 10. f. 1 — 4.

151. Ph. Pallium viride, spirilinguis, artennis filiformibus, alis rhombeis subdeflexis: superne viridibus margine albis, subtus totis niveis. T. 2. p. 475. t. 10. f. 5 — 9.


Ph. clorana. L. S. N. p. 876.

152. Ph. Pallium transparens, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis rhombeis grifeis transparentibus: fuperioribus strigis 2. undulatis fuscis. T. 2. p. 478.

Ph. mundana. L. Faun. Suec. 1343.

Fam. 5. Sect. 7.

153. Ph. viginti puntlata, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus albo-cinereis punctis



punctis 20. nigris. T. 2. p. 479. t. 10. f. 10 — 16.

- 154. Pb. argyria, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus argenteo-albis: fuperioribus fubtus testaceis, ano flavo. T. 2. p. 483. t. 10. f. 17 19.
- filiformibus, alis pendentibus pallide fufcis macula communi fubrhombea; foeminis alba maribus fufca. T, 2. p. 485. T. 1. p. 410. t. 28, f. 25 — 30.

Ph. Solandriana, L. S. N. p. 878.

- 156. Ph. dimidio-alba, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus dimidiato-susce albisque, thorace cristato. T. 2. p. 485.
- 157. Pb. dimidio-alba maculata, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus obscure fuscis postice albis maculis suscis, thorace laevi. T. 2. p. 486, T. 1. p. 501. t. 34. f. 1 5.

Ph. Cynosbatella. L. S. N. p. 887?

Obs. Praecedens potius Pb. Cynosbatella Linn. erit.

158. Pb. phryganoides, spirilinguis, antennis filiformibus corpore triplo longioribus, alis pendentibus nigro-aureis fascia lutea violaceomarginata. T. 2. p. 487. T. 1. p. 541. t. 32. f. 13 — 15.

Ph. Degeerella. L. S. N. p. 895.

159. Pb. nigra cristata, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus nigris, strigis 3. undulatis cinereis cristaque transversa. T. 2. p. 487. T. 1. p. 421. t. 28. f. 20 — 23.

160. Ph. strobitorum Pini major, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus elongatis
D 3 cine-

cinereis, fasciis 2. nigro-marginatis lunulaque cinereis. T. 2. p. 487. t. 9. f. 12. 14.

- 161. Ph. strobilorum Pini minor, spirilinguis, antennis siliformibus, alis pendentibus susconigricantibus strigis canis. T. 2. p. 490. t. 9. f. 5.
- 162. Ph. Gallarum Pini, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus cinereis, strigis nebulisque nigris. T. 2. p. 491. T. 1. p. 473. t. 3. f. 1 13.

Ph. refinella. L. S. N. p. 892.

163. Pb. gemmarum Pini, spirilinguis, antennis filiformibus, alis pendentibus griseis maculis nebulisque fuscis, palpis brevibus. T. 2. p. 491. T. 1. p. 500. t. 22. f. 26. 27.

Fam. 5. Sect. 8.

- bus, alis angustis elevatis suscis, linea longitudinali slava. T. 2. p. 493.
- bus, alis angustis elevatis|grifeo-albis,| linea undulata fusca. T. 2. p. 494. T. 1. p. 394. t. 26. f. 1—16.

Ph. porrectella. L. S. N. p. 894.

- 166. Pb. duodecim cristata, spirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis subelevatis griseis, fasciis 4. nigricantibus cristulisque 6. nigris.

 7. 2. p. 494. T. 1. p. 498. t. 22. f. 17
- Ph. dodecella. L. S. N. p. 892.
 - 167. Ph. pelicaria Pyri, spirilinguis, antennis siliformibus, alis angustis elevatis cinereo-canis, capite albo. T. 2. p. 494. T. 1. p. 388. t. 25. f. 8 — 16.

168. Pb. chrysargyria Alni, spirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis elevatis aureis argenteo-maculatis, postice puncto nigro. T. 2. p. 495. T. 1. p. 440. t. 31. f. 1—12.

Ph. Rayella. L. S. N. p. 898.

169. Pb. chryfargyria Pomi, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis elevatis aureis argenteo-maculatis impunctatis. T. 2. p.

170. Ph. grifea Rosae, spirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis elevatis griseis e larva subcutanea Rosae. T. 2. p. 495. T. 1.

p. 446. t. 30. f. 13 - 20.

171. Ph. maculata Frangulae, fpirilinguis, antennis filiformibus, alis angustis elevatis albis maculis suscis. T. 2. p. 496. T. 1. p. 459. t. 32. f. 1 — 12.

172. Pb. bicristata Chaerophylli, spirilinguis, antennis siliformibus, alis angustis elevatis grifeo-albis nigro-nebulosis cristis 2. marginis interioris. T. 2. p. 496. T. 1. p. 455. t. 29. f. 9 — 18.

6. PHRYGANEA.

Fam. 1.

173. Ph. pellucida, antennis longitudine corporis, alis pellucidis postice nigro-nebulosis, pedibus griseis. T. 2. p. 526. t. 12. f. 1-19.

174. Ph. bipunciata, antennis longitudine corporis, alis cinereo-testaceis maculis cinereis linea longitudinali nigra punctisque 2. albis. T. 2. p. 527. t. 13. f. i — 17.

Ph. grandis. L. S. N. p. 909.

175. Ph. nigro-punclata, antennis longitudine corporis, grifea punctis maculisque nigricantibus:

tibus: alis superioribus postice rotundatis angulo exteriore linea nigra. T.2. p. 543. t. 13. f. 18 — 21.

176. Pb. punctato - lineata, antennis longitudine corporis, flavo-fusca, pedibus ochraceis, alis superioribus macula alba lineisque 2. nigro-griseoque-punctatis. T. 2. p. 548. t. 14. f. 1 — 5.

Fam. 2.

177. Ph. nigra fafciata, antennis corpore duplo longioribus, alis maris nigris fafciis testaceis, foeminae fuscis macula una vel altera flava. T. 2. p. 568. t. 15. f. 1 — 9.

Ph. bimaculata. L. S. N. p. 909.

178. Pb. nigro-nervosa, antennis nigris corpore duplo longioribus, palpis longis, alis fuscotestaceis nervis nigris, oculis ferrugineis, T. 2. p. 578. t. 15. f. 19. 20.

179. Ph. nigro-coerulea, antennis corpore duplo longioribus, palpis longis villofis, alis coeruleo-atris nitidis, oculis rubris. T. 2. p. 580. t. 15. f. 21 — 23.

Ph. nigra. L. S. N. p. 909.

Larvae obscurae hujus generis:

T. 2. p. 549. t. 14. f. 6 — 12, p. 557. t. 14. f. 15. 16. p. 568. t. 15. f. 8 — 10, p. 570. t. 15. f. 11 — 14. p. 571. t. 15. f. 15 — 18.

Gording aquatious Phryganearum larvas perforans p. 553, t. 14, f. 13, 14,

7. EPHEMERA.

180. E. communis, fusca, abdomine luteo, maculis triangulis nigris, alis fusco-maculatis, cauda tritrisets. T. 2. p. 621. t. 16, f. 1 — 14. t. 17. f. 1 — 10.

E. vulgata. L. S. N. p. 906.

181: E. albipennis, nigra, thoracis lateribus fuscis, alis albis pellucidis immaculatis, cauda trifeta. T. 2. p. 646. t. 17. f. 11 — 16.

E. vespertina. L. S. N. p. 906.

bo, oculis 4. maris, cauda trifeta, T, 2, p. 650, t. 17. f. 17. 18.

Fam. 2.

183. E. fusco-grisea, nigro-fusca, abdomine subtus griseo, alis pellucidis nigro-nervosis, cauda biseta. T. 2. p. 652. t. 18. f. 1 — 4.

184. E. diptera, alis duabus griseo-fusca, abdomine lineolis rubris, cauda biseta, alarum foe-minae margine exteriore susco maculis alabis. T. 2. p. 656. t. 18. f. 5 — 10.

E. diptera. L. S. N. p. 907.

8. LIBELLYLA.

Fam. 1.

185. L. flavipennis, fusca, capite globoso, thorace lineis 4. obliquis flavis, alis subluteis, abdomine cylindrico. T. 2. p. 678. t. 20. f. 5—16.

L. grandis. L. S. N. p. 903.

186. L. viridi cincla, nigra, capite globoso, thon race maculis abdomineque cingulis viridia bus. T. 2. p. 685, t. 21, f. 1 — 2,

L. forcipata, L. S. N. p. 903.

D 5

187. L. aenea, viridi-aenea nitida, capite globofo, pedibus nigris, abdomine medio incrassato.
T. 2. p. 687. t. 19. f. 1 — 18.

188. L. chinensis, capite globoso, alis posticis hasi macula magna susca slavo-cincta venisque slavis. T. 3 p. 556. t. 26. f. 1.

L. carolina. L. S. N. p. 904.

189. L. trimaculata, capite globoso, alis albis medio macula basi fascia longitudinali fuscis.
T. 3. p. 556. t. 26. f. 2. 3.

190. L. unifasciata, capite globoso, alis albis fasciatransversa suscentia. T. 3. p. 557. t. 26. f. 4.

L. umbrata. L. S. N. p. 903.

macula magna fusca. T. 3. p. 558. t. 26. f. 5.

192. L. marginata, capite globoso, alis dimidio fafcis albisque fusco-cinctis. T. 3. p. 558. t. 26. f. 6.

L. dimidiata. L. S. N. p. 903.

193. L. violacea, capite globoso, alis violaceo-fuscis, fascia transversa lineari alba. T. 3. p. 559. t. 26. f. 7.

L. fasciata. L. S. N. p. 903.

194. L. coeruleo-maculato, capite ovali, viridi-nitens maculis mari coeruleis, alis hyalinis, oculis viridibus. T. 2. p. 701. t. 21. f. 3

L. Puella. L. S. N. p. 905.

g. Hemerobivs.

195. H. cornutus, maxillis corniformibus porrectis capite longioribus, alis grifeo-fuscis albopunctatis. T. 3. p. 559. t. 27. f. 1 — 2.

Raphi-

Raphidia cornuta. L. S. N. p. 916.

196. H. pectinicornis, fuscus, pedibus testaceis, antennis pectinatis nigris, alis griseo-fuscis: nervis nigro-punctatis. T. 3. p. 562. t. 27. f. 3.

H. pectinicornis. L. S. N. p. 911.

197. H. viridis viridis nigro-maculatus, nervis alarum nigris. T. 2. p. 708. t. 22. f. 1 — 3. H. Chrysops. L. S. N. p. 912.

198. H. griseus, griseus susco-maculatus, alis albis nervis confertim susco-punctatis pilosisque. T. 2. p. 711. t. 22. f. 4 — 7.

H. hirtus. L. S. N. p. 912.

399. H. niger, niger hirtus, alis pallide fuscis, pedibus flavo-fuscis. T. 2, p. 713. t. 22 f. 8 — 11.

200. H. Phalaenoides, fusco-ferrugineus, thorace angulato, alis magnis latis postice excisis.

T. 2. p. 714. t. 22. f. 12. 13.

H. Phalaenoides. L. S. N. p. 912.

201. H. aquaticus, niger, thorace magno depresso, alis pallide fuscis nervis nigris. T. 2. p. 716. t. 22. f. 14 — 18. t. 23. f. 1 — 15. H. lutarius. L. S. N. p. 913.

BO. MYRMELEON.

202. M. immaculatum, alis hyalinis macula albida, corpore fusco maculis grifeis. T. 3. p. 564. t. 27. f. 8.

M. Formicalynx. L. S. N. p. 914.

203. M. maculatum, niger, collari luteo, alis grifeis nigro-maculatis nervisque flavis. T. 3. p. 569. t. 27. f. 9.

Hemerobius speciosus. L. S. N. p. 912?

11. PER-

MI. PERLA.

204. P. cinerea, fusco-nigricans, corpore elongato, alis longis cinereis nervis fuscis. T. 2. p. 730. t. 23 f. 16 — 18. t. 24. f. 1. 2.

205, P, fusca, fusca, pedibus rusis, antennis filiformibus, alis fuscis corpore duplo longioribus. T. 3. p. 567. t. 27. f. 4. 5.

Hemerobius testaceus. L. S. N. p. 912.

206. P. nasuta, flava, capite nasuto, alis hyalinis albis margine suscis corpore duplo longioribus. T. 3. p. 568. t. 27. f. 6. 7.

Hemerobius marginalis. L. S. N. p. 912.

Obf. utrum hic relinquendae 205, et 206, vel Termis generi inferendae dubius haeret generofiffimus Auctor. Conf. Tom. 7, p. 50.

207. P. cylindrica, oblonga cylindrica nigra, alis fuscis costis nigris, abdomine sulvo maculis lateralibus nigris. T. 7. p. 599. t. 44. f. 17 — 19.

12. PANORPA.

208. P. communis, flava nigraque, alis nigro-maculatis. T. 2. p. 733. t. 24. f. 3 — 11. t. 25. f. 1 — 3.

P. communis, L. S. N. p. 915.

13. RAPHIDIA.

209, R. communis, nigra, lineis abdominis flavidis, thorace cylindrico. T. 2. p. 742. t. 25. f. 4 — 0.

R. Ophiopsis. L. S. N. p. 916.

14. APIS.

210. A. muraria nitida, muraria, foemina violacea pilis cinereis, mare viridi-aureo lucido pi-

lis rufis. T. 2. p. 751. t. 30. f. 23 - 25.

t 32. f. 1 - 5.

ferrugineo, thorace abdomineque maculis fasciisque nigris. T. 3. p. 569. t. 28.

212. A. Vespisormis, glabra, lutea, capite postice nigro, thorace nigro lineis 4 longitudinalibus luteis, abdomine maculis lobatis nigris. T. 3. p. 570. t. 28. f. 3. 4.

213. A. cordata; nitida, viridis, alis hyalinis, abdomine cordato, tibiis posticis dilatatis.

T. 3. p. 572. t. 28. f. 5. 6.

A. cordata. L. S. N. p. 955.

214. A. leucothorax, hirfuta, higra, thorace luteo, alis nigro-violaceis, abdomine glabro.
T. 3. p. 573 t. 28. f. 7.

A. aestuans. L. S. N. p. 961.

215. A. aeneipennis, hirfuta, nigra, alis aeneis nitidis. T. 3. p. 573. t. 28. f. 8.

216. A. abdomen flavum, hirfuta, nigra, abdomine excepto primo fegmento, flavo, tibils possicis dilatatis. T. 3. p. 574. t. 28. f. o. 10.

A. furinamenfis. L. S. N. p. 961.

217. A. ferruginea, hirfuta, fusca, alis pallide fufcis, antennis pilisque ferrugineis. T. 3.

p. 575. t. 28. f. 11.

218. A. penfylvanica, hirfuta, nigra, thorace antice posiceque luteo, abdomine supra luteo apice nigro, alis nigro-suscis. T. 3.
p. 575. t. 28. f. 12.

dominisque basi gruso-flavis, alis suscis

T. 3. p. 576, t, 28, f. 13, 14.

- 220. A. Gigas, nigra, nitida, oculis fuscis, alis violaceo-viridibus aeneo-nitentibus. T. 3. p. 576. t. 28. f. 15.
- bro, thorace abdominisque apice flavo-rufis, alis violaceo-viridibus aeneonitentibus. T. 7. p. 605. t. 45. f. 1.
- bro, thorace postice citreo, alis suscessible. T. 7. p. 606. t. 45. f. 2.
- 229. A. citroneila, hirfuta, fupra flavo-citrea, fubtus nigra, alis fuscis nitidis cupreo-aeneis. T. 7. p. 606. t. 45. f. 3.
- s24. A. fulvo-ciulla, nigra, abdomine antice fafciis 2. transversis flavo-fulvis, alis hyalinis. T. 7. p. 607. t. 45. f. 4.
- maculis tibiisque albis, alis superioribus fuscis inferioribus hyalinis. T. 7. p. 607.

 t. 45. f. 5. 6.
- 226. A. fusiformis, nigra, abdomine conico acutissimo: segmentorum marginibus slavescentibus, alis brevioribus, antennis longis subulatis. T. 7. p. 608. t. 45. f. 7.

15. Nomada.

- 227. N. nigro-rufs, nigra, alis fuscis, antennis clavatis, abdomine rufo, ano nigro. T. 2. p. 755. t. 32. f. 6 12.
- 228. N. Surinamensis, antennis filiformibus, capite thoraceque nigris maculis hirsutis aureis nitidis, abdomine ruso, ano nigro, pedibus russ. T. 2. p. 759. t. 32. f. 13 16.

Apis ichneumonea. L. S. N. p. 959.

16. VESPA.

gris. T. 2. p. 766. t. 26. f. 1 — 17.

V, vulgaris. L. S. N. p. 949.

fubtus rufis. T. 2. p. 791. t. 27. f. 1 — 8.

a31. V. Crabro major, nigra luteaque, nucha, thoracis antica parte primoque antennarum articulo rufis. T. 2. p. 801. t. 27. f. 9. 10.

V. Crabro. L. S. N. p. 201.

232. V. maxillosa, nigro-fusca, antennis rusis, alis fusco-violaceis, abdominis petiolo elongato clavato, dentibus subulatis restis, lingua elongata. T. 3. p. 577. t. 29. f. 1. 2.

V. emarginata. L. S. N. p. 952.

bus, abdominis petiolò ovato, lingua inflexa. T. 3. p. 579. t. 29. f. 4 — 6.

Apis mexicana. L. S. N. p. 953.

234. V. sanadensis, ferrugineo-fusca, antennis medio nigris, alis ferrugineis, abdominis segmento primo obconico. T. 3. p. 580. t. 29. f. 7.

V. canadeníis. L. S. N. p. 952.

pite thoraceque fignaturis nigris, abdomine fasciis sulvis: petiolo elongato. T. 3. p. 581, t. 29, f. 8.

236. V. olivacea, griseo-olivacea, antennis rusis, thorace abdomineque lineis nigro-suscis, alis olivaceis. T. 3. p. 582. t. 29. f. 9.

pag. V. nigripennis, ferruginea, alis antennisque nigre-fuscis. T. 3. p. 582. t. 29. f. 10.

238. V. annularis, nigro-fusca, thoracis lateribus nigris, abdomine fascia tarsisque flavis. T. 3. p. 583. t. 29. f. 11.

V. annularis. L. S. N. p. 950.

239. V. cinda; nigra, alis fusco-violaceis, thorace maculis 3. abdomine fascia sulphureis. T. 3. p. 584. t. 29: f. 12.

V. quadricornis. L. S. N. p. 951.

apiceque abdomineque postice sulphureomaculatis. T. 3. p. 584. t. 29. f. 13.

V. maculata. L. S. N. p. 948.

241. V. carbonaria, nigra, antennis, labio superiore, abdominisque apice ferrugineis, alis superioribus obscure violaceis, inferioribus fuscis. T. 7. p. 609. t. 45. f. 9.

V. capenfis. L. S. N. p. 952:

242. V. petiolata, nigra, capite, antennis tibiisque ferrugineis, alis fulvis apice nigris, abdomine maculis 2. flavis, petiolo longiffimo.
T. 7. p. 610. t. 45. f. 10:

Sphex capenfis. L. S. N. p. 942:

17. SPHEX.

Fam. I.

243. S. interrupte-fascidta, nigra, antennis fractis dimidio flavis, abdominis fasciis 4. flavis: tribus primis interruptis. T. 2. p. 807. t. 25. f. 10 — 15.

Vefpa cribraria. L. Faun, Suec. 1675. 3.

244. S. cribraria, nigra, antennis fractis nigris, pedibus flavis, abdominis fasciis flavis 2. primis interruptis, lamina cartilaginea concava

tava pedum anteriorum in mare. T. 2. p. 810. t. 28. f. 1 -- 5.

cribraria. L. S. N. p. 573.

5. S. clavata, nigra, petiolo longo clavato, antennis fractis, pedibus rufis, abdominis fasciis 3. punctisque 2. maculaque thoracis flavis. T. 2. p. 820.

ipa arveniis. L. S. N. p. 950.

6. S. americana aptera, aptera, nigra, villola. thorace maculis 6. albis: abdomine 4. ru-. bris lineisque 3. albis. T. 3. p. 591. t. 30. f. 10 - 12.

ntilla americana. L. S. N. p. 966.

Fam. 2.

7. S. rufa fasciata, nigra, antennis filiformibus petiolo brevi, abdomine antice rufo lineis nigris, postice nigro, alis fuscis. T. 2. p. 822. t. 28. f. 6.

fusca. L. S. N. p. 944.

8. S. sabulosa, nigra, antennis filiformibus petiolo longo, abdomine antice rufo, alis brevibus. T. 2. p. 822. t. 28. f. 7 - 15.

sabulosa. L. S. N. p. 941.

o. S. viatica, nigra, hirfuta, antennis filiformibus, petiolo longiusculo, abdomine antice rufo postice nigro, alis fuscis. T. 2. p. 830, t, 28, f, 16,

viatica. L. S. N. p. 943.

o. S. rufipennis, nigra, antennis pedibusque ferrugineis, alis rufo aureis nitidis basi nigris apice violaceis. T. 7. p. 611. t. 45. f. 11.

I. S. auripennis, nigro-coerulea nitida, alis ferrugineo-aureis basi nigris apice albicantibus, antennis apice ferrugineis. T. 3. p.

585, t, 30, f, 1,

S. coe«

- S. coerulea. L. S. N. p. 947.
- 252. S. penfylvanica, nigra, alis violaceis apice fufcis, abdominis petiolo filiformi, maxillis longiffimis incurvatis. T. 3. p. 586. t. 30. f. 2. 3.
- S. penfylvanica. L. S. N. p. 9411
- 253. S. indica, atra, alis obscure violaceis, capite antennis pedibusque fulvis. T. 3. p. 587.
- S. indica. L. S. N. p. 945.
- 254. S. flavo-maculata, nigra, alis fuscis, abdominis nis petiolo longissimo, thorace, abdominis basi pedibusque flavo-maculatis. T. 3. p. 588. t. 30. f. 4.
- abdomine antice ferrugineo postice nigro, petiolo elongato. T. 3. p. 589. t. 30. f. 5.
- 256. S. coerulea, nigro-coerulea nitida, antennis nigris, alis fusco-violaceis, abdominis petiolo elongato. T. 3. p. 589. t. 30. f. 6.
- S. coerulea. L. S. N. p. 941.
- 257. S. depressa, nigra, capite lato depresso, als externis fuscis, abdomine gibbo: petiolo depresso maculis 2. flavis. T. 3. p. 590. t. 30. f. 7 9.
- 18. CHRYSIS.
- 258. Ch. coccinea, nitida, viridis, thorace possice coeruleo, abdomine coccineo-aurato apice quadridentato. T. 2. p. 832. t. 28. f. 17
- Ch. ignita. L. S. N. p. 947.
- 259. Ch. coerulea, nitida, coeruleo viridis, abdomine macula magna nigra nitida, alarum apici-

apicibus nigris. T. 2. p. 837. t. 29. f. 3

Ch. bidentata. L. S. N. p. 947.

19. SIREX.

260. S. Gigas, abdomine dimidio nigro dimidioque flavo, thorace nigro, antennis pedibusque flavis. T. 1. p. 564. t. 36. f. 1 — 5.

S. Gigas. L. S. N. p. 928.

261. S. Penfylvanica, capite thoraceque ferrugineis, abdomine atro supra fasciis transversis flavis. T. 7. p. 593. t. 30. f. 13.

S. Columba. L. S. N. p. 929.

262. S. Spectrum, niger, pedibus ferrugineis. T. 1. p. 567. t. 36. f. 6.

S. Spectrum. L. S. N. p. 929.

263. S. Iuvencus, nigro-coeruleus nitidus, pedibus luteis. T. 1. p. 568. t. 36. f. 7.

S. Iuvencus. L. S. N. p. 929.

20. ICHNEVMON.

Fam. 1.

264. 1. refinosus, niger, abdomine elongato cylindrico, pedibus ferrugineis: posticis nigris.

T. 2. p. 844. T. 1. p. 473. t. 36. f. 9.

265. I. rugosus, capite thoraceque rusis, abdomine cylindrico rugoso nigro, alis obscure susciss.

T. 3. p. 597. t. 30. f. 18. 19.

Fam. 2.

266. I. (pinosus, thorace ferrugineo bispinose, alis maculis 2. fuscis, abdomine nigro fasciis 3. albis. T. 3. p. 596. t. 30. f. 16. 17.

1. ariolator. L. S. N. p. 933.

I. ni

- I. niger, abdomine ovato elongato, pedibus aurantiis, antennis medio luteis, thorace maculis flavis. T. 1. p. 580. t. 23. f. 16. an mas?
- 268. I. nigro-caudatus, abdomine fusiformi flavo, thorace nigro-flavo-maculato, ano nigro, pedibus flavis. T. 2. p. 848. t. 29. f. 9.
- 269. 1. cinclipes, niger, abdomine fusiformi, pedibus ferrugineus: articulis tribus mediis tarsorum posticorum flavis. T. 2. p. 849. t. 29. f. 10. 11.
- 270. I. rufus, totus rufus, corpore fusiformi, antennis longissimis fuscis. T. 7. p. 569. t. 44. f. 13.

Fam. 3.

- 271. 1. fulvus, abdomine falcato fulvo, oculis viridibus nitidis. T. 2. p. 850. t. 29. f. 15

 26.
- L. luteus. L. S. N. p. 937.
- 272. I. cantator, niger, abdomine falcato: medio rufo, alis abbreviatis, tibiis anticis rufis posticis nigris, oculis aeneis. T. 7. p. 594. t. 44. f. 9 12.

Fam. 4.

273. I. niger, abdominis articulo ultimo globoso, totus niger, tibiis posticis suscis. T. 1, p, 577. t. 36. f. 12 — 13.

Fam. 5.

- petiolo longo thoracis dorso imposito, pedibus posticis longis clavatis. T. 1. p. 571. t. 30. f. 10. 11.
- 279. I. appendigaster, niger, abdomine brevissimo compresso truncato; petiolo longo thora-

cis

cis dorso imposito, pedibus posticis longissimis. T. 3. p. 594. t. 30. f. 14. 15.

Fam. 6.

276. I. gosspinus, niger, antennis filiformibus, pedibus luteis, abdomine fubtus viridescente.
T. 2. p. 862. t. 29. f. 13. 14.

I. globatus. L. S. N. p. 940.

277. I. Aranearum, niger, antennis filiformibus, thorace lineis 2. pedibusque flavis. T. 2. p. 863. t. 30. f. 1 — 3.

278. I. Aphidum, niger, antennis filiformibus, ore flavescente, pedibus susco-nebulosis. T. 2. p. 866. t. 30. f. 4 — 13.

L. Aphidum. L. S. N. p. 940.

279. I. Pellionellae, niger, antennis filiformibus, pedibus rufis. T. 2. p. 875. t. 30. f. 14 — 19.

Fam. 7.

- 280. I. aureus Bedeguaris, antennis fractis clavatis nigris, capite thoraceque aeneis, abdomine purpureo-nitido, pedibus flavis. T. 2. p. 877. t. 30. f. 20. 21.
- I. Bedeguaris. L. S. N. p. 939.
- 281. I. rufescens, rufus, antennis fractis clavatis, thorace postice abdomineque nigris, macula alarum magna susca. T. 2. p. 882. t. 30. f. 22.
- 282. I. Puparum, faltator, aeneus, antennis fra-£tis clavatis, pedibus flavis, alarum nervo longitudinali appendiculato. T. 2. p. 883. T. 1. p. 604. t. 35. f. 14 — 17. p. 607. t. 32. f. 17 — 22.
- 283. I. Apum, faltator, nigro-viridescens, antennis fractis clavatis, pedibus fuscis nigro-maculatis. T. 2. p. 887. t. 30. f. 24 31.

284. I. aeneus myriventris, saltator, antennis fra-Leis clavatis, capite thoraceque aeneis, abdomine nigro macula susca, pedibus slavescentibus. T. 2. p. 889. t. 31. f. 1—9.

285. I. aeneus globiceps, faltator, aeneus, antennis fractis clavatis, capite globoso, pedibus flavis, abdominis medie flavo punctis 6. nic gris in mare. T. 2. p. 896. t. 31. f. 10

Fam. 8.

286. I. fuscus ramicornis, fusco-nigricans, antennis ramosis. T. 1. p. 588. t. 35. f. 1 — 7.

L. pestinicornis. L. S. N. p. 941.

287. I. aeneus ramicornis, faltator aeneus, antennis mari ramosis, pedibus flavis. T. 2. p. 899. t. 31. f. 14 — 17.

Fam. 9.

288. I. fuscicornis, niger, apterus, abdomine ovali, antennis pedibusque fuscis. T. 2. p. 903.
t. 31. f. 18.

289. I. ruficornis, niger, apterus, abdomine ovali, antennis pedibusque ferrugineis. T. 2. p. 906.

290. I. nigricornis, ferrugineus, apterus, capite ano antennisque nigris. T. 2. p. 907. t. 31. f. 19 — 21.

Mutilla Acarorum. L. S. N. p. 968.

291. 1. vesicularis, faltator, apterus, nigro-aeneus, antennis fractis clavatis pedibusque flavis nigrisque. T. 2. p. 909. t. 31. f. 22.

21. CYNIPS.

292. C. Potentillae, capite thoraceque nigris, abdomine pedibusque rufis nitidis. T. 2. p. 898. t. 31. f. 12. 13.

22. TEN-

. TENTHREDO.

Fam. 1.

3. T. lutea, antennis capitatis, fusca, abdomine flavo fasciis striisque nigro-coerulescentibus. T. 2. p. 934. t. 33. f. 8 — 16.

Intea. L. S. N. p. 921,

4. T. femorata, antennis capitatis, nigra, abdominis macula flava, antennis pedibusque obscure luteis. T. 2. p. 944. t. 34. f. 1 — 8.

femorata. L. S. N. p. 920.

5. T. rufa, antennis capitatis, nigra, abdomine fubtus lateribusque rufis, pedibus fulvis. T. 2. p. 948. t. 33. f. 17 — 24.

amerinae. L. S. N. p. 921.

6. T. quadrifasciata, antennis capitatis capitulo ferrugineo, nigra, segmentis abdominalibus 4. slavescentibus: primo interrupto. T. 3. p. 598. t. 30. f. 20.

Fam. 2.

ridi-coerulea nitens, pedibus flavis, alis flavescentibus macula fusca. T. 2. p. 1016. t. 38. f. 32 — 34.

nitens. L. S. N. p. 922.

g. T. nigripes, antennis clavatis 3. articulatis, nigro-coerulescens nitida, antennis pedibusque nigris, alis fusco-hyalinis. T. 2. p. 1018. t. 39. f. 14 — 20.

ustulata. L. S. N. p. 922.

T. Rosae, antennis clavatis 3. articulatis, flava, capite thoraceque nigris, alis superioribus nigro-marginatis. T. 2. p. 1021. t. 39. f. 21 — 29.

Rofae. L. S. N. p. 925.

300. T. coeruleipennis, antennis clavatis 3. articulatis nigris, corpore alisque nigro-coeruleis nitidis. T. 2. p. 1025. t. 40. f. 1 — 6.

301. T. americana, antennis crassioribus 7. nodiis, thorace slavo, abdomine coeruleo nitido, alis violaceis. T. 3. p. 598. t. 30. f. 21.

T. americana. L. S. N. p. 921.

Fom. 3.

gra, fasciis abdominis flavis, pedibus luteis. T. 2. p. 951. t. 34. f. 9 — 19.

T. ruftica. L. S. N. p. 923.

303. T. goffypina, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, macula magna rufescente thoracis, T. 2. p. 956. t. 35. f. 1 — 13.

T. ovata. L. S. N. p. 924.

304. T. pulverata, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, fegmentis abdominis albo marginatis, femoribus ferrugineis. T. 2. p. 963. t. 34. f. 20 — 25.

305. T. rufo-cincla, antennis filiformibus 9. nodiis, abdomine elongato cylindrico nigro: cingulo pedibusque rufis. T. 2. p. 967. t. 35.

f. 14 - 18.

306, T. papillosa, antennis filiformibus 9. nodiis, capite thoraceque nigris, abdomine flavo fuperne serie punctorum nigrorum. T. 2. p. 982. t. 37. f. 1 — 11.

307. T. Salicis, antennis filiformibus 9. nodiis, abdomine pedibusque flavis, capite, antennisque thoraceque nigris, Salicis, T. 2. p. 991. t. 37. f. 12 — 22.

T alicis. L. S. N. p. 924.

308. T. Betulae, antennis filiformibus 9. nodiis, abdomine pedibusque flavis, capite, antennis

nis thoraceque nigris, Betulae. T. 2. p. 994. t. 37. f. 23.

- Obs. Simillima Tenthr, Salicis, sed minor et Larva diversa.
- 309. T. largipes, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, abdomine rufo, ano nigro, pedibus posticis longis latis compressisque. T. 2. p. 995. t. 37. f, 24 28.
- T. feptentrionalis. L. S. N. p. 926.
- 310. T. nigrata, antennis filiformibus 9, nodiis nigris, rufa, abdomine annulis nigris. T. 2. p. 1000. t. 38. f. 2 4.
- 311. T. Pini, antennis filiformibus 9. nodiis nigra, pedibus viridi-nigroque variegatis, thorace maculis 2. lateralibus viridibus. T. 2. p. 1001. t. 38. f. 5 7.
- 312. T. viridi dorsata, antennis filiformibus 9. nodiis, superne susco-nigricans: inferne testacea. T. 2. p. 1002. t. 38. f. 8 — 10.
- 313. T. limacina, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, pedibus fuscis, alis nigrescentibus.

 T. 2. p. 1007. t. 38. f. 16 25.
- T. Cerafi. L. S. N. p. 923.
- 314. T. Salicis pentandrae, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, pedibus flavis, alis superioribus nigro-marginatis. T. 2. p. 1009. t. 39. f. 1—11.
- 315. T. Salicis cinereae, antennis filiformibus 9. nodiis, nigra, pedibus abdomineque fubtus testaceis. T. 2. p 1013. t. 38. f. 26 — 31.
- nigra, thorace subtus ruso, alis suscis rubris. 1.3. p. 599. t. 30. f. 22.

Fam. 4.

317. T. pelinata major, antennis pelinatis, pedibus grifeis, mare nigro, foemina grifea, capite maculisque nigris. T. 2. p. 971. t. 36. f. 1 — 30.

T. Pini. L. S. N. p. 922.

318. T. pedinata minor, antennis pedinatis, pedibus grifeis, mare nigro, abdomine fubtus pallide fusco, fuemina testacea abdomine viridi subtus nigro lineata, capite grifeo.

T. 2. p. 983. t. 35. f. 24 — 27.

319. T. petinata rufa, antennis petinatis, mare nigro, abdomine fubtus pedibusque rufis, foemina tota rufa immaculata. T. 2. p. 986.

Fam. 5.

pore coeruleo-viridescente nitido, capite flavo. T. 2. p. 1038. t. 40. f. 19 — 20.

T. erythrocephala. L. S. N. p. 926.

321. T. fulva, antennis fetaceis 24. nodiis, abdomine fulvo, oculis, thorace anoque nigris, macula alarum fusca. T. 2. p. 1039.

T. Betulae: L. S. N. p. 927.

322. T. flaviventris, antennis setaceis 24. nodiis, nigra, pedibus flavis, abdomine postice flavo fusco-striato. T. 2. p. 1040. t. 40. f. 22.

323. T. fulvipes, antennis setaceis 30. nodiis slavis, corpore nigro, pedibus sulvis. T. 2. p. 1040. t. 40. f. 23.

T. sylvatica. L. S. N. p. 926.

23. FORMICA.
Fam. 1.

324. F. rufa, rufa, capite abdomineque fuscis, petiolo abdominis squamifero. T. 2. p. 1053. t. 41. f. 1 — 22. t. 42. f. 1 — 11.

F. ru-

F. rufa. L. S. N. p. 962.

325. F. pratensis, rufa, capite abdomineque nigris, petiolo abdominis squamifero. T. 2. p. 1080.

326. F. nigra major, nigra rutens, petiolo abdominis squamifero. T. 2. p. 1082. t. 42.
f. 12 — 15.

F. fusca. L.S. N. p. 963.

327. F. nigra minor, nigra, pedibus dimidioque antennarum fusco-flavescentibus, petiolo abdominis squamifero. T. 2. p. 1085. t. 42. f. 16 — 23.

F. nigra. L. S. N. p. 963.

328. F. flava, flava, petiolo abdominis squamisero. T. 2. p. 1089. t. 42. f. 24 — 28.

329. F. bidens, rufo-fusca, antennis ferrugineis: articulo infimo nigro, capite ovato, thoracis gibbere bidentato, petiolo squama erecta. T. 3. p. 600. t. 31. f. 1 — 2.

F. bidens. L. S. N. p. 964.

330. F. maxillofa, alata, nigro-fusca, pedibus maxillisque porrectis rusis, squama petiolari conica. T. 3. p. 601. t. 31. f. 3 — 5.

F. haematoda. L. S. N. p. 965.

331. F. lobata, alata, nigra, maxilfis porrectis, abdominis primo fegmento contractiore, fquama petiolari magna excavata. T. 3. p. 602. t. 31. f. 6 — 8.

F. foetida. L. S. N. p. 965.

332. F. pensylvanica, nigra, pedibus fuscis, capite magno ovato gibbo, squamula petiolari lenticulari. T. 3 p. 603. t. 31. f. 9. 10.

333. F. futvo-pitosa, nigra, opaca, abdomine pilis fulvis: petiolo squama erecta. T. 7. p. 613. t. 45. f. 13 — 14.

Fam.

Fam. 2.

334. F. rubra aculeata, rufo-flava, aculeata, thorace bispinoso. T. 2. p. 1093. t. 43. f.

F. rubra. L. S. N. p. 963.

gas, F. fusica aculeata, ruso-susce, capite thoraceque suscess, aculeata, thorace bispinoso.

T. 2. p. 1105. t. 43. f. 15 — 22.

F. caespitum. L. S. N. p. 963.

g36. F. migratoria, fusco-castanea, capite didymo magno utrinque postice spinoso, thorace 4. spinoso. T. 3. p. 604. t. 31. f. 11 — 13.

F. cephalotes. L. S. N. p. 964.

337. F. fexdens, rufa, capite magno didymo utrinque postice spinoso, thorace sexspinoso, T. 3. p. 607. t. 31. f. 14 — 16.

F. fexdens. L. S. N. p. 964.

338. F. quadridens, atra nitida, capite magno depresso marginato utrinque bispinoso, thorace quadrispinoso. T. 3. p. 609. t. 31. f. 17 — 20.

F. atrata. L. S. N. p. 965.

339. F. foetida, alata rufa, maxillis porrectis incurvatis, thorace fusco bispinoso, abdomine antice ruso postice nigro. T. 3. p. 611. t. 31. f. 21. 22.

340. F. pusilla, rufa, abdomine susco, pedibus tescaceis, thorace bidentato. T. 3. p. 611. t. 31. s. 23. 24.

F. omnivora. L. S. N. p. 964.

24. THRIPS.

341. T. Physapus, atra, alis albis, antennis sexnodiis, T. 3. p. 6, t. 1. f. 1 — 4.

T. Physapus. L. S. N. p. 743.

culis

342. T. Iuniperina, griseo-fusca, oculis nigris, alis albescentibus. T. 3. p. 10. t. 1. f. 5 - 7.

T. Iuniperina. L. S. N. p. 743.

343. T. Corticis, nigra, alis hyalinis niveis barbis (fimbriis) longiffimis, antennis 8. nodiis.
T. 3. p. 11. t. 1. f. 8 — 13.

344. T. fasciata, alis fasciis 3. transversis albis, an-

tennis annulo albo. T. 3. p. 18.

25. APHIS.

Fam. I.

345. A. Pruni, dilute viridis albo-farinosa, corniculis brevioribus, Pruni. T. 3. p. 49. t. 2. f. 1 — 13.

346. A. Pomi, flavo-viridis, corniculis longioribus, pedibus antennisque nigrefeentibus, Pomi.

T. 3. p. 53. t. 3. f. 18 - 23.

347. A. Iuniperi, obscure susca cinereo-maculata, corniculis brevioribus grossis. T. 3. p. 56. t 4. f. 7 — 9.

farinofa, corniculis brevioribus, Viciae
Craccae. T. 3. p. 58. t. 2. f. 14 — 19.

A. Viciae Craccae. L.S. N. p. 735.

349. A. Millefolii, viridis nigro-maculata, pedibus antennisque nigris, corniculis longioribus, Millefolii. T. 3. p. 60. t. 4. f. 1 — 6.

355. A. Rosae, viridis, corniculis longissimis Rosae. T. 3. p. 65. t. 3. f. 1 — 13.

A. Rofae. L. S. N. p. 734.

251. A. Salicis farinosa, obscure viridis, tuberculis lanuginosis albis, corniculis longioribus.

T. 2. p. 76. t. 4 f. 10 — 13.

352. A. Tiliae nigro-punctata, flavo-viridis, lineis punctis nigris, alis nigro-maculatis, corni-

culis brevioribus, Tiliae. T. 3. p. 77. t. 5. f. 1 - 6.

A. Tiliae Europaeae. L. S. N. p. 734. Fam. 2.

353. A. nuda Pini, fusca tuberculata, pedibus nudis, Pini. T. 3. p. 27. t. 6. f. 1 — 18.

A. Pini sylvestris. L. S. N. p. 736.

354. A. tomentosa Pini, nigra albo-farinosa, tuberculata, pedibus villoso-tomentosis, Foliorum Pini. T. 3. p. 39. t. 6. f. 19 — 25.

355. A. Betulae nigro-punciata, ecorniculata, viridis, dorfo tuberculis nigris, Betulae. T. 3. p. 45. t. 3. f. 27. 28.

A. Betulae albae. L. S. N. p. 735.

356. A. Alni, flavescenti-alba, tuberculata, Alni. T. 3. p. 47. t. 3. f. 15 — 18.

357. A. Foliorum Ulmi, nigricans, tuberculata, foliorum volutorum Ulmi. T. 3. p. 81. t. 5. f. 7.

A. Ulmi campestris. L. S. N. p. 733.

358. A. Gallarum Ulmi, nigricans, corniculis nullis, Gallarum Ulmi. T. 3. p. 89. t. 4. f. 15 — 17.

359. A. Tremulae, coeruleo-nigra tomentofa, corniculis nullis, Populi tremulae ramulorum.
T. 3. p. 94. t. 7. f. 1 — 7.

360. A. Xylostei, tomentosa, corniculis nullis, Lonicerae Xylostei. T. 3. p. 96. t. 7. f. 8

361. A. Gallarum Abietis, tomentofa, corniculis nullis, Gallarum Abietis. T. 3. p. 99. t. 8. f. 1 — 29.

Chermes Pini Abietis. L. S. N. p. 738.

26. CHEK-

26. CHERMES.

362. Ch. Urticae, fusca l. virescens, abdominis lateribus albo-maculatis, Urticae. T. 3. p. 134. t. 9. f. 17 — 26. t. 10. f. 1 — 7.

Ch. Urticae dioicae. L. S. N. p. 738.

363. Ch. Pyri, viridi-fusca, maculis fasciisque obfeuris, alis susco-maculatis, Pyri. T. 3. p. 141. t. 9. f. 1 — 16.

Ch. Pyri communis. L. S. N. p. 737.

364. Cb. Alni, lanata, viridis, Alni. T. 3. p. 148. t. 10. f. 8 — 20.

Ch. Betulae Alni. L. S. N. p. 738.

27. CICADA.

Fam. 1.

365. C. laternaria surinamensis, fronte rostrata ovali recta gibbosa, alis lividis: posticis ocellatis. T. 3. p. 195.

Fulgora laternaria. L. S. N. p. 703.

adscendente: punctis albis, alis superioribus viridibus luteo-maculatis, posticis davis apice nigris. T. 3. p. 197.

Fulgora candelaria. L. S. N. p. 703. ...

367. C. laternaria fusca, fusca fronte rostrata subulata recta apice truncata, alis superioribus punctis nigris sparsis. T. 3. p. 200. t. 32. f. 1.

368. C. filirostris, griseo-fusca subtus flavescens, fronte rostrata filisormi adscendente. T. 3. p. 201. t. 3.. f. 2. 3.

Fulgora phosphorea. L. S. N. p. 704.

369. C. conirostris, viridis, fronte rostrata conica adscendente, alis hyalinis. T., 3. p. 202. t. 32. f. 4. 5.

Fn

Fulgora noctivida. L. S. N. p. 704.

370. C. brevirostris, supra viridis subtus slava, fronte rostrata obtusa brevi. T. 3. p. 203. t. 32. f. 6.

Fulgora lucernaria. L. S. N. p. 704.

371. C. Folium ambulans, flavo-viridis, fronte roftrata brevi recta, alis ampliffimis verticalibus compressis. T. 3. p. 204. t. 32. f. 7. 8.

Fam. 2.

372. C. foliata-fasciata, nigro-fusca, thorace compresso foliaceo verticali: fascia arcuque albis. T. 3. p. 205. t. 32. f. 9.

C. foliata. L. S. N. p. 705.

373. C. foliata-arcuata, nigro-fusca, thorace compresso foliaceo vorticali: arcu slavescente.

T. 3. p. 206. t. 32. f. 10 — 13.

374. C. foliata-fusca, nigro-fusca tota, thorace compresso foliaceo verticali. T. 3. p. 208. t. 32. f. 14.

375. C. foliata-sinuosa, fusca, thorace compresso foliaceo: margine sinuoso, apice rostrato.

T. 3. p. 208. t. 32. f. 15. 16.

C. fronditia. L. S. N. p. 705.

vato antice posticeque acuto, pedibus quatuor primoribus latis compressis. T. 3. p. 209. t. 32. f. 17—18.

C. fquamigera. L. S. N. p. 705.

277. C. gibbosa, nigra, elytris flavo-livitis, pedibus fulvis, thorace carinato gibbo: antice obtuso, postice acuto. T. 3. p. 211. t. 32. f. 20. 21.

Fam!

Fam. 3.

278. C. cornuta, fusca, thorace bicorni postice subulato longitudine abdominis. T. 3. p. 181. t. 11. f. 22. 23.

C. cornuta. L. S. N. p. 705.

379: C. angulata, nigra albo-maculata, thorace quadrangulato postice subulato longitudine abdominis. T. 7. p. 613. t. 45. f. 15.

Fam. A.

980. C. Lyricen, thorace antice viridi postice fulvo maculis nigris, alis hyalinis venis susciss: margine dilatato viridi. T. 3. p. 212. t. 32. f. 22 — 26.

C. Tibicen. L. S. N. p. 707.

381. C. nigro-lineata, fulva, thorace linea nigra, alis linea flexuosa fusca: margine maculiso que hyalinis. T. 3. p. 219. t. 33. f. 1.

C. repanda. L. S. N. p. 707.

282. C. occilata, viridis fusco-fulvoque maculata, alis superioribus ocellis maculisque suscis albidisque: inferioribus sulvis fascia slexuosa nigra. T. 3. p. 220. t. 33. f. 2. 3.

383. C. nitida, griseo-viridis, alis hyalinis nitidissimis, femoribus anticis tridentatis. T. 3.

p. 220. t. 33. f. 4. 5.

284. C. fanguinea, alis superioribus suscis, fronte abdomine thoracisque maculis binis sanguineis. T. 3. p. 221, t. 33. f. 17.

Fam. 4.

#85. C. Spumaria Graminis, fusca, alis superioribu maculis albis. T. 3. p. 163. t. 11. f. #

C. fpumaria. L. S. N. p. 708.

386. C. Spumaria Salicis, grisea, pedibus ruso-testa ceis. T. 3. p. 180.

F

387. C. nervoso-punclata, griseo-fusca, alis hyalinis fusco-maculatis: nervis susco-punctatis.

T. 3. p. 182. t. 12. f. 1 — 5.

C. nervofa. L. S. N. p. 709.

388. C. undata, flava, thorace fusca, alis superioribus fascia undata susca. T. 3. p. 185. t.

389. G. trifasciata, nigro-fusca, fasciis tribus transversis albis, capite subtus slavo. T. 3. p. 186. t. 11. f. 25.

C. bifafciata. L. S. N. p. 706.

binis nigris interruptis longitudinalibus, pedibus flavis. T. 3. p. 186. t. 12. f. 6

C. interrupta. L. S. N. p. 710.

391. C. Musciformis Ulmi, viridi-lutea, abdomine nigricante, alis superioribus apice nigricantibus. T. 3. p. 188. t. 12. f. 12 — 19.

C. Ulmi. L. S. N. p. 711.

392. C. Musciformis Rosae, viridi-lutea, abdomine luteo l. viridi, alis albidis apice hyalinis.
T. 3. p. 193.

C. Rofae. L. S. N. p. 712.

393. C. Phalaenoides, flava, alis ampliffimis deflexis albidis nigro-punctatis. T. 3. p. 222. t. 33. f. 6. 7.

C. Phalaenoides. L. S. N. p. 710.

394. C. rubra, rubra, alis deflexis fuscis: fasciis 2, flavis. T. 3. p. 224. t 33. f. 8 — 10.

C. rubra. L. S. N. p. 711.

395. C. quadrifasciata, flava, fasciis 4. transversis nigris. T. 3. p. 225. t. 33. f. 11.

C. 4fasciata, L.S. N. p. 706.

396. C. collaris, flavo-fulva, thorace fascia rubra pallida, antennis longioribus. T. 3. p. 226. t. 33. f. 12. 13.

397. C. marginata, fusca, utrinque linea laterali flava, alis posticis nigris. T. 3. p. 226. t. 33. f. 14.

398. C. reticulata, fusco-testacea, capite obtuso, thorace linea alba, alis albo-reticulatis, tibiis posticis nigro-maculatis. T. 3. p. 227. t. 33. f. 15. 16.

399. C. nigra, nigra tota, abdomine subtus obscure rubro, alis magnis deslexis. T. 7. p. 615. t. 45. f. 17.

28. CIMEX.

400. C. juniperinus, ovatus, viridis, elytrorum marginibus fcutellique apice flavis. T. 3. p. 231. et 253. t. 13. f. 1 — 8.

C. juniperinus. L. S. N. p. 722.

401. C. rufipes, ovatus, fuscus, thorace angulatofpinoso, scutelli apice pedibusque rubris. T. 3. p. 253.

C. rufipes. L. S. N. p. 719.

402. C. haemorrhoidalis, ovatus, viridis, fubtus pallide flavus, thorace obtufe fpinoso, elytris macula fusca, abdomine supra rubro: maculis nigris. T. 3. p. 254. t. 14. f. 7. 8.

C. haemorrhoidalis. L. S. N. p. 720.

403. C. Verbasci, ovatus, griseo-fuscus, antennis albo-nigroque-maculatis, scutelli apice glauco, abdomine supra nigro: margine flavo-maculato. T. 3. p. 257. t. 14. f. 3 — 5.

C. Baccarum. L. S. N. p. 721.

- 404. C. purpureipennis, ovatus, flavo-viridis, thorace angulato, elytris pallide purpureis, antennis nigris, pedibus roseis. T. 3. p. 258. t. 13. f. 15.
- 405. C. bidens, ovatus, fuscus, thorace spinis longioribus: subtus maculis rubris, antennis rusis, abdomine subtus macula nigra. T. 3. p. 259. t. 13. f. 9.
- C. bidens. L. S. N. p. 718.
- 406. C. dentatus, ovatus, fusco-viridis, subtus flavescens, thorace linea transversa flava, elytris rubro-marginatis, and bidentato rubro. T. 3. p. 260.
- 407. C. Betulae, ovatus, viridi-l. rubro-grifeus, feutello macula nigra, antennis grifeis apice nigris, abdominis lateribus flavo-nigro-que variis. T. 3. p. 261. t. 14. f. 9 II.

C. grifeus. L. S. N. p. 721.

408. C. viridis totus, ovatus, viridis, fubtus viridi-grifeus, pedibus concoloribus. T. 3. p. 266.

C. prafinus. L. S. N. p. 722.

409. C. oleraceus, ovatus, coeruleo-aeneus, thorace lineola, fcutelli apice elytrisque punero albo rubro-ve. T. 3. p. 266. t. 15. f. 22. 23.

C. oleraceus, L. S. N. p. 722.

410. C. coeruleus, ovatus, aeneo-coeruleus nitidus totus. T. 3. p. 268.

C. coeruleus, L. S. N. p. 722.

411. C. bicolor, ovatus, niger nitidus, thorace elytris tibiisque spinosis albo-maculatis. T. 3. p. 268.

6, bicolor. L. S. N. p. 722.



412. C. niger spinipes, ovatus, niger nitidus, tibiis fpinosis, elytrorum parte membranacea fusca, alis albidis. T. 3. p. 269.

413. C. punctatus, ovatus, niger subaeneus, thorace obtuse spinoso, tibiis annulo albo.
T. 3. p. 269.

C. punetatus. L. S. N. p. 720.

414. C. grifeus nigro-punctatus, ovatus, grifeus albomarginatus nigroque punctatus, abdomine aeneo-nigro. T. 3. p. 270.

415. G. rostratus, ovatus, grifeus punctatus, fasciis longitudinalibus fuscis, capite magno triangulari longitudine thoracis. T. 3. p. 271. t. 14. f. 12. 13.

C. acuminatus. L. S. N. p. 723.

416. C. fanguineus, ovatus, rubro-fanguineus, elytris fingulis macula nigra, thorace medio fcutelloque nigris. T. 7. p. 616. t. 46. f. 1.

Fam. 2.

endits.

417. C. valgus, oblongus, nigro-fuscus, thorace fpinis 2. majoribus, femoribus posticis incurvis, tibiis posticis unidentatis. T. 7. p. 618. t. 46. f. 6.

C. valgus. L. S. N. p. 720.

418. C. capensis ruber, oblongus, ruber totus, thorace linea transversa nigra, semoribus rubris apice nigris, elytrorum parte membranacea susca. T. 7. p. 619. t. 46. f. 7. 8.

419. C. auriculatus, oblongo-ovatus fuscus, thorace obtuse angulato, antennis grossis clavatis medio rubris, abdomine supra rubro,

T. 3. p. 273. C. marginatus. L. S. N. p. 719. 420. C. Hyoscyami, oblongus, ruber nigro-maculatus, elytrorum parte membranacea fusca immaculata. T. 3. p. 274. t. 14. f. 14

C. Hyofcyami. L. S. N. p. 726.

421. C. equestris, oblongus, ruber nigro-maculatus, elytrorum parte membranacea susca albo-maculata. T. 3. p. 276.

C. equeftris. L. S. N. p. 726.

422. C. apterus, oblongus, ruber nigro-maculatus, elytris abbreviatis, alis nullis. T. 3. p. 276.

C. apterus. L. S. N. p. 727.

423. C. litteralis, ovatus, nigricans, dorso gibbo, elytris maculis dilute fuscis diaphanis, alis brevissimis. T. 3. p. 278. t. 14. f. 17—21.

C. littoralis. L. S. N. p. 717.

424. C. Pini, oblongus, niger, thorace postice elytrisque fuscis punctatis macula nigra. T.3. p. 278. t. 14. f. 22.

C. Pini. L. S. N. p. 729.

425. C. Gallarum Ulmi, oblongus, niger, antennis brevioribus, elytris fuscis macula flavescente albaque. T. 3. p. 279.

mine supra rubro, femoribus posticis subtus dentatis. T. 3. p. 280. t. 14. f. 23. 24.

C. calcaratus. L. S. N. p. 730.

Fam. 3.

427. C. quisquilius, oblongus, obscure fuscus, antennis setaceis capillaceis, rostro brevi arcuato. T. 3, p. 281. t. 15. f. 1 — 9.

C. personatus. L. S. N. p. 724.

428. C. niger rufipes, oblongus, niger, antennis fetaceis capillaceis, rostro brevi arcuato, pedibus dibus abdominisque lateribus rubro-maculatis. T. 3. p. 286.

C. annulatus. L. S. N. p. 725.

429. C. fubapterus, oblongus, grifeus, antennis fetaceis capillaceis, rostro brevi arcuato, alis brevissimis, abdomine nigro-punctato.

T. 3. p. 287. t. 15. f. 10 — 12.

rum basi antennis pedibusque 4. rubris, tibiis anticis nigris hirsutsssimis. T. 3. p.

344. t. 35. f. 1 — 3.

C. nigripes. L. S. N. p. 730.

431. C. femoratus, oblongus, niger, rostro arcuato, elytris albidis macula alba arcuque nigro, femoribus 4. elavatis rubris. T. 3.
p. 346. t. 35. f. 4 — 6.

432. C. quadrispinosus, oblongus, ruber, rostro arcuato, capite bispinoso, thorace 4spinoso, abdomine spinis ciliato. T. 3. p. 347.

t. 35. f. 7 - 9.

433. C. multispinosus, oblongus, fuscus, rostro arcuato, capite thoraceque multispinosis, femoribus anticis crassioribus multidentatis.

T. 3. p. 342. t. 35. f. 10. 11.

fcus, rostro arcuato, thoracis abdominisque margine fasciisque transversis rubris.

T. 3. p. 349. t. 35. f. 12.

Fam. 4.

435. C. leucocephalus, ovatus, niger, antennis fetaceis, capite pedibusque rufo-flavis, T. 3. p. 200.

C. leucocephalus. L. S. N. p. 723.

436. C. striatus, oblongus, niger, antennis fetaceis, pedibus rubris, thorace macula flava, elytris flavo-nigroque-striatis. T. 3. p. 290. t. 15. f. 13 — 15.

C. striatus. L. S. N. p. 730.

437. C. laevigatus, oblongus, albo-viridi-grifeus, pedibus antennisque fetaceis nigricantibus, thorace fasciis 2. nigris, elytris albo-cin-tis. T. 3. p. 292.

C. laevigatus. L. S. N. p. 730.

438. C. nigrophthalmos, oblongus, viridis, oculis nigris, antennis longis fetaceis. T. 3. p. 293.

439. C. rosco-maculatus, oblongus, viridis, antennis setaceis, elytris maculis 6. roscis, pedibus rubro tinctis. T. 3. p. 293.

440. C. fulvo maculatus, oblongus, niger, antennis fetaceis, elytris macula fulva, pedibus fuscis nigro-punctatis. T. 3. p. 294.

C. Rolandri. L. S. N. p. 729.

441. C. flavo-4-maculatus, oblongus, niger, antennis fetaceis, elytris fuscis maculis 2. pedibusque flavis. T. 3. p. 291.

Fam. 5.

442. C. lectularius, domesticus, apterus. T. 3. p. 296. t. 17. f. 9 — 15.

C. lectularius. L. S. N. p. 715.

443. C. depressus Betulae, ovatus, depressus, nigrofuscus, thorace denticulato, capite muricato, elytris foeminae abdomine angustioribus. T. 3. p. 305. t. 15. f. 16 — 19.

C. Betulae. L. S. N. p. 712.

444. C. grossipes, depressus, ruso-fuscus, capite thoraceque nigris, femoribus anticis crassis dentatis. T. 3. p. 308. t. 15. f. 20. 21.

C. Abietis. L. S. N. p. 732.

445. C. Cardui, depressus, ovatus, griseus nigromaculatus, antennis clavatis, thorace lineis tribus longitudinalibus elevatis. T. 3. p. 309. t. 16. f. 1 — 6.

C. Cardui. L. S. N. p. 718.

446. C. Scorpio, ovatus, depressus, angulatus, antennis clavatis, abdomine slavo fascia nigra, pedibus anticis cheliformibus. T. 3. p. 350. t. 35. f. 13 — 15.

C. erofus. L. S. N. p. 718.

Fam. 6.

447. C. Najas, aquaticus, linearis, niger, pedibus anticis brevifimis, reliquis longiffimis. T. 3. p. 311.

a. apterus, apterus, fusco-niger. t. 16. f. 8 — 11.

β. alatus, alatus, fusco-niger, ano bidentato. t. 16. f. 7. 13. 16 — 19.

y. inermis, alatus, ano mutico. t. 16. f. 12.

C. lacustris. L. S. N. p. 732.

448. C. Acus, aquaticus, linearis, niger, capite tereti longiffimo, pedibus omnibus aequalibus. T. 3. p. 322. t. 15. f. 24. 25.

C. ftagnorum. L. S. N. p. 732.

449. C. culiciformis, linearis, fulcus albo-maculatus, antennis pedibusque 4. pofficis longiffimis: anterioribus breviffimis. T. 3. p. 323. t. 17. f. 1 — 8.

C. vagabundus. L. S. N. p. 732.

450. C. longipes, linearis, fuscus, rostro arcuato, antennis pedibusque longissimis: anticis dentatis. T. 3. p. 352. t. 35. f. 16. 17.

451. C. tipuloides, linearis, grifeus, antennis rubro-maculatis, femoribus apice rubris, pe-F 5 dibus M. Oratoria. L. S. N. p. 690.

466. M. brevicornis, thorace rugoso, alis hyalinis macula marginali rusa, antennis siliformibus brevissimis, pedibus anticis cheliformibus. T. 7. p. 620. t. 46. f. 9. 10.

31. LOCVSTA.

467. L. viridis cantatrix, viridis immaculata, thorace rotundato, cauda foeminae ensifera recta. T. 3. p. 428.

Gryllus T. viridissimus. L. S. N. p. 698.

468. L. verrucivora, viridis, elytris fusco-maculatis cauda foeminae ensifera recurvata. T. 3. p. 430. t. 21. f. 1 — 17. p. 413.

Gr. T. verrucivorus. L. S. N. p. 698.

469. L. thaiassina, coeruleo-viridis, antennis pedibusque flavescentibus, cauda foeminae ensistera recurvata. T. 3. p. 433.

Gryllus. L. Faun. Suec. 2283.

albis, elytris alisque abdomine brevioribus. T. 3. p. 434. t. 22. f. 2. 3.

Gr. brachypterus. L. Faun. Suec. 868.

471. L. grifeo-aptera, grifea, aptera, capite thoraceque fasciis 2, nigris. T. 3, p. 436.

472. L. citrifolia, viridis, thorace tetragono marginibus scabro. T. 3. p. 437. t. 37. f. 3. 4.

Gr. T. citrifolius. L. S. N. p. 695.

473. L. ficcifolia, thorace laevi, elytris maximis ovatis erectis foliiformibus, antennis longissimis, tibiis muticis. T. 3. p. 438. t. 37. f. 5. 6.

474. L. cornuta, viridis, thorace rotundato, capities vertice cornuto rugofo, femoribus spinosisfi-

nosissimis, antennis testaceis elytro brevioribus. F. 3. p. 441. t. 37. f. 7.

- 475. L. acuminata, thorace rotundato, vertice cornuto laevi, femoribus spinosis, antennis nigris elytro longioribus. T. 3. p. 442. t. 37 f. 8.
- Gr. T. acuminatus, L. S. N. p. 696.
- 476. L. tuberculata, thorace planiusculo, vertice tuberculato laevi, elytris elongatis angustis, antennis testaceis longitudine elytrorum. T. 3. p. 444. t. 32 f. 1.
- 477. L. oblongifolia, thorace subtetragono plano, corpore susceptible, elytris viridibus ovatis ala brevioribus, pedibus posticis longissimis.

 T. 3. p. 445. f. 38. f. 2.
- 478. L. curvicaudo, viridis tota, thorace tetragono plano, elytris elongatis ala brevioribus, pedibus politicis longissimis. T. 3. p. 446. t. 38 f. 3.
- 479. L. Myrtifolia, viridis, pedibus testaceis, thorace tetragono plano, elytris ovatis ala acuminata brevioribus. T. 3. p. 447. f. 38. f. 4.
- Gr. T. myrtifolius. L. S. N. p. 696.
- 480. L. coronata, thorace spinis ereclis coronato, elytris maculis concavis nigris, antennis corpore triplo longioribus. T. 3. p. 448. t. 38, f. 5.
- Gr. T. coronatus. L. S. N. p. 697.
- 481. L. aquilina, thorace angulato verrucofo, femoribus anticis muticis, alis fusco-fasciatis, antennis corpore triplo longioribus. T. 3. p. 450. t. 38. f. 6. t. 39. f. 1.
- Gr. T. aquilinus. L. S. N. p. 697.

499. A. clavicorne, griseo-fuscum, tibiis posticis rubris, antennis clavatis. T. 3. p. 482.

Gr. L. rufus. L. S. N. p. 702.

500. A. scutellatum, fuscum punctis 2. nigris, elytris nullis, thoracis scutello abdominis longitudine alas tegente. T. 3. p. 483. t. 23. f. 15. 16.

Gr. B. bipunctatus. L. S. N. p. 693.

foutello abdomine longiore alas tegente.

T. 3. p. 484. t. 23. f. 17.

Gr. B. fubulatus. L. S. N. p. 693.

502. A. bamatum, elytris nullis, thoracis scutello abdomine longiore: antice hamato, antennis longitudine abdominis. T. 3. p. 503. t. 42. f. 13.

503. A. verrucosum, thorace ovato plano dentato verrucoso, elytris alisque fuscis, abdomine nigro fasciis albis. T. 3. p. 486. t. 40. f. 6.

Gr. L. miliaris. L. S. N. p. 700.

504. A. albipes, thorace criftato: fegmento quadruplici, elytris obscure viridibus, alis violaceis, femoribus posticis albo-maculatis.

T. 3. p. 487. t. 40. f. 7.

505. A. roseum, viride, antennis flavis, alarum dimidia parte tibiisque posticis roseis. T. 3.
p. 488. t. 41. f. 1.

506. A. flavo-fasciatum, fuscum, capite thorace elytrisque fasciis longitudinalibus flavis, T. 3. p. 488. t. 40. f. 8.

507. A. Sanguinolentum, capite flavo-rubro-nigroque maculato, thorace flavo, elytris viridibus. dibus; tibiis rubro-maculatis. T. 3. p. 489. t. 40. f. 9.

- fcabro subcristato, femoribus maximis intus nigris, tibiis posticis rubris. T. 3. p. 490. t. 40. f. 10. A. rubripes cum sp. 494 non confundendum.
- . L. haematopus. L. S. N. p. 700.
- g. A. carolinum, fuscum nebulosum; thorace carinato: segmento unico, alis nigris margine flavis. T. 3. p. 491. t. 41. f. 2. 3.

L. carolinus: L. S. N. p. 701:

- o. A. obscurum, fuscum, alis rubro-roseis margine nigris macula hyalina alba, tibiis posticis rubris. T. 3. p. 492. t. 41. f. 4.
- . L. obscurus. L. S. N. p. 701:
- 1. A. nigro-fasciatum, viride maculis suscis, elytris nigro-maculatis, alis hyalinis virescentibus: medio fascia nigra. T. 3. p. 493: t. 41. f. 5:
- L. flavus. L. S. N. p. 702.
- 2: A. serratum; viride, thorace cymbiformi carrinato denticulato, capite acuminato. T: 3: p. 493. t. 41. f. 6: t. 42. f. 1:

B. ferratus. L. S. N. p. 693.

gitudinalibus grifeis; thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acuminato: T: 3. p. 495. t.-42. f. 2:

A. dentatum, fuscum nebulosum, thorace cymbiformi rugoso: carina laevi, femoribus posticis denticulatis, capite ovato: T:

3. p. 496. t. 42, f. 3.

- 515. A. flavo-lineatum, fuscum, alis viridibus, thorace rotundato laevi, femoribus posticis linea flava. T. 3. p. 497. t. 42. f. 4.
- 516. A. femur rubrum, grifeo-fuscum, femoribus posticis subtus rubris: intus slavescentibus nigro-maculatis, tibiis posticis rubris. T. 3. p. 498. t. 42. f. 5.
- 517. A. viridi-fasciatum, viride, thorace carinato, elytris fuscis margine inferiore viridibus, alis nigris basi luteis. T. 3. p. 498. t. 42. f. 6.
- 518. A. ensicorne, viride, capite conico, antennia compressis, alis hyalinis. T. 3. p. 499. t. 48. f. 7.
- Gr. A. brevicornis. L. S. N. p. 692.
- 519. A. variegatum, viridi-obscurum, alis coeruleis, corpore fasciis maculisque flavis, semoribus basi sanguineis. T. 3. p. 500. t. 42. f. 8.
- 520. A. longipenne, viridi-flavum, capite thorace elytrisque abdomine duplo longioribus fapficiis binis nigris. T. 3. p. 501. t. 42. f. 9.
- 521. A. acuminatum, thorace nigro, macula flavoviridi, elytris fuscis macula viridi, femoribus posticis fasciis tribus nigris. T. 3. p. 501. t. 42. f. 10.
- 522. A. aeneo-oculatum, griseo-fuscum, thorace fafeiis binis nigris, elytris unica grisea, semoribus posticis intus tibiisque sanguineis, T. 3. p. 502. t. 42. s. 11.
- 523. A. purstatum, griseo-fuscum, elytris lineis punctatis nigris. T. 3. p. 503. t. 42. f. 12.

33. GRYL-

33. GRYLLVS.

- fasciis transversis suscissions fuscus pallidus, capite fasciis transversis suscissions fuscus obscuris, T. 3. p. 509. t. 24. f. 1 20.
- Gr. A. domesticus. L. S. N. p. 694.
- 525. Gr. Gryllo-Talpa, supra fuscus, subtus ferrugineo-slavus, pedibus anticis latis compressis denticulatis. T. 3. p. 517.
- Gr. A. Gryllo-Talpa: L. S. N. p. 693.
- no, elytris macula oblonga nigra, pedibus posticis corpore duplo longioribus. T. 3. p. 519. t. 43. f. 1.
- 527. Gr. muticus, capite elytrisque fusco-castaneis, pedibus testaceis, cauda foeminae muticu, T. 3. p. 520. t. 43. f. 2.
- **928.** Gr. later, nigro-fuscus, cauda foeminae mutica. T. 3. p. 520. t. 43. f. 3.
- 529. Gr. bimaculatus, niger, elytrorum basi maculis binis slavis, antennis corpore brevioribus. T. 3. p. 521. t. 43. f. 4.
- f30. Gr. fasciacus, fuscus, thorace elytrisque lineis longitudinalibus fulvis. T. 3. p. 5226 t. 43. f. 5.
- 531. Gr. niveus, albidus, elytris alisque niveis, thorace elongato, antennis femoribusque possicis longissimis. T. 3. p. 522. t. 43. f. 6.
- nis puncto fusco, alis carneis antennisque longissimis, thorace elongato. T. 3. p. 523. t. 43. f. 7.
- 533. Gr. testaceus, flavo-testaceus, antennis corpore triplo longioribus, cauda foeminae

ensifera recurvata. T. 3. p. 524. t. 43. f. 8.

Gr. A. minutus. L. S. N. p. 694.

Grylli ignoti pupa fusca. T. 3. p. 524. t. 43. f. 9.

34. BLATTA.

534. Bl. culinaris, ferrugineo-fusca, alis maris abdomine brevioribus, foemina aptera. T. 3.
p. 530. t. 25. f. 1 — 7.

Bl. orientalis. L. S. N. p. 688.

535. Bl. lapponica, nigro-fusca, thoracis margine elytrisque dilute grifeis nigro-maculatis.

T. 3. p. 533. t. 25. f. 8 — 15.

Bl. lapponica. L. S. N. p. 688.

536. Bl. kakkerlar, ferruginea, thoracis clypeo flavescente: maculis binis margineque positico suscessiones, abdomine ruso, antennis longissimis. T. 3. p. 536. t. 44. f. 1 — 3.

Bl. americana, L. S. N. p. 687.

537. Bl. penfylvanica, fusca, thoracis elypeo albido: medio nigro-fusco, elytris flavo-fuscis antice albidis. T. 3. p. 537. t. 44. f. 4.

538. Bl. abdomen nigrum, obscure fusca, abdomine nigro, tarsis flavis, alis longitudine abdominis. T. 3. p. 538. t. 44. f. 5.

539. Bl. livida, fusca, corpore subtus pedibusque fulvo-griseis, alis longitudine abdominis. T. 3. p. 538. t. 44. f. 6.

540. Bl. rufa, oblonga rufa, pedibus teffuceis, alis abdomine longioribus. T. 3. p. 539. t. 44. f. 7.

541. Bl. furinamensis, fusca, thorace atro nitido: margine antico flavo, pedibus testaceis. T. 3. P. 539. t. 44. f. 8. Bl. furinamensis. L. S. N. p. 687.

542. Bi. grisea, oblonga cinereo-grisea, punctis aliquot minutissimis suscis. T. 3. p. 540. t. 44. f. 9.

elytrisque hyalinis albo-virescentibus, antennis slavis. T. 3. p. 540. t. 44. f. 10.

Bl. nivea. L. S. N. p. 688.

544. Bl. oblongata, oblonga, flavo-testacea, thorace fascia punctisque duobus nigris, antennis nigris hirsutissimis. T. 3. p. 541. t. 44. f. 11. 12.

Bl. oblongata. L. S. N. p. 689.

545. Ble minutissima, ovata, nigro-fusca, antennis brevioribus, thoracis lateribus albis hyalinis. T. 3. p. 542. t. 44. f. 13. 14.

35. Forficula.

546. F. major, fusca, pedibus testaceis, antennis, articulis quatuordecim. T. 3, p. 545. t. 25. f. 16 — 25.

F. auricularia. L. S. N. p. 686.

547. F. minor, fusca, capite thoraceque nigris, podibus flavis, antennis articulis undecim.

T. 3. p. 553. t. 25. f. 26 — 27.

F. minor. L. S. N. p. 686.

36, ŞTAPHYLINVS,

548. St. murinus, villosus grisco-susco-suscens, nigro-nebulosus, abdomine conico maculis nigris, capite maximo, T. 4, p. 13, t. 1. f. 1 — 6.

St. murinus, L. S. N. p. 683.

nigris viridi-griseisque nitidis, corpore G 2

fubtus argenteo, abdominis apice subrotundato. T. 4. p. 17:

550. St. major, niger totus, alis rufescentibus, abdomine elongato planiusculo. T. 4. p. 18.

551. St. balteatus, niger nitidus, abdomine subtus elytrisque sascia transversali griseo cinerea: punctis nigris. T. 4. p. 18. t. 1. f. 7 — 10.

St. maxillofus. L. S. N. p. 683.

552. St. bembilius, hirfutus niger, capite thorace abdominisque apice viridi flavis nitidis, T. 4. p. 20.

St. hirtus. L. S. N. p. 683.

553. St. erythropierus, ater, elytris pedibusque rufis. T. 4. p. 21.

St. erythropterus. L. S. N. p. 683.

554. St. politus, niger nitidus, antennis obscure suscis, abdomine elongato. T. 4. p. 22.

St. politus. L. S. N. p. 683.

555. St. aencocephalus, obscure fuscus, capite thoraceque aeneis nitidis, tibiis pedibusque rufo-fuscis. T. 4. p. 23.

556. St. aeneus, glaber aeneo-viridia nitidus, abdomine pedibusque nigris. T. 4. p. 23.

557. St. rufus, capite elytrorum abdominisque posticis nigris. T. 4. p. 24. t. 1. f. 11

St. rufus, L. S. N. p. 684.

558. St. rusipes, ovatus glaber niger nitidus, pedibus rusis, elytris amplis, abdominis apice traneato. T. 4. p. 24. t. 1. f. 14.

St. rufipes. L. S. N. p. 685.

559. St. fulvus, rufo-flavus postice niger, elytris pedibusque testaceis, antennis longitudine corporis. T. 4. p. 25.

St. caraboides. L. S. N. p. 685.

560. St. Boleti, fuscus, antennis pedibusque flavolividis pallidis. T. 4. p. 26. t. 1. f. 15

St. Boleti. L. S. N. p. 686.

561. St. riparius, rufus, elytris coeruleis, capite abdominisque apice nigris. T. 4. p. 28. t. 1. f. 18.

St. riparius. L. S. N. p. 684.

37. LAMPYRIS.

562. L. noctiluca communis, oblonga, fupra nigrofusca, subtus albido-slava. T. 4. p. 31. t. 1. f. 19 — 33.

L. noctiluca. L. S. N. p. 643.

563. L. Sanguinea, nigra, thorace rubro maculis 5. nigris, elytris rubris, venis reticulatis. T. 4. p. 45. t. 2. f. 1 — 4.

L. fanguinea. L. S. N. p. 646.

564. L. nigra-rubra, nigra, thorace toto nigro, elytris rubris: venis reticulatis. T. 4. p. 46.

565. L. villosa, nigra, thorace elytrisque villosis rubris, medio thoracis nigro. T. 4. p. 47.

L. coccinea. L. S. N. p. 646.

566. L. furinamensis, ovata, elytris suscis: macula marginali triangulari slava, abdomine subtus susce apice slavo. T. 4. p. 48. t. 17. f. 1.

L. hespera. L. S. N. p. 644.

567. L. ignita, ovata, elytris fuscis; macula marginali ovata flava, abdomine subtus toto flavo. T. 4. p. 49. t. 17. f. 2.

L. ignita. L. S. N. p. 645.

- 568. L. nitens, oblonga, elytris pallide fuscis: macula marginali oblonga fusca, abdomine subtus ruso, postice slavo: segmento unico nigro. T. 4. p. 50. t. 17. f. 3.
- 569. L. maculata, ovata testacea, thorace fascia elytrisque macula nigris. T. 4. p. 50. t. 17. f. 4.
- 570. L. lucida, oblonga, elytris fuscis margine exteriore luteis, abdomine toto subtus slavo.
 T. 4. p. 51. t. 17. f. 5.

L. lucida. L. S. N. p. 645.

571. L. phosphorea, oblonga, elytris fuscis margine exteriore flavis, abdomine atro poffice flavissimo, pedibus testaceis. T. 4. p. 51, t. 17. f. 6.

L. phosphorea. L. S. N. p. 645.

572. L. Pyralis, oblonga, elytris obscure fuscis margine rusescentibus, abdomine atro poftice flavissimo, pedibus suscis. T. 4. p. 52. t. 17. f. 7.

L. Pyralis, L. S. N. p. 644.

- 573. L. Pensylvanica, oblonga, elytris pallide grifeo-testaceis, thorace intra marginem nigro: maculis binis rubris. T. 4. p. 52. t.
 17. f. 8.
- 574. L. Italica, oblonga, elytris nigro-fuscis, thorace rufo: macula nigra in medio, capite nigro. T. 4. p. 54. t. 17. f. 9 11.

L. Italica. L. S. N. p. 645.

575. L. ferrata, flavo-testacea, elytris striatis reticulatis: fasciis tribus nigris, antennis longissimis serratis nigris. T. 4. p. 55. t. 17. f. 12.

Cantharis ferrata. L. S. N. p. 649



race lateribus flavis, elytris striatis reticulatis. T. 4, p. 57, t. 17, f. 13 — 14.

Cantharis pectinata. L. S. N. p. 649.

577. L. rostrata, ovata, elytris flavo-fulvis antice posticeque nigris, thorace flavo macula nigra, capite rostrato. T. 7. p. 622. t. 46. f. 11 — 13.

38. TELEPHORVS.

578. T. fuscus, thorace flavo-rubro macula nigra, elytris obscuris cinereo-nigris. T. 4.19.
60. t. 2. f. 5 — 15.

Cantharis fusca. L. S. N. p. 647.

579. T. flavus, thorace flavo-rufo, elytris testaceis, femorum posteriorum apice nigro.
T 4. p. 70.

Cantharis livida. L. S. N. p. 647.

580. T. bimaculatus, flavo-rufus, elytris testaceis apice nigris. T. 4. p. 71.

581. T. testaceus, niger, thorace rusescente macula nigra, elytris testaceis, semoribus nigris tibiisque slavis. 1. 4. p. 71.

Cantharis teffacea. L. S. N. p. 649.

582. T. niger, thorace flavo-rufo, capite elytrisque nigris, pedibus totis flavis. T. 4.

583. T. aeneus, viridi-aeneus, elytris extrorsum rubris, capite antice flavo, T. 4. p. 73. t. 2. f. 16 — 18.

Gantharis aenea. L. S. N. p. 648.

584. T. bipustulatus, viridi-aeneus nitidus, elytris apice rubris. T. 4. p. 75.

Cantharis bipustulata. L. S. N. p. 648.

·G 5

585. T. coeruleus, villosus violaceo-coeruleus, antennis pedibusque nigris. T. 4. p. 76.

Cantharis coerulea. L. S. N. p. 650.

586. T. fasciatus, thorace obscure viridi nitido, elytris nigris, fasciis duabus transversis rubris. T. 4. p. 76.

Cantharis fasciata. L. S. N. p. 648.

587. T. biguttatus, niger, femoribus flavis, elytris apice luteis. T. 4. p. 77.

Cantharis biguttata. L. S. N. p. 648.

588. T. penfylvanicus, thorace elytrisque rufo-flavis, macula oblonga nigra in fingulo elytro, antennis pedibusque nigris. T. 4. p. 28. t. 17. f. 15.

39. Co'llivris.

589. G. furinamensis, fusca, thorace subulate longissimo arcuato, elytris striatis apice bidentatis, pedibus ferrugineis. T. 4. p. 80. t. 17. f. 16 — 18.

Attelabus surinamensis. L. S. N. p. 619.

40. CARABVS.

Fam, 1,

- 590. C. aeneo punctarus, apterus, supra viridi-aeneus obscurus, subtus niger, elytris punctis excavatis aureis quadruplici ordine: sulcis elevatis. T. 4. p. 88. t. 3. f. 12.
- 591. C. granulatus, fubapterus, fupra viridi-aeneus, fubtus niger, elytris tuberculis elongatis triplici ordine: fulcis elevatis. T. 4, p. 88.

C. granulatus. L. S. N. p. 668.

592. C. violaceus, apterus, aeneo-niger nitidus, thorace fubviolaceo, elytris punctis minutiffi-

tissimis excavatis triplici ordine, p. 89.

C. violaceus. L. S. N. p. 669.

593. C. coriaceus, apterus, ater opacus, elytris punctis intricatis rugosis. T. 4. p. 90.

C. coriaceus. L. S. N. p. 668.

594. C. friatus, apterus, niger, elytris striatis margine violaceis: punctis aureis excavatis triplici serie. T. 4. p. 90. t. 3. f. 1-6.

C. hortenfis. L. S. N. p. 668.

595. C. aureus, apterus, capite thoraceque aureis, corpore subtus nigro, elytris viridi-aeneis margine aureis: fulcis elevatis nigris. 4. p. 91.

C. nitens. L. S. N. p. 669.

596. C. coadunatus, apterus, niger totus, corpore' ovato brevi, elytris coadunatis scabriuscu-T. 4. p. 92. t. 3. f. 13. 14.

Tenebrio caraboides. L. S. N. p. 677.

597. C. melanocephalus, apterus, niger nitidus, elytris laevibus, antennis pedibusque flavotestaceis. T. 4. p. 93.

C. melanocephalus. L. S. N. p. 671.

598. C. sulcatus, apterus, viridi-aeneus nitidus, antennis pedibusque rufis, abdomine nigro, elytris fulcatis. T. 4. p. 104. t. 17. f. 20. C, auratus. L. S. N. p. 669.

599. C. tuberculatus, apterus, niger, elytris scabris: tuberculis conicis hirfutis, tibiis obfeure ferrugineis. T. 7. p. 623. t. 46. f. 14.

500. C. albo-guttatus, apterus, niger, elytris sulcatis thoraceque macukis niveis. 624. t. 46. f. 15. 16.

C. decemguttatus. L. S. N. p. 669.

- 601. C. elongetus, apterus, elongatus, niger, thorace cordato angulato, abdomine ovali, elytris profunde fulcatis. T. 7. p. 626. t. 47. f. 1.
- 602. C. rugosus, apterus, niger, thorace rotundato, elytris striis rugosis atomisque aureis. T. 7. p. 627. t. 47. s. 2.

Fam. 2.

- 663. C. inquister, alatus, supra aeneo-suscus, subtus viridi-aureus, elytris striatis margine aeneis: punctis excavatis triplici ordine. T. 4. p. 94.
- C. inquisitor. L. S. N. p. 669.
- 6c4. C. ruficornis, alatus, niger, antennis rufis, pedibus corporeque subtus susco-castaneis, elytris striatis. T. 4. p. 95.
- 605. C. rusipes, alatus, susceptibles, elytris striatis, corpore subtus rusescente, pedibus antennisque ferrugineis. T. 4. p. 96.
- 606. E. nigro-striatus, alatus, totus niger nitidus, elytris striatis. T. 4. p. 96.
- C. leucophthalmos. L. S. N. p. 668.
- 607. C. cupreus, alatus, fupra viridi-aeneus, fubtus niger, antennis basi russ. T. 4. p. 97. t. 3. f. 15. 16.
- C cupreus. L. S. N. p. 672.
- 608. C. vulgaris, alatus, fupra viridi-aeneus nițidus, subtus niger, pedibus antennisque nigris. T. 4. p. 97.
- C. vulgaris. L. S. N. p. 672.
- 609. C. geneus, alatus, corpore ovato brevi supra nigro-aeneo, subtus nigro, thorace convexo, elytris laevibus, antennis basi rusis. T. 4. P. 98.

610.

610. C. fexpunctatus, alatus, capite thoraceque viridi-aureis, elytris rubro-aeneis: punctis fex impressis. T. 4. p. 99.

C. 6-punctatus. L. S. N. p. 672.

611. C. cyanocephalus, alatus, capite elytrisque viridi-coeruleis, thorace pedibusque ferrugineis. T. 4. p. 100. t. 3. f. 17.

C. cyanocephalus, L. S. N. p. 671.

612. C. latus, alatus, niger nitidus, elytris sfriatis, pedibus antennisque rusis. T. 4. p. 101. C. latus. L. S. N. p. 672.

613. C. ferrugineus, alatus, flavo-griseus nitidus, oculis nigris, elytris striatis. T. 4. p. 101.

C. ferrugineus. L. S. N. p. 672.

614. C. bimaculatus, alatus, fupra niger fubtus flavus, elytris maculis binis, pedibus antennisque flavis. T. 4. p. 102.

515. C. quadripunClatus, alatus, niger nitidus, elytris fubfiriatis: punctis quatuor imprefiis.

T. 4. p. 102.

gusto, elytris cinereo-nigris. T. 4. p. 103. t. 3. f. 18 — 20.

C. crepitans. L. S. N. p. 671.

617. C. Sycophanta, alatus, nitens, thorace femoribusque violaceis, elytris viridibus firiatis, abdomine viridi-aureo. T: 4. p. 109. t. 17. f. 19.

C. Sycophanta. L. S. N. p. 670.

618. C. americanus, alatus, niger, thorace antennis pedibusque ferrugineis, genubus nigris, elytris striatis. T. 4. p. 107. t. 17. f. 21.

C. americanus. L. S. N. p. 671.

619. C. penfylvanicus, rufo-fuscus, capite obscuro, antennis pedibus corporeque subtus testaceis.

ceis, elytris striatis. T. 4. p. 108. t. 17. f. 22.

41. CICINDELA.

620. C. campestris, viridis, nitida, elytris singulis punctis sex albis. T. 4. p. 113. t. 4. f. 1 — 6.

C. campestris. L. S. N. p. 657.

621. C. Sylvatica, supra nigra, subtus viridis nitida, elytris singulis sascia punctisque tribus albis. T. 4. p. 115. t. 4. f. 7.

C. fylvatica. L. S. N. p. 658.

622. C. maculata, fupra viridi-grifea nitida, fubtus viridi-aurea, elytris fingulis fascia lunulisque duabus albis. T. 4. p. 115. t. 4. f. g.

C. hybrida. L. S. N. p. 657.

623. C. riparia, viridi-aenea, elytris punctis latis excavatis griseo-viridibus. T. 4. p. 117. t. 4. f. 9.

C. riparia. L. S. N. p. 658.

624. C. striata; aenea nitidissima, capite striato, elytris dimidio striatis punctatis: intus laevibus. T. 4. p. 118.

C. aquatica. L. S. N. p. 658.

625. C. flavipes, capite thoraceque viridi-aeneis, elytris pallide fuscis nigro-maculatis, antennis pedibusque flavescentibus. T. 4. p. 119.

C. flavipes. L. S. N. p. 658.

626. C. chinensis, capite corporeque subtus coeruleo-violaceis nitidis, elytris viridibus: maculis nigris punctisque quatuor albis. T. 4. p. 119: t. 17. f. 23.

627.

627. G. caroline; purpurea nitida viridi aureo-marginata, elytrorum apice antennis pedibusque flavis. T. 4. p. 120. t. 17. f. 24.

628. C. capensis, viridi-aenea, elytris albis: lineis maculisque ramosis aeneis. T. 7. p. 628. t. 47. f. 3. 4.

C. capensis. L. S. N. p. 657.

629. C. marginata, nigra, thorace elytrisque margine tomentoso flavo-griseo. T. 7. p. 629.
t. 47. f. 5.

42. BYPRESTIS.

.. Fam. 1.

630. B. mariana; nitida, supra susco-aenea, subtus rubro-cuprea, elytris rugosis postice dehiscentibus. T. 4. p. 138. t. 4. f. 18. 19.

B. mariana. L. S. N. p. 660.

631. B. chryso-stigma, fusca, elytris singulis maculis tribus rubro-aureis impressis, abdomine subtus viridi-aureo: margine purpureu ni tido. T. 4. p. 130.

B. chryso-stigma. L. S. N. p. 660.

632. B. violacea, viridi-aenea seu coerulea nitida, elytris striatis. T. 4. p. 130. t. 4. f. 16

B. rustica. L. S. N. p. 660.

633. B. acuminata, nigra, elytris punctatis pone acuminatis, thorace laevi, T. 4. p. 133.

634. B. 4-puntlata, subviridi-nigra, thorace punlis quatuor impressis. T. 4. p. 134.

B. 4-punctata. L. S. N. p. 662.

Chos. 633. et 634. ad sequentem forte familiam spe-

ftaneis serrato-tridentatis, thorace pun-

Étato, sterno porrecto. T. 4. p. 136. t.

B. fternicornis. L. S. N. p. 660.

636. B. viridi-aenea, viridi-aurea obscura, nitida supra, nigra subtus, elytris serratis sulcatis. T. 7. p. 631. t. 47. f. 8. 9.

637. B. aeneo-collis, capite thoraceque rubro-cupreis, elytris fulcatis punctatis ferratis cupreo-fuscis. T. 7. p. 632. t. 47. f. 10.

638. B. ruficaudis, nigra, elytris ferratis subfulcatis postice rufis. T. 7. p. 632. t. 47. f. 11.

639. B. rubro-aurea, rubro-cuprea aurata viridefcens, elytris ferratis punctatis, pedibus viridi-aureis. T. 7. p. 635. t. 47. f. 14.

Fam. 2.

640. B. flavo-punclata, nigra, thorace margine flavo, elytris punctis abdomineque fubtus maculis flavis quadruplici ordine. T. 4:

641. B. albo-punctata, coeruleo-violacea nitida, thoracis lateribus albis, elytris striatis maculis quinque albis. T. 4. p. 132. t. 4.

f. 20;

B. octo-guttata. L. S. N. p. 659.


642. B. viridis, viridis nitida, corpore elongato, elytris linearibus feabris integerrimis. T.
4. p. 133. t. 5. f. 1. 2.

643. B. gigantea, viridi-aenea nitidissima, elytris rugoso-fulcatis, thorace maculis binis nigro-aeneis. T. 4. p. 135.

B. gigantea. L. S. N. p. 659.

644. B. linearis, lineari-oblonga, nigro-aenea cinereo-maculata, elytris carinatis, thorace rugofo postice trilobo. T. 4. p. 137. t. 77. f. 26.

B. li-



- B. linearis. L. S. N. p. 663.
- 645. B. pigmaea, nigra nitida, elytris coeruleoviolaceis nitidifimis. T. 4. p. 137. t. 17. f. 27.
- 646. B. fascicularis, viridi-aurata obscura, capite thorace elytrisque scabris hirsutissimis, villis fasciculisque slavis et rubris. T. 7. p. 629, t. 47. f. 6. 7.
- B. fascicularis. L. S. N. p. 661.
- 647. B. fulgens, cupreo-aurea nitida, elytris laevibus: maculis quatuor cupreis fasciaque lata transversali testacea. T. 7. p. 633. t. 47. f. 12.
- 648. B. aurea, supra viridi-aurea coerulescens nitidissima, subtus aurea, elytris bidentatis punctatis: sulcis senis fasciaque longitudinali aurea. T. 7. p. 634. t. 47. f. 13.
- B. aurulenta. L. S. N. p. 661.
- 43. ELATER.
- 649. E. rufus, totus rufus, oculis nigris. T. 4. p. 144. t. 5. f. 18.
- 650. E. seneo-pettinicornis, viridi-aeneus obscurus nitidus, antennis pettinatis. T. 4. p. 145. t. 5. f. 3 17.
- E. pestinicornis. L. S. N. p. 655.
- 651. E. fuscus major, nigro-fuscus nitidus pedibus fusco-castaneis, abdomine supra rubente. T. 4. p. 146.
- 652. E. fuscus minor, elongatus, capite thoraceque nigris, elytris obscure suscis, pedibus antennisque suscis. T. 4. p. 147.
- 653. E. obtusus, corpore obtuso (brevi) subtus nigro, thorace nigro, elytris suscis griseovillo-

villosis, antennis rusis. T. 4. p. 147, t. 5. f. 19 — 22.

654. E. inaequalis, niger, maculis villosis griseis, elytris scabris, thorace cavitatibus impressis. T. 4. p. 148.

655. E. rufo-unguiculatus, fusco-aeneus nitidus, maculis villosis viridi-griseis, antennis nigris, unguibus russ. T. 4. p. 148.

E. tesselatus. L. S. N. p. 655.

656. E. aeneus rusipes, viridi-aeneus seu violaceus nitidus, pedibus sulvis. T. 4. p. 149.

E. aeneus. L. S. N. p. 655.

657. E. cruciatus, pedibus rufis, thorace nigro lateribus rubro, elytris fulvis: cruce maculisque binis nigris. T. 4. p. 149.

E. cruciatus. L. S. N. p. 653.

658. E. rusipes, nigro-fuscus, maculis nebulosovillosis viridi-griseis, plantis (tarsis) rusis, T. 4. p. 150.

E. murinus. L. S. N. p. 659.

659. E. fuscus flavipes, capite thoraceque nigris, elytris rufo-fuscis, pedibus flavis, antennis rufis. T. 4. p. 151.

E. sputator. L. S. N. p. 654.

660. E. niger, totus ater nitidus. T. 4. p. 151.

E. niger. L. S. N. p. 656.

661. E. fanguineus, niger, elytris rubris. T. 4.
p. 151.

E. fanguineus. L. S. N. p. 654.

662. E. balteatus, niger, elytris antice dimidiatorusis, postice nigris. T. 4. p. 152.

E. balteatus. L. S. N. p. 654.

663. E. flavo-pedinicornis, thorace fusco pilis russ, elytris slavis apice nigris, corpore subtus nigro, antennis pedinatis. T. 4. p. 153.

E. castaneus. L. S. N. p. 654.

664. E. rusicollis, thorace rubro nitido, antice nigro, elytris corporeque nigris. T. 4. p. 153.

E. ruficollis. L. S. N. p. 653.

que nigris elytris mari flavis, foeminae fufcis flavo-marginatis. T. 4. p. 154.

E. linearis. L. S. N. p. 653.

666. E. undulatus, griseo-murinus villosus, elytris fasciis tribus undulatis transversis nigris.

T. 4. p. 155. t. 5. f. 23 — 26.

667. E. nigro-maculatus, capite nigro, thorace rufo: maculis tribus oblongis nigris, elytris pallide fuscis. T. 4. p. 158.

668. E. lineatus, thorace nigro margine flavo fufco, elytris pallide flavo-fuscis: sutura nigra. T. 4. p. 158.

- E. triffis. L. S. N. p. 655.

669. E. aeneo-niger, nigro-viridi-aeneus nitidus, pedibus nigris. T. 4. p. 159.

670. E. oculatus, niger, thorace maculis binis ovatis villofis aterrinis. T. 4. p. 159. t. 170. f. 28.

E. oculatus. L. S. N. p. 651.

671. E. noclilucus, fuscus, thoracis lateribus macula flava glabra convexa nitida. T. 4. p. 160. t. 18. f. 1.

E. nocilucus. L. S. N. p. 651.

672. E. phosphoreus, fusco-castaneus, thorace poftice maculis duabus flavis glabris, antennis pedibusque ruso-susciss. T. 4. p. 161. t. 18. f. 2.

E. phosphoreus. L. S. N. p. 652.

673. E. piceus, totus ater nitidus, elytris laevissimis. T. 4. p. 162. t. 12. f. 3.

· H 2

- 674. E. lividus, pallide fusco-rufescens, antennis rusis pedibusque slavo-testaceis. T. 4. p. 162. t. 18. f. 4.
- 675. E. flavipes, nigro-fuscus, pedibus antennisque flavo-testaceis. T. 4. p. 163. t. 18. f. 5.
- 676. E. maculatus, obscure testaceus, thorace antice nigro, singulo elytro maculis binis irregularibus nigris. T. 4. p. 163. t. 18. f. 6.

44. SILPHA.

- 677. S. Vespillo, nigra, elytris truncatis abdomine brevioribus: fascia lata duplici ferruginea transversa undata. T. 4. p. 168. t. 6. f. 1 3. 5 6.
- S. Vespillo. L. S. N. p. 569.
- 678. S. nigra major, tota atra, elytris truneatis abdomine brevioribus. T. 4. p. 173, t. 6, f. 4.
- S. germanica. L. S. N. p. 569.
- 679. S. thoracica, nigra, thorace ferrugineo, elytris lineis tribus longitudinalibus: unica elevata. T. 4. p. 174. t. 6. f. 7 9.
- S. thoracica. L. S. N. p. 571.
- 680. S. rufo-clavata, oblonga, nigra, thorace orbiculato nitido, elytris lineis elevatis tribus, clava antennarum rufa. T. 4. p. 176.
- S. littoralis. L. S. N. p. 570.
- 681. S. punctata, nigra, nitida, elytris punctatis: lineis elevatis tribus laevibus, clava antennarum nigra. T. 4. p. 177. t. 6. f. 10—19.
- S. atrata. L. S. N. p. 571.

682. 5. quadripunctata, corpore nigro, thorace tefraceo: macula magna nigra, elytris flavotestaceis: punctis duobus nigris. T. 4. p. 181.

S. quadripunctata. L. S. N. p. 571.

683. S. ragofa, nigra opaca, elytris tuberculatis: lineis tribus elevatis inaequalibus. T. 4. p. 182. T. 7. p. 600. t. 44. f. 20 — 25.

S. rugofa. L. S. N. p. 571.

684. S. tomentosa, villosa, supra nigro-susca, subtus atra, capite tomentoso, elytris lineis tribus elevatis. T. 4. p. 183.

685. S. cimicoides, supra fusco-eastanea rufo-marginata, subtus rufa, elytris lineis senis pun-Etisque excavatis. T. 4. p. 183.

S. ferruginea. L. S. N. p. 572.

686. S. maculata, fupra rufo-fusea nigro-maculata, fubtus rufa immaculata. T. 4. p. 184.

S. grifea. L. S. N. p. 574.

687. S. oblonga, oblonga, fusco-nigra, elytris lineis octo elevatis punctisque excavatis. T. 4. p. 185.

S. oblonga. L. S. N. p. 572.

688. S. quadripustulata, nigra, oblonga, depressa, elytris singulis maculis duabus rubris. T.
4. p. 185. t. 6. f. 20. 21.

S. quadripustulata. L. S. N. p. 570.

689. S. bipustulata, nigra, corpore obtuso, (brevi) elytris singulis macula unica rubra. T. 4. p. 186. t. 6. f. 22. 23.

S. bipuftulata. L. S. N. p. 570.

duplici puncto impresso, corpore subtus toto susce. T. 4. p. 187. t. 6. f. 24.

S. Colon. L. S. N. p. 573.

H 3 691.

- 691. S. rufipes, supra nigra, subtus susca, pedibus rusis, elytris laevibus. T. 4. p. 188.
- 45. DERMESTES.
- 692. D. lardarius, niger, elytris antice cinereis nigro-punctatis. T. 4. p. 192. t. 7. f. 1
- D. lardarius. L. S. N. p. 563.
- 693. D. nebulosus, niger cinereo-nebulosus, corpore subtus albido-cinerascente, scutelle hirsuto ruso. T. 4. p. 197.
- D. murinus. L. S. N. p. 563.
- 694. D. bipunctatus, ovatus, niger, elytris fingulis puncto albo. T. 4. p. 197.
- D. Pellio. L. S. N. p. 562.
- 695. D. tomentosus, oblongus, villosus, griseo-murinus, oculis nigris, pedibus fulvis. T. 4. p. 199. t. 7. f. 18. 19.
- ,696. D. undatus, oblongus, niger, elytris fascia alba duplici transversa undulata. T. 4. p. 199.
- D. undatus. L. S. N. p. 562.
- 697. D. Scropbulariae, ovatus, niger, maculis fquamofis albis, futura elytrorum rubra. T. 4. p. 200. t. 7. f. 20—22.
- Byrrhus Scrophulariae. L. S. N. p. 568.
- 698. D. Museorum, ovatus, fuscus obscurus, maculis squamosis griseis. T. 4. p. 203. t. 8. f. 1 14.
- Byrrhus Museorum. L. S. N. p. 568.
- totus niger, elytris fasciis interruptis aeneis. T. 4. p. 213. t. 7. f. 23 26.
- Byrrhus Pilula. L. S. N. p. 568.



- 700. D. fornicatus, fuscus obscurus, corpore ovato laevi fornicato, antennis longissimis: clava subulata. T. 4. p. 216. t. 8. f. 15.
- Obs. An potius Ptini species vel forte distinctum genus.
- 701. D. atomarius, ovatus, minutissimus, nigrofuscus, antennis corporis dimidia longitudine: apice hirsutissimis. T. 4. p. 218. t. 8. f. 16 — 20.
- 702. D. Armadillus, minutiffimus, ovatus, niger nitidus, thoracis marginibus pedibusque rufo-fuscis pallidis. T. 4. p. 220. t. 8. f. 21 23.
- 703. D. ater, ovatus, nigro-fuscus, antennis rusis. T. 4. p. 223. t. 18. f. 7.
- 704. D. maculatus, ovatus, fuscus, thoracis lateribus cinereis abdomine subtus albo-nigroque maculato, antennis rusis. T. 4. p. 223.
- 705. D. bemipterus, nigro-fuscus, elytris abbreviatis pallide griseis fascia transversa undulata nigra, pedibus rusis. T. 4. p. 224.
- D. hemipterus. L. S. N. p. 565.
- 46. PTINVS.
- 706. Pt. pertinax, nigro-fuscus, elytris striatis, thorace ad angulos macula slava. T. 4. p. 227. t. 8. f. 24 28.
- Pt. pertinax. L. S. N. p. 565.
- 707. Pt. rufo-villosus, rubro-fuscus villosus, oculis nigris. T. 4. p. 230.
- 708. Pt. punctatus, griseo-fuscus, elytris striatis punctis excavatis. T. 4. p. 230.

- 709. Pt. mollis, rufo-fuscus, oculis nigris, elytrorum apice rufo. T. 4. p. 230. t. 8. f. 29 — 31.
- Pt. mollis. L. S. N. p. 565.
- 710. Pt. rapax, ovatus, rufo-fuscus albedine maculatus, thorace angulato villis flavis, antennis longitudine corporis. T. 4. p. 231. t. g. f. 1 7.
- Pt. Fur. L. S. N. p. 566.
- 711. Pt. testaceo-villosus, oblongus, griseo-testaceus villosus, antennis pedibusque rusis. T. 4. p. 235. t. 9. f. 8 9.
- 47. SCARABAEVS.

Fam. 1.

- 712. Sc. nasicornis, scutellatus, fusco-castaneus, elytris laevibus, thorace gibbo, capite cornu incurvato. T. 4. p. 255.
- Sc. nasicornis. L. S. N. p. 544.
- 713. Sc. lunaris, exscutellatus, fusco-castaneus, thorace gibbo, elytris sulcatis, capitis elypeo lunato: cornu erecto. T. 4. p. 257. t. 10. f. 1.
- Sc. lunaris. L. S. N. p. 543.
- 714. Sc. cylindricus, fcutellatus, cylindricus, niger, capite cornu incurvato, thorace antice truncato quinquedentato. T. 4. p. 258. t. 10. f. 2. 3.
- Sc. cylindricus. L. S. N. p. 544.
- 715. Sc. flercorarius, scutellatus, supra niger, subtus violaceus, elytris sulcatis, antennis rufis, capite tuberculato. T. 4. p. 259. t. 9. f. 10 — 26.
- Sc. stercorarius. L. S. N. p. 550.

q 16. Sc. vernalis, scutellatus, violaceus totus, elytris glabris laevissimis, antennis nigris, capite tuberculato. T. 4. p. 262. t. 10. f. 4. Sc. vernalis. L. S. N. p. 551.

717. Sc. Typhoeus, scutellatus, niger, elytris sulcatis, thorace cornubus tribus incumbentibus. T. 4. p. 262. t. 10. f. 5.

Sc. Typhoeus. L. S. N. p. 543.

718. Sc. capitatus, fcutellatus, nigro-fuscus, corpore oblongo, elytris striatis, capite magno laevi. T. 4. p. 263. t. 10. f. 6.

Sc. rufipes. L. S. N. p. 559.

719. Sc. Fosser, scutellatus, oblongus, ater, capite magno tuberculis tribus. T. 4. p. 264. t. 10. f. 7.

Sc. Fosfor. L. S. N. p. 548.

720. Sc. nuchicornis, exfcutellatus, ater, corpore ovato brevi, elytris grifeis nigro-maculatis, occipite maris spina armato. T. 4. p. 265.

Sc. nuchicornis. L. S. N. p. 547.

721. Sc. pedellus, scutellatus, oblongus, niger, elytris sulcatis rubris, thorace antice maculis binis rusis. T. 4. p. 266. t. 10. f. 8. 9.

Sc. fimetarius. L. S. N. p. 548.

722. Sc. fimetarius, fcutellatus, oblongus, niger, pedibus fuscis, capite laevi, elytris grifeis: maculis linearibus nigris. T. 4. p. 267. t. 10. f. 10. 11.

Sc. fimetarius. L. S. N. p. 548. B.

723. Sc. fubterraneus, exfcutellatus, oblongus, niger totus, capite tuberculis tribus, elytris profunde fulcatis. T. 4. p. 268.

Sc. fubterraneus. L. S. N. p. 548.

724. Sc. conspurcatus, scutellatus, nigro-fuscus, thoracis margine fulvo, elytris striatis fulvis: maculis binis nigris, antennis rufis. T. 4. p. 268.

Sc. conspurcatus. L. S. N. p. 549.

725. Sc. femoratus, scutellatus, niger, corpore ovato, elytris rugofis futuris quatuor, femoribus anticis maximis. T. 4. p. 269. t. 10. · f. 12.

Sc. sabulosus. L. S. N. p. 551.

726. Sc. erraticus, scutellatus, niger, elytris testaceis substriatis, capite tuberculo unico, antennis nigris. T. 4. p. 270.

Sc. erraticus. L. S. N. p. 548.

727. Sc. ater, scutellatus, niger totus, corpore abbreviato, capite tuberculis tribus, elytris leviter striatis. T. 4. p. 270.

728. Sc. baemorrboidalis, scutellatus, niger, elytris profunde fulcatis apice rufis. T. 4. p. 271.

Sc. haemorrhoidalis. L. S. N. p. 548.

729. Sc. quisquilius, exscutellatus, niger nitidus, elytris striatis livido-testaceis. T. 4. p. 271. Sc. quisquilius. L. S. N. p. 558.

730. Sc. Aloëus, scutellatus, niger, thorace tricorni: intermedio longiore recurvato. T. 4. p. 302.

Sc. Aloëus. L. S. N. p. 542.

731. Sc. Hercules, scutellatus, niger, elytris grifeis nigro-maculatis, thorace cornu incurvo maximo fubtus bidentato, capitis recurvato multidentato. T. 4. p. 304. t. 18. f. g.

Sc. Hercules. L. S. N. p. 541.

732. Sc. Tityus, scutellatus, griseus nigro-maculatus, capite unicorni recurvato, thorace trìtricorni incurvato. T. 4, p. 306. t. 18. f. 10.

Sc. Tityus. L. S. N. p. 542.

- 733. Sc. Moloss, exscutellatus, niger, capitis clypeo lunato unicorni, thorace retuso bidentato utrinque impresso, elytris laevibus.

 T. 4. p. 307. t. 18. f. 11.
- Sc. Molossus. L. S. N. p. 543.
- 734. Sc. Pensylvanicus, scutellatus, capite nigro tuberculo unico, thorace elytrisque laevibus olivaceis: maculis punctisque nigris, T. 4. p. 309. t. 18. f. 12.
- 735. Sc. Carolinus, exfcutellatus, niger, capite ovali tuberculato, thorace retuso bituberculato utrinque impresso, elytris sulcatis. T. 4. p. 310, t. 18. f. 13.
- Sc. Carolinus. L. S. N. p. 545.
- 736. Sc. cristatus, exscutellatus, fusco-castaneus nigricans, thorace gibbo: in medio margine angulato, capite lamella angulata elevata. T. 7. p. 636. t. 47. f. 15.
- Sc. Gigas. L. S. N. p. 549.
- 737. Sc. tricornutus, exfcutellatus, niger fplendens, capitis clypeo lunato: cornu recto, thorace retufo: cornubus duobus porrectis. T. 7. p. 637. t. 47. f. 16.
- 738. Sc. quadridentatus, exscutellatus, niger splendidus, capitis clypeo lunato: cornu recurvato denticulato, thorace retuso quadridentato. T. 7. p. 638. t. 47. f. 17.
- 739. Sc. crenatus, exscutellatus, niger, capitis clypeo lunato margine antice denticulato, thorace elvtrisque laevibus. T. 7. p. 638. t. 47. f. 18.

740. Sc. pilularius, exfcutellatus, niger glaber, capite magno depresso, thorace postice rotundato. T. 4. p. 311. t. 18. f. 14.

Sc. pilularius. L. S. N. p. 350.

741. Sc. festivus, exscutellatus, capite lunato nigro, thorace convexo rubro maculis nigris, elytris rubro-aeneis sulcatis. T. 4. p. 315. t. 18. f. 15.

Sc. festivus. L. S. N. p. 552.

742. Sc. ebenus, scutellatus, ater, oblongus, convexus, laevis, thorace antice cavitate impresso, capite bituberculato. T. 4. p. 317. t. 19. f. 1.

743. Sc. tuberculatus, fcutellatus, oblongus, grifeocinereus, elytris tuberculis pilosis, femoribus anticis maximis, capite recondite.

T. 4. p. 318. t. 19. f. 2.

744. Sc. nanus, scutellatus, oblongus, nigro-suscus, capite lato, elytris striatis, antennis russ.

T. 4. p. 318. t. 19. f. 3.

Fam. 2.

745. Sc. Fullo, fcutellatus, niger s. rufus, maculis sparsis albidis squamosis, antennis heptaphyllis. T. 4. p. 272. t. 10. f. 13.

Sc. Fullo. L. S. N. p. 553.

746. Sc. Melolontha, fcutellatus, rufo-fuscus, thorace villoso, abdominis lateribus albo-maculatis, cauda acuta inflexa. T. 4. p. 273. t. 10. f. 14.

Sc. Melolontha. L. S. N. p. 554.

747. Sc. folstitialis, scutellatus, villosus, grifeo-te-staceus, capite nigro, pedibus sulvis, abdominis lateribus albo-maculatis. T. 4. p. 276. t. 10. f. 15.

Se. folftitialis. L. S. N. p. 554.

Sc. aeneus, scutellatus, viridis nitidus, elytris sulcatis. T. 4. p. 277. t. 10. f. 16.

gris, thorace punchis binis nigris, pedibus longissimis. T. 4. p. 277. t. 10. f. 17.

brunnus. L. S. N. p. 556.

vis, capite thoraceque violaceis f. viridibus nitidis, pedibus nigris. T. 4. p. 278. t. 10. f. 18.

horticola. L.S. N. p. 554.

convexo: fupra viridi-nitente, infra viridiaeneo, pectore porrecto. T. 4. p. 319. t.

Chrysis. L. S. N. p. 551.

2. Sc. lineola, feutellatus, niger nitidus flavo-maculatus, capite thoraceque linea flava, thoracis margine flavo. T. 4. p. 320. t. 19. f. 5.

lineola. L. S. N. p. 552.

3. Sc. nigrocephalus, fcutellatus, rufo-lividus, capite rufo postice nigro, corpore oblongo fubtus fusco. T. 4. p. 321. t. 19. f. 6.

4. Sc. gibbosus, scutellatus, fusco-castaneus, corpore oblongo subtus villoso ruso, thorace tuberculato, elytris striato-punctatis. T. 4. p. 322. t. 19. f. 7.

Fam. 3.

55. Sc. Smaragdus, scutellatus viridi-aureus, elytris glabris: lineis transversis albidis, pettore porrecto lateribus unidentatis. T. 4, p. 279. t. 11. f. 1 — 27.

c. auratus. L. S. N. p. 557.

756. Sc. viridulus, feutellatus aureo-viridis nitidus, elytris rugofis, abdomine postice albedine maculato. pectore mutico. T. 4. p. 297.

Sc. nobilis. L. S. N. p. 558.

757. Sc. fusciatus, scutellatus niger, tomentoso-slavus, elytris fasciis duabus transversis luteis coadunatis. T. 4. p. 299. t. 10. f. 19. 20.

Sc. fasciatus. L. S. N. p. 556.

758. Sc. coriarius, fcutellatus aeneo-niger, nitidus, corpere planiusculo glabro, thorace suturis binis totidemque tuberculis. T. 4. p. 300. t. 10. f. 21.

759. Sc. albo-punctatus, fcutellatus, niger albo-punctatus, corpore depresso. T. 4. p. 301. t.

10. f. 23.

Sc. variabilis. L. S. N. p. 558.

760. Sc. farinosus, scutellatus niger, squamulis grifeo-viridibus, corpore depresso. T. 4. p. 302. t. 10. f. 23.

Se. farinofus. L. S. N. p. 555.


761. Sc. nitidus, fcutello minimo, viridis obscurus, thorace angulato elytrisque flavo-marginatis, capite spina recumbente. T. 4. p. 322. t. 19. f. 8. 9.

Sc. nitidus. L. S. N. p. 552.

762. Sc. marginatus, scutellatus niger, thorace elytrisque fascia marginali slavo-fulva. T. 4. p. 324. t. 19. f. 10.

763. Sc. punciato-marginatus, fcutellatus niger, thorace fafcia marginali flavo-fulva; puncto nigro, elytris maculis quatuor margineque flavo-fulvis. T. 7. p. 639. t. 47. f. 20.

764. Sc. carbonarius, scutellatus, totus niger nitidus, corpore depresso, elytris glaberrimis: areis excavatis. T. 4. p. 324.



765. Sc. bimaculatus, feutellatus fusco-castaneus, nitens, elytris singulis macula magna irregulari slava. T. 7. p. 639. t. 47. f. 19.

766. Sc. rufus, fcutellatus, fupra rufus, fubtus niger nitidus, abdomine maculis lateralibus

niveis. T. 7. p. 640. t. 48. f. 1.

767. Sc. albo-guttatus, fcutellatus, obscure rubropurpureus, capite nigro, thorace linea alba marginali elytrisque punctis albis. T. 7. p. 640. t. 48. f. 2. Sc. aibo-punctatus.

Sc. capensis. L. S. N. p. 556.

768. Sc. cinclus, scutellatus flavo-griseus, thorace elytrisque flavo-cinclis, corpore subtus nigro maculis albis. T. 7, p. 641. t. 48, f. 3.

769. Sc. balteatus, scutellatus niger, elytris medio

rufis. T. 7. p. 642. t. 48. f. 4.

770. Sc. ruficollis, fcutellatus nitidus, thorace podiceque rufo-fuscis, elytris striatis viridi-auratis: apice puncto albo. T. 7. p. 642. t. 48. f. 5.

que firiatis rubris, capite pedibus corporeque fubtus nigris. T. 7. p. 643. t. 48. f. 6.

772. Sc. cinereo-nebulosus, scutellatus niger, thorace elytrisque fasciis et maculis nebulosis cine-

reis. T. 7. p. 643. t. 48. f. 7.

773. Sc. tomentosus, scutellatus, hirsutus, capite thoraceque viridi-aureis, villis slavis, elytris testaceis: lineis tribus nigro-viridibus.

T. 7. p. 644. t. 48. f. 8.

774. Sc. Stigma, fcutellatus, hirfutissimus, capite thoraceque nigris, elytris abbreviatis obficure testaceis: apice macula slava, podice slavo-villoso. T. 7. p. 645. t. 48. f. q.

775. Sc. quadratus, fcutellatus, hirsutus, thorace nigro flavo-marginato, elytris abbreviatis fulvis: intus margine flavo, corpore subtus villis albidis. T. 7. p. 645. t. 48. f. 10. 11.

776. Sc. obscure purpureus, scutellatus, villosus, thorace nigro elytrisque obscure purpureis: maculis albis sparsis, abdomine subtus albo. T. 7. p. 646. t. 48. f. 12.

48. LVCANVS.

q77. L. Cervus, fusco-castaneus, maxillis maximis corniformibus ramosis apice bisurcatis. T. 4. p. 327. t. 12. f. 1 — 6.

L. Cervus. L. S. N. p. 559.

Foemina? T. 4. p. 331. t. 12. f. 7. 8.

L. Cervus. L. S. N. p. 560. 1. \beta.

778. L. Parallelipipedus, niger, corpore depresso, capite tuberculis duobus laevibus. T. 4. p. 334. t. 12. f. 9. 10.

L. parallelipipedus. L. S. N. p. 561.

779. L. Caprea, viridi-coerulescens nitidus, depresfus, maxillis magnis exfertis. T. 4. p. 335. t. 12. f. 11.


L. Caraboides. L. S. N. p. 561.

780. L. Capreolus, fusco-castaneus, femoribus slavis, maxillis maximis corniformibus apice simplicibus latere unidentatis. T. 4: p. 336. t. 19. f. 11. 12.

L. Capreolus. L. S. N. p. 560.

781. L. interruptus, oblongus, niger, depressus, antennis arcuatis, capite tridentato, elytris sulcatis, thorace abdomineque remotis. T. 4. p. 338. t. 19. f. 13.

L. interruptus.L. S. N. p. 560.



49. HISTER.

782. H. ater, niger nitidus, elytris striatis. T. 4. p. 342. t. 12. f. 12 — 16.

H. unicolor. L. S. N. p. 567.

783. H. bimaculatus, niger nitidus, elytris fingulis macula obscure rubra. T. 4. p. 343.

H. bimaculatus. L. S. N. p. 567.

784. H. quadrimaculatus, niger nitidus, elytris fingulis maculis binis obscure rubris. T. 4.

H. quadrimaculatus. L. S. N. p. 567.

785. H. pygmaeus, nigro-fuscus, elytris dimidioftriatis. T. 4. p. 344.

H. pygmaeus. L. S. N. p. 567.

786. H. testudinarius, ovatus, niger, glaber, pedibus fuscis, elytris antice macula rubra postice fulva. T. 4. p. 345. t. 12. f. 17 — 19.

Bermestes Scaraboides. L. S. N. p. 563.

50. ATTELABUS.

787. A. Fossor, niger nitidus, elytris sulcatis, tibiis anticis palmato-spinosis. T. 4. p. 350. t. 13. f. 1 — 3.

Penebrio Fosfor. L. S. N. p. 675.

788. A. glaber, fusco-castaneus, nitidissimus, elytris glabris, maxillis magnis arcuatis. T. 4. p. 392. t. 19. f. 14 — 16.

41. GYRINVS.

789. G. nataror; coeruleo-ater nitidus, pedibus rufis. T. 4. p. 355. t. 13. f. 4 — 20.

G. natator. L. S. N. p. 567.

52. HYDROPHILVS.

790. H. ruficornis, niger, capitulo antennarum rufo, elytris laevibus, abdomine poffice acuminato. T. 4. p. 371. t. 14. f. 1 - 11.

Dytiscus piceus. L. S. N. p. 664.

701. H. nigricornis, niger, capitulo antennarum nigro, elytris laevibus, abdomine postice rotundato. T. 4. p. 376.

Dytifcus Caraboides. L. S. N. p. 664.

702. H. fuscipes, niger, capitulo antennarum nigro, elytris striatis, pedibus fusco-castaneis. T. 4. p. 377. Dytifcus fuscipes. L. S. N. p. 664.

793. H. fuscus, corpore convexo supra fusco subtus nigro, capitulo antennarum oblongo, elytris ftriatis. T. 4. p. 378. t. 15. f. 1-4.

Dytiscus luridus. L. S. N. p. 665.

794. H. aeneus, viridi-aeneus, thorace virescente fulcato, elytris punctato-firiatis, antennis pedibusque rufis. T. 4. p. 379. t. 15. f. 5. 6. 7.

Salpha aquatica. L. S. N. p. 573.

53. DYTISCVS.

CD. Ply.

795. D. latissimus, nigro-fuscus, thorace margine flavo, elytrorum marginibus dilatatis linea transversa flava. T. 4. p. 390.

D. latissimus. L. S. N. p. 665.

706. D. toto-marginalis, nigro-fuscus nitidus, thorace undique elytrorumque margine flavis, elytris foeminae fulcatis. T. 4. p. 39r. t. 16. f. 1 - 8.

Mas D. marginalis. L. S. N. p. 665. Form, D. femistriatus, L. S. N. p. 665.

- 797. D. laterali-marginalis, supra viridi-niger, subtus rusus, capite thoracis marginibus elytrisque slavo-marginatis. T. 4. p. 396.
- 798. D. fasciatus, elytris fuscis, thorace fulvo fasciis duabus transversis nigris latere connatis, abdomine subtus fulvo lineis nigris. T. 4. p. 397.
- Mas D. cinereus. L. S. N. p. 666.
- Foem. D. fulcatus. L. S. N. p. 666.
- 799. D. transverse striatus, supra nigro-suscus, subtus niger, elytris transverse subtilissime striatis. T. 4. p. 399. t. 15. f. 16.
- D. striatus. L. S. N. p. 665.
- fulvo, thorace fulvo: linea duplici nigra.

 T. 4. p. 400.
- **201.** D. feminiger, thorace elytrisque obscure fuscis ruso-marginatis, corpore subtus toto nigro. T. 4. p. 401.
- 802. D. ater, corpore convexo, nigro toto, pedibus antennisque rufo-fuscis. T. 4. p. 401.
- 803. D. Sphaericus, rufo-fuscus, corpore ovato gibbo. T. 4. p. 402. t. 15. f. 17 — 20.
- D. ovatus. L. S. N. p. 667.
- 804. D. clavicornis, viridi-grifeus, antennis fubelavatis, abdomine fubtus nigro-fufco. T. 4. p. 402.
- 305. D. grifeo-striatus, niger, supra maculis striisque griseis, pedibus ruso-suscis. T. 4. p. 403.
- 806. D. erythrocephalus, ovato-oblongus niger, capite pedibusque rufo-fuscis. T. 4. p. 404.
- D. erythrocephalus. L. S. N. p. 666.

807. D. ruficollis, rufus, elytris striatis slavo-grifeis: maculis nigris. T. 4. p. 404. t. 16. f. 9 — 10.

D. minutus. L. S. N. p. 667.

808. D. byalinus, virescens, elytris hyalinis macuculis lateralibus albidis. T. 4. p. 406. t. 15. f. 21 — 23.

54. CANTHARIS.

Fars. 1.

809. C. Proscarabaeus, aptera, violaceo-nigra. T. 5. p. 3. t. 1. f. 1 — 8.

Meloë Profcarabaeus. L. S. N. p. 679.

Fam. 2.

810. C. vesicatoria, alata, viridi-aurea nitidissima, antennis nigris. T. 5. p. 12. t. 1. f. 9.

Meloë vesicatorius. L. S. N. p. 679.

811. C. viridis, alata, viridi-aenea nitida, antennis nigris, thorace tereti elongato. T. 5. p. 15. t. 1. f. 13.

C. viridissima. L. S. N. p. 650.

812. C. Pensylvanica, alata, nigra tota. T. 5. p. 16. t. 13. f. 1.

813. C. Cichorei, alata, nigra, hirfuta, elytris fafeiis tribus transversis flavis, antennis clavatis longitudine thoracis. T. 5. p. 17. t. 13. f. 2. 3.

Meloë Cichorei. L. S. N. p. 680.

814. C. bifasciata, alata, nigra, hirsuta, elytris antice macula rotunda fasciisque binis transversis flavis, antennis clavatis thorace longioribus. T. 7. p. 647. t. 48. f. 13.

815.

133

815. C. capensis, alata, nigra, hirsuta, elytris maculis sex slavis: prima arcuata, antennis nigris clavatis. T. 7. p. 648. t. 48. f. 14.

Meloë capensis. L. S. N. p. 680.

816. C. undato-bifasciata, alata, nigra, hirsuta, elytris antice macula arcuata sasciisque binis undatis slavis, antennis nigris clavatis. T. 7. p. 649. t. 48. f. 15. 16.

817. C. fulva, alata, nigra, elytris fulvis. T. 7. p. 650. t. 48. f. 17.

Meloë algiricus. L. S. N. p. 681.

818. C. viridi-aurea, alata, viridi-aurea, elytris fulvis. T. 7. p. 650. t. 48. f. 18.

55. PYROCHROA.

819. P. rubra, nigra, thorace orbiculato depressa elytrisque rubris, antennis pectinatis. T. 5. p. 20. t. I. f. 14 — 17.

Cantharis pectinicornis. L. S. N. p. 650.

820. P. bimaculata, nigra, thorace orbiculato depresso, elytris fulvis puncto nigro, antennis simplicibus. T. 5. p. 23. t. t. f. 18. 19.

Meloë bimaculatus. L. S. N. p. 680.

821. P. rufa, nigra, thorace angulato, elytris striatis slavo-rusis, antennis dentatis. T. 5. p. 23. t. 1. f. 20 — 22.

822. P. higra, nigra nitida, corpore ovato, thorace convexo, antennis pedibusque fuscis.

T. 5. p. 25. t. 1. f. 23. 24.

823. P. tomentofa, fusca, antennis rusis, elytris punctato-striatis pilosis, oculis maximis caput tegentibus. T. 5. p. 26. t. 13. f. 4. 5.

824. P. nitida, fusco-castanea nitidissima, elytris laevibus, antennis nigris pectinatis. T. 5. p. 27. t. 13. f. 6. 7.

56. MORDELLA.

825. M. aculeata, atra nitida, ano spina terminato. T. 5. p. 28.

M. aculeata, L. S. N. p. 682.

57. TENEBRIO.

Fam. I.

826, T. acuminatus, apterus, ater, coleopteris pene acuminatis. T. 5. p. 31.

T. mortifagus. L. S. N. p. 676.

827. T. gibbus, apterus, niger laevissimus, thorace orbiculato elytrisque valde elevatis convexis. T. 5. p. 51. t. 13. f. 8.

T. gibbus. L. S. N. p. 676.

828. T. reticulatus, apterus, niger, thorace angulato, corpore ovato, elytris coadunatis nervoso-reticulatis. T. 7. p. 651, t. 48. f. 19. 20.

229. T. striatus, apterus, niger, pedibus antennisque rufis, corpore ovato, elytris coadunatis faeviter punctato-striatis. T. gibbus. T. 7. p. 652. t. 48. f. 21.

830. T. cristatus, apterus, griseus, thorace bicristato, elytris coadunatis cristatis: postice angulatis. T. 7. p. 653. t. 48. f. 22. 23.

Fam. 2.

831. T. varialofus, alatus, ater, elytris rugofis.
 T. 5. p. 32. t. 2. f. 1 — 3.

Attelabus Ceramboides. L. S. N. p. 621.

§32. T. Molitor, alatus, nigro-fuscus; subtus castaneus, corpore oblongo, elytris striatis. T. 5. p. 34. t. 2. f. 4 — 14.

T. Molitor, L. S. N. p. 674.



833. T. lignarius, alatus, thorace cavitatibus duabus, elytris violaceis vel rufis, antennis pedibusque rufis. T. 5. p. 38. t. 2. f. 15 — 20.

834. T. rugofus, alatus, niger, corpore ovato, thorace rugofo, elytris tuberculis fcabris. T. 5. p. 43. t. 2. f. 21. 22.

Obf. Huc Silpham rugosam, Linnei refert Ill. Auctor, quam antea sub genere proprio locavit, a Tenebrione rugoso distinctissima.

835. T. villosus, alatus, villosus, niger, elytris villosis fulvis, thorace teretiusculo. T. 5. p. 44. t. 2. f. 23. 24.

Chryfomela hirta. L. S. N. p. 602,

836. T. lardarius, alatus, oblongus, flavo-fulvus, oculis nigris, elytris firiis punctatis. T. 5. p. 45. t. 2. f. 25 — 31.

337. T. hirticornis, alatus, niger, capite depresso, antennis pilosis, thorace bicarinato, elytris punctato-striatis. T. 5. p. 47. t. 3. f. 1. 2.

Hispa mutica. L. S. N. p. 604.

838. T. Boleti, alatus, ovatus, gibbus, niger nitidus, elytris fasciis tribus transversis sulvis undatis. T. 5. p. 49. t. 3. f. 3. 4.

Chryfomela Boleti. L. S. N. p. 591.

839. T. maurus, alatus, nigro-fuscus nitidus, elytris punctato-firiatis, thoracis marginibus antice possiceque dente angulatis. T. 5. p. 52. t. 13. f. 9.

T. mauritanicus. L. S. N. p. 674

840. T. pensylvanicus, alatus, niger, elytris laevibus, thorace quadrato, antennis apice fufcis, T. 5. p. 53. t. 13. f. 10.

841. T. aeneus, a latus, niger, elytris striato punchatis aeneis coerulescentibus. T. 5. p. 53. t. 13. f. 11.

T. chalybeus. L. S. N. p. 674.

842. T. Surinamensis, alatus, elongatus, testaceofuscus, elytris striatis, thorace striis tribus elevatis marginibusque denticulato. T. 5. p. 54. t. 13. f. 12.

Dermeftes Surinamensis. L. S. N. p. 565.

58. CERAMBYX.

Fam. I.

843. C. Prionus, fusco-castaneus obscurus nitidus, thorace depresso dentato, corpore lato, antennis brevioribus. T. 5. p. 59. t. 3. f. 5.

C. coriarius. L. S. N. p. 622.

844. C. Cervicornis, fasciis longitudinalibus undulatis ferrugineis, thorace depresso dentato, maxillis porrectis corniformibus dentatis, antennis brevibus. T. 5. p. 95.

C. Cervicornis, L. S. N. p. 622.

845. C. Damicornis, caftaneus, thorace depresso ferrato, maxillis porrectis intus villosis apice tridentatis, antennis brevibus. T. 5. p. 97.

C. melanopus. L. S. N. p. 623.

846. C. Pensylvanicus, rufo-fuscus, thorace utrinque trispinoso, pectore tomentoso fulvo, antennis mediocribus. T. 5. p. 99. t. 13. f. 13.

847. C. spinosus, thorace depresso ruso utrinque bidentato, fasciis longitudinalibus quinque nigris, elytris bidentatis viridibus: linea lutea. T. 5. p. 100. t. 13. f. 14.

C. fe-

C. festivus. L. S. N. p. 623.

848. C. auratus, viridi-inauratus, thorace depresso marginato-dentato, pedibus ruso-violaceis, antennis mediocribus violaceo-nigris. T.: 5. p. 101. t. 13. f. 15.

C. auratus. L. S. N. p. 635.

Fam. 2.

849. C. odoratus, thorace spinoso, viridi-aureo-nitidus, antennis mediocribus coeruleo-violaceis. T. 5. p. 63.

C. moschatus. L. S. N. p. 627.

850. C. nigro-rugosus, thorace spinoso, niger opacus, antennis brevioribus crassis, elytris convexis. T. 5. p. 64.

C. textor. L.S. N. p. 629.

851. C. atomarius, thorace spinoso, niger nitidus atomis albescentibus, antennis longissimis, scutello albicante. T. 5. p. 65.

€. Sutor. L. S. N. p. 628.

852. C. aedilis, thorace spinoso punctis quatuor luteis, elytris griseo-cinereis susco-maculatis, antennis longissimis. T. 5. p. 66. t. 4. f.

r — 4.

C. aedilis. L. S. N. p. 628.

853. C. Cerdo, niger, thorace spinoso rugoso, elytris scabris, antennis mediocribus. T. 5. p. 69.

C. Cerdo. L. S. N. p. 629.

854. C. Fuliginator, niger, thorace spinoso, elytris cinereis, corpore ovato, antennie brevioribus. T. 5. p. 70.

C. Fuliginator. L. S. N. p. 629.

855. C. nebulosus, thorace spinoso, elytris cinereis punctis sasciisque nigris, antennis mediocribus

cribus cinereo-nigroque maculatis. T. 5. p. 71.

C. nebulofus. L. S. N. p. 627.

836. G. fasciculatus, thorace spinoso, elytris suscissifascia transversali alba sasciculisque sex nigris, antennis longioribus. T. 5. p. 71. t. 3. f. 17. 18.

C. hispidus. L. S. N. p. 627.

857. G. longimanus, thorace spinoso, pedibus anticis longissimis, elytris basi unidentatis apiceque bidentatis, antennis longissimis. To 5, p. 102.

C. longimanus. L. S. N. p. 621.

858. C. albo-maculatus, niger, thorace spinoso, antennis longis aculeatis, elytristicali unidentatis apiceque bidentatis: maculis quatuor albis. T. 5. p. 106. t. 13. f. 16. C. albo-fasciatus.

C. Rubus. L. S. N. p. 625.

859. C. rufo-maculatus, griseus, thorace spinoso, antennis longis aculeatis, elytris basi unidentatis: maculis sex ferrugineis. T. 5. p. 107.

860. C. farinosus, niger thorace spinoso, elytris maculis rotundatis pilosis slavo-albidis sparsis, abdomine bidentato. T. 5. p. 108. t. 12. f. 17. t. 14. f. 1.

C. farinosus. L. S. N. p. 626.

861. C. chinensis, niger, thorace spinolo, antennis longis cinereo-maculatis, elytrorum lateribus maculis albis sparsis. T. 5. p. 109.

862. C. depressus, thorace quadrispinoso, dorso depresso, elytris suscentiales; antice punctus elevatis, antennis longis. T. 5. p. 110. t. 14. f. 2.

C. de-

C. depressus. L. S. N. p. 626.

863. C. balteatus, grifeo-fuscus, thorace spinoso, elytris apice bidentatis fasciaque ferruginea, antennis longissimis. T. 5. p. 111. t. 14. f. 3.

864. C. tuberculatus, cinereus, thorace quinque fpinoso, elytris spinosis postice unidentatis latere fasciaque nigris, antennis longioribus. T. 5. p. 112. t. 14. f. 4.

C. glaucus. L. S. N. p. 626.

865. G. fuccinclus, fusco-castaneus, thorace rugoso quadrispinoso, elytris fascia transversali, slava, antennis longioribus compressis. T. 5. p. 113. t. 14. f. 5.

C. fuccinctus. L. S. N. p. 627.

866. C. tigrinus, fusco-griseus, thorace spinoso, elytris maculis punctisque suscis sparsis, antennis longioribus. T. 5, p. 114. t. 14. f. 6.

867. C. fasciatus, thorace subspinoso, elytris truncatis slavo-griseis: fasciis undulatis punctatis susceptions, antennis longioribus maculatis.

T. 5. p. 114. t. 14. f. 7.

868. C. birfutus, fuscus, thorace spinoso, elytris hirsutis striato punctatis, antennis medio-cribus maculatis. T. 5. p. 115. t. 14. f. 8.

869. C. gibbus, fuscus, cinereo-maculatus, thorace rugoso subspinoso, elytris gibbis punctis nigris hispidis, antennis mediocribus. T. 5. p. 116. t. 14. f. 9.

270. C. ocellatus, thorace spinoso, niger, antennis longissimis, elytris singulis maculis ocellatis quatuor albis medio suscis. T. 7. p.

654. t. 49. f. I.

871. C. capenfis, therace spinose rugoso, niger, antennis mediocribus, clytris singulis macu-

lis tribus obscure rubris. T. 7. p. 655. t. 49. f. 2.

C. capensis. L. S. N. p. 628.

872. C. latipes, thorace spinoso viridi-aeneo, antennis mediocribus, elytris obscure purpureis, pedibus violaceis, tibiis posticis latissimis compressis. T. 7. p. 655. t. 49. f. 3. 4.

Fam. 3.

873. C. punctatus, thorace mutico cylindrico, flavo-grifeus nigro-punctatus, antennis mediocribus grifeo nigroque maculatis. T. 5. p. 73. t. 3. f. 19.

C. Carcharias. L. S. N. p. 631.

874. C. oculatus, thorace mutico cylindrico rufoflavo: punctis duobus nigris, capite antennisque nigris, elytris cinereo-coerulescentibus. T. 5. p. 74. t. 3. f. 20.

C. oculatus, L. S. N. p. 633.

875. C. cinereus, coeruleo-niger, thorace mutico cylindrico linea albida, pedibus anticis flavis, antennis mediocribus. T. 5. p. 75.


C. cylindricus. L. S. N. p. 633.

876. C. villoso-viridescens, flavo-viridis, thorace mutico cylindrico fasciis tribus longitudinalibus flavis, antennis longioribus nigro-cinereoque maculatis. T. 5. p. 76.

877. C. fealaris, flavo-viridis, thorace mutico cylindrico: macula nigra, elytris nigris fafeia dentata punctisque flavo-viridibus, antennis mediocribus. T. 5. p. 77.

C. fealaris. L. S. N. p. 6324

878. C. decempunctatus, nigro-plumbeus, thorace mutico cylindrico: lineis binis flavis, ely-



tris punctis quinque flavis, antennis mediocribus. T. s. p. 78.

C. Populneus. L. S. N. p. 632.

- 879. C. ferraticornis, thorace mutico cylindrico, griseo fuscus, oculis nigris, antennis serratis mediocribus, tentaculis (palpis) longis pedibusque teretibus. T. 5. p. 79.
- C. ferraticornis. L. S. N. p. 634.
- 880. C. pygmaeus, minutissimus, fuscus, thorace mutico cylindrico, antennis serratis pilosis. T. 5. p. 80. t. 4. f. 5.
- 831. C. birtipes, fuscus, thorace mutico cylindrico, elytris apice bidentatis, plantis anticis hirfutis, antennis longioribus medio macula alba. T. 5. p. 117. t. 14. f. 10.
- gato rufo, elytris testacois: punctis quatuor nigris, antennis longioribus. T. 5. p. 117. t. 14. f. 11.
- C. Surinamus. L. S. N. p. 632.
- 883. C. grossicornis, thorace mutico cylindrico, viridi-aureus nitidus, elytris fingulis maculis luteis tribus, antennis mediocribus nigris apice grossis. T. 7. p. 656. t. 49. f. 5. 6.
- 884. C. fusiformis, thorace mutico cylindrico, violaceus nitidus, antennis longissimis nigris.
 T. 7. p. 657. t. 49. f. 7.

Fam. 4.

885. C. quadrifasciatus, niger, thorace mutico subgloboso, elytris fasciis slavo-citreis: secunda obliqua, pedibus ferrugineis, antennis brevioribus. T. 5. p. 81.

Leptura Arietis. L. S. N. p. 640.

886. C. albo fasciatus, niger, thorace mutico subgloboso, elytris lineis tribus arcuatis sasciaque transversa griseis, antennis brevioribus. T. 5. p. 82.

Leptura mystica. L. S. N. p. 639.

887. G. rusticus, grifeo-fuscus, thorace mutico subrotundo depresso: punctis impressis, antennis subulatis brevioribus. T. 5. p. 83.

C. rusticus. L. S. N. p. 634.

888. C. maxillosus, niger, thorace mutico subgloboso, antennis longitudine thoracis: articulis compressis, dentibus maximis prominentibus. T. 5. p. 84. t. 3. f. 21. 22.

Attelabus Buprestoides. L. S. N. p. 621.

889. C. caudatus, fusco-obscurus, thorace mutico subrotundo depresso cinereo villoso; punctis duobus nigris glabris, antennis brevibus. T. 5. p. 87.

C. bajulus. L. S. N. p. 636.

890. C. nigro-planus, niger, corpore thoraceque mutico subrotundo depressis, femoribus clavatis, antennis mediocribus crassis. T. 5. p. 88.

891. C. violaceus, violaceus nitens, corpore thoraceque mutico subrotundo depressis, femoribus clavatis, antennis mediocribus nigris,


T. 5. p. 88.

C. violaceus. L. S. N. p. 635.

292. C. aeneus, fusco-aeneus nitidus, thorace mutico subrotundo depresso, antennis pedibusque nigris. T. 5. p. 89.

893. C. firiatus, niger nitidus, thorace mutice subrotundo depresso, elytris striatis, antennis brevioribus dentibusque parvis. T. 5. p. 90.

C. ftri-



G. ftriatus. L. S. N. p. 635.

- 894. G. castaneus, thorace nigro mutico subrotundo subdepresso, elytris pedibusque ferrugineis, antennis brevioribus. T. 5. p. 90. C. castaneus. L. S. N. p. 636.
- 895. C. undatus, nigro fuscus, thorace mutico subrotundo depresso tuberculato, elytris sasciis duabus albidis undulatis, antennis submediocribus. T. 5. p. 91.

C. fundatus. L. S. N. p. 636.

- 896: C. fanguineus, thorace mutico subrotundo de presso angulato elytrisque sanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus. T. 5. p. 92.
- C. fanguineus. L. S. N. p. 636.
- 897. C. testaceus, thorace mutico subrotundo gla; bro, corpore testaceo, antennis mediocribus. T. 5. p. 93.
- C. testaceus. L. S. N. p. 635.
- 898. C. femoratus, thorace mutico subrotundo, corpore atro, femoribus rubris, antennis mediocribus. T. 5. p. 93.
- C. femoratus. L. S. N. p. 634.
- 899. C. pulverulentus, thorace mutico subrotundo convexo nigro-fusco, elytris castaneis grifeo-villosis apice bidentatis, antennis longioribus aculeatis. T. 3. p. 118. t. 14. f. 12.
- \$60. C. Scigma, totus niger, thorace submutico semilunari punctato, corpore depresso, elytris laevibus stigmate slavo, antennis brevibus. T. 5. p. 119. t. 14. f. 13.

C. Stigma, L. S. N. p. 635.

3.30

59. LEE-

59. LEPTVRA.

Fam. I.

901. L. mordax, thorace fpinoso, nigra, maculis punctisque griseis villosis, elytris fascia duplici fulva maculaque nigra, antennis brevioribus. T. 5. p. 124. t. 4. f. 6.

Cerambyx inquisitor B. L. S. N. p. 631.

902. L. inquisitor, thorace spinoso, susca, maculis punctisque cinereis villosis, antennis brevioribus. T. 5. p. 126. t. 4. f. 7 — 8.

Cerambyx inquifitor. L. S. N. p. 630.

903. L. Cursor, thorace spinoso nigro, elytris russ viridi-griseo-tomentosis: fasciis binis longitudinalibus nigris, antennis longis russ T. 5. p. 128.

C. Curfor. L. S. N. p. 630.

904. L. pedella, nigra, thorace spinoso, elytris teftaceo-lividis: maculis duabus irregularibus nigro-fuscis. T. 5. p. 129. t. 4. f. 10.

C. Lamed. L. S. N. p. 630.

905. L. meridiana, fusco-cinerea, thorace spinoso, femoribus rusis apice nigris, corpore subtus nitente, abdominis apice ruso. T. 5. p. 130.


C. meridianus. L. S. N. p. 630.

906. L. viridi - aurea, viridi aurea nitida, thorace fpinofo, elytris fasciis binis longitudinalibus nigris, femoribus rubris. T. 5. p. 145. t. 15. f. 1.

Fam. 2.

907. L. virens, flavo-viridis, antennis nigro luteoque variis. T. 5. p. 131.

L. virens. L. S. N. p. 638.



obscure rubris. T. 5. p. 132.

rubra. L. S. N. p. 638.

9. L. octomaculata, nigra, maculis quatuor flavis in fingulo elytro. T. 5. p. 132. t. 4. f. 11 — 13.

quadrifasciata. L. S. N. p. 639.

 L. testaceo fasciata, nigra, elytris fasciis tribus transversis undulatis testaceo-slavis. T.
 p. 133.

fexmaculata. L. S. N. p. 638.

- flavis: maculis fex nigris, pedibus antennisque nigro-flavoque maculatis. T. 5.
 p. 134.
- L. Faun, Suec. 2275.
- 2. L. testacea, nigra, elytris tibiis pedibusque flavo-testaceis. T. 5. p. 135.

teffacea. L. S. N. p. 638.

- 3. L. nigripes, nigra, elytris obscure flavo-testaceis, pedibus totis nigris. T. 5. p. 136.
- L. fulva, nigra, elytris flavo-testaceis apice nigris, pedibus posticis corpore brevioribus. T. 5. p. 136.
- L. variabilis, nigra, pedibus posticis corpore longioribus, elytris Maris slavo-testaceis apice nigris, Foemmae obscure rubris. T. 5. p. 137.

melanura. L. S. N. p. 637.

- 6. L. sutura nigra, nigra, elytris rusis seu obfeure testaceis apice suturaque nigris. T.
 5. p. 138.
- 7. L. maculicornis, nigra, elytris teffaceo-lividis, antennis flavo-maculatis. T. 5. p. 139.

918

918. L. tabacicolor, nigra, elytris fusco-testaceis apice nigris, pedibus flavis. T. 5. p. 139.

919. L. aquatica spinosa, viridi deaurata l. violacea, antennis nigris, pedibus suscis, femoribus posticis magnis dentatis. T. 5. p. 140. t. 4. f. 14 — 16.

L. aquatica. L. S. N. p. 637.

920. L. aquatica mutica, viridi-deaurata nitida, capite cinerco, pedibus rufis, femoribus poficis magnis muticis. T. 5. p. 142.

921. L. aquatica fasciata, viridi-deaurata nitida, elytris fascia longitudinali purpurea nitida, femoribus posticis magnis unidentatis. T. 5. p. 142.

922. L. aquatica aenea, aenea nitida, femoribus omnibus fere aequalibus. T. 5. p. 143.

923. L. rusicollis, nigra, thorace abdomineque rubris. T. 5. p. 143.

L. collaris. L. S. N. p. 639.

924. L. violacea, nigra, elytris violaceis nitidis, abdomine flavo-rufo. T. 5. p. 144.

L. virginea, L. S. N. p. 639.

925. L. nigra, nigra tota. T. 5. p. 144.

L. nigra. L. S. N. p. 639.

60. NECYDALIS.


Fam. I.

926. N. ichneumonea, nigra, elytris abbreviatis rufo-fuscis, pedibus rufis, antennis corpora brevioribus. T. 5. p. 148. t. 5. f. 1. 2.

N. major. L. S. N. p. 641.

927. N. ceramboides, fusca, elytris abbreviatis lineola obliqua alba, capite thoraceque nigris, antennis rusis corpore longioribus. T. 5. p. 151.

N. mi-



ninor. L. S. N. p. 641.

am. 2.

. N. nitida, nigra, elytris fubulatis flavis nitidissimis, abdomine annulis albis, femoribus clavatis. T. 5. p. 153. t. 15. f. 2. 3. rlaucescens. L. S. N. p. 642.

. N. flavescens, nigra, elytris testaceis subulatis, femoribus posticis clavatis. p. 155.

lavescens. L. S. N. p. 642.

CLERVS.

. C. apiarius, coeruleo-violaceus, elytris rubris: fasciis tribus transversis violaceis. T. 5. p. 157. t. 5. f. 3 — 5.

labus apiarius. L. S. N. p. 620.

. C. fusco-fasciatus, fuscus, elytris flavo-griseis: fasciis duabus transversis fuscis, abdomine rubro. T. 5. p. 159. t. 5. f. 6. 7.

labus mollis. L. S. N. p. 621.

, G. formicarius, niger, thorace elytris antice abdomineque rubris, elytris fasciis binis T. 5. p. 160. t. 5. f. 8 — 12.

labus formicarius. L. S. N. p. 620.

. C. coeruleus, oblongus, nigro-coeruleus nitidus, elytris punctis excavatis. T. 5. p. 164. t. 5. f. 13 — 14.

mestes violaceus. L. S. N. p. 563.

C. niger, oblongus, niger. T. 5. p. 164.

E. rufipes, oblongus, nigro-coeruleus nitidus, antennárum basi pedibusque flavo rusis. T. 3, p, 165, t, 15. f. 4.

62. CASSIDA.

936. C. tigrina, viridis, punctis nigris, corpore fubtus nigro, thorace maculis binis albis.

T. 5. p. 168. t. 5. f. 15 — 26.

937. C. Cardui, viridis, corpore nigro, pedibus flavescentibus. T. 5. p. 174.

C. viridis. L. S. N. p. 574.

938. C. maculata, supra viridis subtus nigra, elytris maculis aliquot nigris, pedibus nigris. T. 5. p. 175.

C. maculata. L. S. N. p. 575.

939. C grossa, sanguinea, elytris disco punchis nigris sparsis, margine lineis ramosis nigris. T. 5. p. 176. t. 15. f. 5.

C. groffa. L. S. N. p. 577.

940. C. variegata, fusco-rubra, elytris scabris nigro-variegatis: lateribus bisasciatis, thorace angulato, antennis nigris. T. 5. p. 178. t. 15. f. 6.

C. variegata. L. S. N. p. 576.

941. C. clatrata, ferruginea, elytris margine omni, linea longitudinali femique transverfali nigris. T. 5. p. 179. t. 15. f. 7.

C. clatrata. L. S. N. p. 577.


942. C. puntlata, flavo-teftacea rufa, maculis inaequalibus nitidis viridi-aeneis, corpore subtus nigro. T. 5, p. 180. t. 15. f. 8.

943. G. cyanea, cyaneo-aenea, elytris immaculatis excavato-punctatis. T. 5. p. 181. t. 15. f. 9.

C. cyanea. L. S. N. p. 577.

944. C. bimaculata, supra fusco-aenea, subtus viridis nitens, elytrorum disco maculis binis magnis slavis. T. 5. p. 182. t. 15. f. 10.

C. inaequalis. L. S. N. p. 578.



- 945. C. quadrimaculata, viridi-aenea nitida, abdomine nigro, elytrorum disco maculis binis magnis slavis. T. 5. p. 183. t. 15. f. 11.
- C. discoides. L. S. N. p. 578.
- 946. C. lateralis, fusco-aenea, abdomine nigro nitido, elytrorum margine exteriore macular magna flava. T. 5. p. 184. t. 15. f. 12.
- C. lateralis. L. S. N. p. 578.
- 947. C. flava, pallide flava immaculata, corpore fubtus pedibusque rufis, T. 5. p. 184. ti. 15. f. 13.
- C. flava. L. S. N. p. 576.
- 948. C marginata, thorace violaceo-nigro, elytris testaceis: margine punctisque duobus nigris. T. 5. p. 185.
- C. marginata. L. S. N. p. 578.
- 949. C. cinela, ferruginea, thorace aeneo elytrisque punctatis: margine flavo. T. 5. p. 186. t. 15. f. 14.
- C. marginata. L. S. N. p. 576.
- 950. C. cruciata, hyalina pallide flava, elytris disco macula magna fusca cruciata. T. 5. p. 187. t. 15. f. 15.
- C. cruciata. L. S. N. p. 576.
- 951. C. quadrata, pellucida albo-flavescens, elytrorum disco grisco-fusco: margine nigro, T. 5. p. 188. t. 15. f. 16.
- 952. C. reticularis, pellucida albo-flavescens, elytrorum disco nigro-reticulato. T. 5. p. 188. t. 15. f. 17.
- C. reticularis. L. S. N. p. 576.
- 953. C. nigro-maculata, pellucida albo-flavescens, elytris subtus maculis quatuor nigris, abdomine nigro-maculato. T. 5. p. 189. t. 15. f. 18.

C. bi-

C. bifasciata. L. S. N. p. 576.

954. C. purpurea, flavo-citrea, elytrorum difco macula rotunda dorfali rubro-purpurea. T. 5. p. 190. t. 15. f. 19.

C. purpurea. L. S. N. p. 576.

63. IPS.

955. I. typographus, pilosus suscus, elytris possice oblique truncatis dentatis. T. 5. p. 193. t. 6. f. 1 — 7.

Dermestes typographus. L. S. N. p. 562.

956. I. piniperda, subvillosus, niger nitidus, elytris punctis excavatis, antennis plantisque russ. T. 5. p. 194. t. 6. f. 8 — 10.

Dermestes piniperda. L. S. N. p. 563.

957. I. fumatus, testaceo-flavus, oculis nigris, elytris punctis excavatis. T. 5. p. 195.

Dermestes fumatus. L. S. N. p. 564.

958. I. micrographus, ferrugineus, pedibus flavis, elytris postice oblique truncatis dentatis.
T. 5. p. 195.

Dermeftes micrographus. L. S. N. p. 562.

959. I. polygraphus, rufo-fuscus, elytris postice rotundatis. T. 5. p. 196.

Dermestes polygraphus. L. S. N. p. 562.

960. I. domesticus, niger, elytris griseis margine nigris, antennis rusis. T. 5. p. 196.

Dermeftes domefticus. L. S. N. p. 563.

961. I. spinosus, fusco-castaneus, pedibus rufis, elytris postice sexspinosis. T. 5. p. 197.

Dermestes fenestralis. L. S. N. p. 563.

962. I. eustatius, niger nitidus, punctis minimis excavatis, pedibus rufo-fusois, capite sub-

thorace recondito. T. 5. p. 197, t. 15. f. 20. 21.

Dermestes eustatius. L. S. N. p. 564.

64. CVRCVLIO.

Fam. L.

- 963. C. Abietà, longirostris, antennis fractis, semoribus dentatis, corpore oblongo nigro maculis griseo-slavis. T. 5. p. 204. t. 6. f. 11 13.
- C. Abietis. L. S. N. p. 613.
- 964. C. Nucum, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis rusis, corpore oblongo nigro: pilis viridi slavis. T. 5. p. 205. t. 6. f. 14 16.

C. Nucum. L. S. N. p. 613.

965. C. Scrophulariae, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore subgloboso sufco griseove, coleopteris maculis duabus rotundis nigris dorsalibus. T. 5. p. 208. t. 6. f. 17 — 25.

C. Scrophulariae. L. S. N. p. 614.

966. C. Fraxini, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore subgloboso griseo, coleopteris macula magna dorfali susca. T. 5. p. 212.

967. C. violoceus, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigroeoeruleseente nitido, elytris striatis. T. 5. p. 213.

C. violaceus. L. S. N. p. 614.

968. C. futvus, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo slavotestaceo, oculis nigris. T. 5. p. 214.


C. tertrix, L. S. N. p. 615.

K 4

- 969. C. Druparum, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo rufo-fusco, elytris obsolete fasciatis. T.5. p. 215.
- C. Druparum, L. S. N. p. 614.
- 970. C. Ulmi, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo ruso-sus sco, elytris macula nigricante, proboscide nigra. T. 5. p. 215. t. 6. f. 26 30.
- C. Pedicularius. L. S. N. p. 615?
- 971. G. indus, longirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore nigro depresso, thoracis lateribus tuberculo villose, elytris rugoso-fulcatis. T. 5. p. 265. t. 15. f. 22.
 - C. indus. L. S. N. p. 606.
 - 972. C. vaginalis, longirostris, antennis fractis, se moribus dentatis, corpore nigro, elytris sulcatis: tuberculis sparsis, juxta apicem mucronatis. T. 5. p. 266. t. 15. f. 23.
 - C. vaginalis. L. S. N. p. 612,
 - 973. C. puiverulentus, longirostris, antennis fratis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro, elytris cinereo-maculatis. T. 5. p. 268. t. 15. f. 24.

Fant. 2.

- 974. C. grifee-punctatus, brevirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro; punctis flavescentibus sparsis. T. 5, p. 217.
- 975. C. Ligustici, brevirostris, antennis fractis, semoribus dentatis, corpore oblongo nigrofusco: squamulis griseis nitidis. T. 5. p. 218.
- C. Ligurici. L. S. N. p. 615.



976. C. Rosae, apterus, brevirostris, antennis fra-& dis pedibusque russ, femoribus dentatis, corpore oblongo nigro-fusco. T. 5. p. 219.

C. ovatus. L. S. N. p. 615.

977. C. Urticae, brevirostris, antennis fractis, femoribus dentatis, corpore oblongo viridi nitido, pedibus viridibus. T. 5. p. 219.

C. argentatus. L. S. N. p. 615.

978. C. griseo-aeneus, brevirostris, antennis fractis rusis, femoribus dentatis, corpore oblongo griseo-aeneo nitido. T. 5. p. 221.

C. cervinus. L. S. N. p. 615.

Fam. 3.

979. C. piceus, longirostris, antennis fractis suscis, femoribus muticis, corpore oblongo nigro piceo. T. 5. p. 221.

980. C. Pini, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo testaceo: maculis lineisque transversis slavis, elytris gibboss. T. 5. p. 222.

C. Pini. L. S. N. p. 608.

981. C. albicaudis, longirostris, antennis fractis; femoribus muticis, corpore ovato nigro: fasciculis pilosis, elytris postice albis. T. 5. p. 223. t. 6. f. 1. 2.

C. Lapathi. L. S. N. p. 608:

982. C. nigro-gibbosus, longirostris, antennis fraetis, semoribus muticis, corpore ovato nigro, elytris tuberculatis postice cinereis. T. 5. p. 224.

983. C. Phellandrii, longiroffris, antennis fractis, femoribus muticis corpore oblongo cylindrico grifeo-viridi-flavescente, elytris acuminatis remotis. T. 5. p. 224. t. 7. f.

3 - 9

C. paraplecticus. L. S. N. p. 610.

984. C. castaneus, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo fusco-castaneo subtus nigro, elytris striato-punctatis gibbosis. T. 5. p. 231.

985. C. Rumicis, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo griseo-fusco-nebuloso, thorace fasciis binis nigricantibus, pedibus suscis. T. 5. p. 231. t. 7. f. 10 — 16.

C. Rumicis. L. S. N. p. 614.

986. C. fasciatus, longirostris, antennis fractis, semoribus muticis corpore oblongo nigrofusco: fasciis longitudinalibus griseis. T. 5. p. 234.

C. L. Faun. Suec. No. 2274.

987. C. acridulus, arcuato-longirostris, antennis fractis suscis, femoribus muticis, corpore ovato nigro-susco, tibiis pallidis. T. 5. p. 235.

C. acridulus. L. S. N. p. 607.

988. G. Campanulae, longiroftris, antennis fractis fuscis, femoribus muticis, corpore subgloboso cinereo-nigro, elytris lineis griseis. T. 5. p. 236.

C. Campanulae. L. S. N. p. 607.

989. G. Plantaginis, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore ovato griseo, thorace fasciis elytris macula magna punctisque suscis. T. 5. p. 237. t. 7. f. 17

990. C. granarius, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo sufco-castaneo, thorace longitudine elytrorum. T. 5. p. 239.

C. gra-

C. granarius. L. S. N. p. 608.

991. C. Palmarum, longirostris, antennis fractis clava truncata, femoribus muticis, corpore nigro depresso, thorace ovato planiusculo, elytris abbreviatis striatis. T. 5. p. 269. t. 15. f. 26.

C. Palmarum. L. S. N. p. 606.

992. C. rufo-fasciatus, longirostris, antennis fra-Lis, femoribus muticis, corpore oblongo rufo, thorace magno, fasciis longitudinalibus nigris. T. 5. p. 271. t. 15. f. 25.

C. hemipterus. L. S. N. p. 606.

293. C. melanocephalus, longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore subgloboso fusco, capite rostroque nigris, elytris gibbis. T. 5. p. 272. t. 15. f. 27.

994. C. frugilegus, longiroftris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo caftaneo, coleopteris maculis quatuor rufis, thorace longitudine elytrorum. T. 5.

Fam. 4.

995. G. fulsirostris, brevirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo einereo, elytris maculis fasciisque obliquis nigris. T. 5. p. 240.

C. fulciroftris. L. S. N. p. 614.

996. C. carinatus, carinato-brevirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo nigro maculis fasciisque albidis, elytris gibbosis. T. 5. p. 241.

C. nebulofus. L. S. N. p. 617.

997. C. grisco-apterus, apterus, brevirostris, antennis fractis longissimis rusis, semoribus muticis, ticis, corpore oblongo nigro-fusco: pilis nitidis griseis. T. 5. p. 242.

C. incanus. L. S. N. p. 616.

- 998. C. atro-apterus, apterus, brevirostris, antennis fractis, semoribus muticis, corpore oblongo nigro nitido laevi. T. 5. p. 243. t. 7. f. 22. 23.
- 999. C. carinato-punctatus, brevirostris, antennis fractis, semoribus muticis, corpore sub-globoso ruso-susceptico punctis slavo-griseis, elytris carinatis. C. griseo-punctatus. T. 5, p. 244.
- 2000. C. flavipes, brevirostris, antennis slavis fra-Lis, femoribus muticis, corpore oblongo viridi nitido, pedibus slavis. T. 5. p. 245.
- 1001. C. capitatus, brevirostris, antennis fractis fuscis, femoribus muticis, capite lato, corpore subgloboso griseo-cinereo, pedibus sufcis. T. 5. p. 245.
- 1002. C. tereticollis, brevirostris, antennis fractis pedibusque rusis, femoribus muticis, capite cylindrico, corpore oblongó griseocinereo. T. 5. p. 246.
- 1003. C. Pyri, brevirostris, antennis fractis rusis, femoribus muticis, corpore oblongo aeneonitido, pedibus rusis. T. 5. p. 246.

C. Pyri. L. S. N. p. 615.

- 1004. G. lineatus, brevirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo griseo, thorace striis tribus pallidioribus. T. 5. p. 247.
- C. lineatus. L. S. N. p. 616.

Fam. 5.

1005. C. Betulae, longirostris, antennis rectis nigris, corpore subquadrato viridi-aurato nitidistidissimo, pedibus purpureo-aeneis. T. 5. p. 248. t. 7. f. 25. 26.

C. Betulae. L. S. N. p. 611.

gris, corpore subquadrato supra viridi-aurato nitido, subtus violaceo, pedibus violaceis. T. 5. p. 249.

C. Populi, L. S. N. p. 611.

2007. C. purpureus, rostro longissimo, antennis reetis, corpore villoso subquadrato purpureoaurato-nitidissimo. T. 5. p. 250.

C. purpureus. L. S. N. p. 607.

corpore obtufo villofo coeruleo-violaceo nitido. T. 5. p. 251.

C. Alliariae. L. S. N. p. 606.

1009. C. sanguineus, longirostris, antennis rectis, corpore oblongo sanguineo. T. 5. p. 251.

C. frumehtarius. L. S. N. p. 608.

pore oblongo nigro, elytris nigro-coeruleis nitidis. T. 5. p. 252.

C. cyaneus. L. S. N. p. 606.

corpore oblongo rufo, capite elytrisque, viridi-coeruleis nitidis. T. 5. p. 252. t. 7. f. 27. 28.

pore oblongo villoso cinereo-nigro, elytrin fulcatis. T. 5. p. 253. t. 6. f. 31—36.

C. Craccae. L. S. N. p. 606.

1013. C. longicellis, longirostris, antennis rectis, femoribus dentatis, corpore longissimo nigro, thorace elongato cylindrice, elytis

tris flavo-striatis. T. 5. p. 174. t. 15. f. 28. 29.

C. anchoraco. L. S. N. p. 613.

Fam. 6.

2014. C. albinus, brevirostris, antennis longis re-Etis, corpore oblongo nigro hispido, capite elytrorumque apice albis, rostro planiusculo lato. T. 5. p. 255. t. 8. f. 1. 2.

C. albinus, L. S. N. p. 616.

2015. C. flavo-cinclus, brevirostris, antennis fraelis, corpore oblongo viridi: fascia laterali flava. T. 5. p. 256.

C. viridis. L. S. N. p. 616.

2016. C. exceriato-ruber, brevirostris, antennis retris, corpore brevi subquadrato nigro, elytris rubris, capite ovato postice attenuato. T. 5. p. 257. t. 8. f. 3. 4.

Attelabus Coryli. L. S. N. p. 619.

2017. C. excoriato-niger, brevirostris, antennis reelis, corpore brevi subquadrato nigro nitido, capite ovato postice attenuato, femoribus posticis maximis. T. 5. p. 259.

Attelabus Betulae, L. S. N. p. 620.

1018. C. cruciatus, apterus, carinato-brevirostris, antennis rectis, corpore ovato atro subtus maculis rubris, thorace spinoso crucigero.
T. 5. p. 275. t. 16. f. 1.

C. apterus. L. S. N. p. 619.

brevirostris, antennis rectis, thorace spinoso medio excavato, corpore globoso, elytris susco-castaneis. T. 7. p. 658. t. 49. f. 8. 9.

reclis, corpore ovato fusco: fasciculis piloss grifeis. T. 5. p. 276.

Fam. 7.

pore ovato flavo-testaceo, oculis nigrie.

T. 5. p. 260. t. 8. f. 5 — 11.

pore ovato testaceo, elytris maculis binis fuscis, capite nigro. T. 5. 265.

C. Alni. L. S. N. p. 611.

pore ovato nigro griseo-nebuloso, antennis plantisque pallide suscis. T. 5.
p. 264.

C. Segetis. L. S. N. p. 612.

pore fubglobeso atro, elytris fasciis duabus transversis albis maculisque fulva. T.: 5. p. 264.

C. Salicis. L. S. N. p. 611.

64. BRVCHVS.

1025. B. Pifi, nigro-fuscus, maculis villosis sparsis albescentibus abdominis apice albo maculis binis nigris. T. 5. p. 278. t. 16. f. 3—6.

B. Pisi. L. S. N. p. 604.

fis, corpore grifeo maculato, antennis ferratis. T. 5. p. 281. t. 16. f. 7.

65. AN-

65. ANTHRIBVS.

1027. A. ruber, ovato-oblongus, ruber nitidus, antennis elytrisque nigris nitidis. T. 5. p. 283. t. 8. f. 12 — 15.

Silpha ruffica. L. S. N. p. 570.

66. ANTIPVS.

ginato-rufis, elytris grifeo-flavis: antice puncto nigro, dentibus prominentibus, antennis ferratis. T. 7. p. 659, t. 49, f. 10, 11.

67. CHRYSOMELA.

Fam. I.

elytris flavo-rubris: puncto terminali nigro. T. 5. p. 290. t. 8. f. 16 — 22.

Ch. Populi. L. S. N. p. 590.

tris flavo-rubris. T. 5. p. 294. t. 8. f. 23.

Ch. polita. L. S. N. p. 590.

lis nigris. T. 5. p. 294. t. 8. f. 24.

Ch. ftaphylea. L. S. N. p. 590.

elytris punctis subquinis nigris, pedibus rufis. T. 5. p. 295. t. 8. f. 25.

Ch. decempunctata. L. S. N. p. 590.

1033. Ch. nigripes, ovata, supra rubra subtus nigra, thorace macula magna nigra, elytris punctis subquinis pedibusque nigris. T. 5. p. 296.

Ch. decempunctata. B. L. S. N. p. 590.

race punctis duobus nigris, antennarum basi subslava. T. 5. p. 297.

Ch. haemorrhoidalis. L. S. N. p. 537.

Ch. Viminalis. L. S. N. p. 590.

tus violacea nitida, elytris scabris rubromarginatis. T. 5. p. 298. t. 8. f. 26.

Ch. fanguinolenta. L. S. N. p. 591.

thorace corporeque convexis. T. 5. p. 298. Ch. göttingensis. L. S. N. p. 586.

1037. Ch. Tanaceti, ovata, atra opaca, punctata, T. 5. p. 299. t. 8. f. 27 — 31.

Ch. Tanaceti. L. S. N. p. 587.

rufo macula nigra, elytris rubris maculis duabus nigris, capite pedibus antennisque nigris. T. 5. p. 301. t. 9. f. 1.

Ch. coccinea. L. S. N. p. 592.

thorace magno oculis nigris, antennis brevioribus fuscis. T. 5. p. 301. t. 9. f. 2.

Ch. Cerali. L. S. N. p. 588.

elytris fasciis curvis testaceis. T. 5. p. 302. t. 9. f. 3.

Ch. Lapponica. L. S. N. p. 591?

nitida, thorace marginibus rubro: puncto nigro. T. 5. p. 302.

Ch. gollaris. L. S. N. p. 591.

foura nitida, subtus nigra, elytris margine luteq-rubris. T.-5. p. 303.

Cħ,

Ch. marginata. L. S. N. p. 591.

1043. Cb. marginella Ranunculi, oblongo-ovata, viridi-aenea obscura nitida, thorace elytrisque margine luteis. T. 5. p. 304.

Ch. marginella. L. S. N. p. 591.

1044. Ch. Graminis, ovata, viridi-coerulea aurata, antennis dimidio fuscis, pedibus viridibus. T. 5. p. 304.

Ch. Graminis. L. S. N. p. 587.

nitida, abdominis lateribus, ano alarumque margine rubris. T. 5. p. 305.

thorace antice excavata, abdomine supranigro apice testaceo, elytris punctis sparsis.
T. 5. p. 306. t. 9. f. 4 — 12.

Ch. aenea. L. S. N. p. 587.

1047. Ch. viridula, ovato-oblonga, viridis aurata nitida, thorace antice aequali, abdomine supra toto nigro. T. 5. p. 311.

Ch. Polygoni. B. L. Faun. Suec. No. 520.

1048. Ch. Hyperici, ovata, subglobosa, violaceocoerulea nitida l. viridiuscula, thorace amplo. T. 5. p. 312. t. 9. f. 13 — 17.

Ch. haemaptera. L. S. N. p. 587.

gra, punctis excavatis sparsis, thorace minuto, antennis longis nigris. T. 5. p. 314. t. 9. f. 18 — 23.

Ch. Alni. L. S. N. p. 587.

violacea, fubtus violaceo-viridis, punctis excavatis sparsis, thorace amplo, antennis brevioribus nigris. T. 5. p. 316.

1051,

to51. Cb. coerulea Betulae, oblongo-ovata, supra coeruleo-violacea subtus virescens, punctis excavatis striatis, thorace amplo, antennis longioribus. T. 5. p. 317.

Ch. vulgatissima. L. S. N. p. 589.

lea nitida obscura, punctis excavatis sparfis. T. 5. p. 318. t. 9. f. 24 — 33.

Ch. Betulae. L. S. N. p. 587.

nitida subtus nigra, punchis excavatis striatis. T. 5. p. 322.

Ch. Armoraciae. L. S. N. p. 588.

1054. Ch. Polygoni, ovata, violacea l. viridis nitida, thorace lato pedibusque rufo-flavis.
T. 5. p. 322.

Ch. Polygoni. L. S. N. p. 589.

abdomine supra nigro apice flavescente, elytris punctis striatis. T. 5. p. 323.

Ch. Vitellinae. L. S. N. p. 589.

1056. Ch. Phellandrii, oblonga, nigro-aenea obficura nitida, thorace marginibus flavis, elytris fasciis duabus longitudinalibus flavis.

T. 5. p. 324. t. 9. f. 34.

Ch. Phellandrii. L. S. N. p. 601.

1057. 66. griseo-nitida, oblonga, thorace teretiufculo, supra griseo-susca nitida, subtus nigra, capite nigro, antennis longis. T. 5. p. 325. t. 9. f. 35.

angusto puncto nigro, elytris pallide slavomarginatis: basi puncto nigro, antennis variegatis. T. 5. p. 325. t. 9. f. 36.

Ch. cuprea, L. S. N. p. 600.

- angusto maculis duabus nigris, elytris margine flavis, antennis suscis. T. 5. p. 326. t. 10. f. i 6.
- Ch. Nympheae. L. S. N. p. 600.
- presso, abdomine gibbo, elytris maculis subrotundis rubris numerosissimis. T. 5. p. 349. t. 16. f. 8.
- Ch. gigantea. L. S. N. p. 586.
- 1061. Ch. undata, ovata, nigra, elytris glabris: fafciis transversalibus undulatis maculisque rubris. T. 5. p. 350. t. 16. f. 9.
- viridi-aeneis obscuris, elytris nigris: maculis plurimis nigris punctis excavatis. T. 5. p. 351. t. 16. f. 10.
- mineque rubris, antennis clavatis. T. 5. p. 351. t. 16. f. 11.
- Ch. clavicornis. L. S. N. p. 590.
- 1064. Ch. octoguttata, ovata, ferruginea, thorace lato, elytris fingulis maculis quatuor magnis flavis. T. 5. p. 352. t. 16. f. 12.
- Ch. aestuans. L. S. N. p. 593.
- elytris flavis: punctis virescenti-aeneis oblongiusculis, antennis pedibusque russ.

 T. 5. p. 353. t. 16. f. 13.
- Ch. philadelphica. L. S. N. p. 592.
- 1066. Ch. occidentalis, ovata, viridi-aurea nitidiffima, punctis excavatis, antennis pedibusque flavis. T. 5. p. 353. t. 16. f. 14.
- Ch. occidentalis. L. S. N. p. 588.



- elytrisque griseo-fuscis, antennis nigris. T. 5. p. 354. t. 16. f. 15.
- punctis sparsis excavatis, pedibus antennisque violaceis. T. 7. p. 661. t. 49. f. 12.
- tris singulis lineis quinque longitudinalibus flavo-rubris. T. 7, p. 662, t. 49, f. 13, 14.
- Ch. americana. L. S. N. p. 592.
- gris, thorace femoribusque rufis, elytris nigris: fasciis binis longitudinalibus flavis.

 T. 7. p. 662. t. 49. f. 15.
- 1071. Ch. fulva, ovata, supra flavo-fulva, subtus nigra, antennis longioribus nigris. T. 7. p. 663. t. 49. f. 16.

Fam. 2.

- 1072. Ch. quadripunctata, cylindrica, thorace nigro, elytris rubris: maculis duabus nigris, antennis ferratis. T. 5. p. 329. t. 10. f. 7. 8.
- Ch. quadripunctata. L. S. N. p. 596.
- 1073. Ch. cordigera, cylindrica, thorace nigro maculis flavis, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis filiformibus flavis nigrisque. T. 5. p. 330.
- Ch. cordigera. L. S. N. p. 598.
- maculis tribus nigris, thorace maculis magnis binis nigris rubro cinctis. T. 5. p. 331. t. 10. f. 9.
- Ch. fexpunctata. L. S. N. p. 599.

1075. Ch. bipunctata, cylindrica, thorace nigro nitidissimo, elytris rubris: maculis duabus margineque nigris. T. 5. p. 332.

Ch. bipunctata. L. S. N. p. 597.

1076. Ch. tridentata, cylindrica, viridi-coerulea nitida, elytris testaceis, thorace angulato gibbo. T. 5. p. 333. t. 10. f. 10.

Ch. tridentata. L. S. N. p. 596.

1077. Ch. fericea, cylindrica, viridi-aurata, thorace gibbo, antennis longis nigris, elytris fcabris dehifcentibus. T. 5. p. 334-

Ch. fericea. L. S. N. p. 598.

viridi-aurata nitida, capite antice pedibusque flavis. T. 5. p. 334.

Ch. nitens. L. S. N. p. 598.

fraceis, thorace linea longitudinali capite que macula irregulari flavis. T. 5. p. 335.

Ch. bothnica. L. S. N. p. 598.

1080. Ch. nigro-quadrata, subcylindrica, nigra, abdomine subquadrato, thorace globoso, antennis nigris. T. 5. p. 336.

Ch. obscura. L. S. N. p. 599.

1081. Ch. chrysocephala, cylindrica, coeruleo-nigra, capite antice pedibusque quatuor anterioribus rufo-flavis. T. 5. p. 337.

Ch. chryfocephala. L. S. N. p. 594.

1082. Ch. exoleta, cylindrica, flavo-teftacea, abdomine nigro, elytris punctatis. T. 5. p. 338.

Ch. exoleta. L. S. N. p. 594.

1083. Ch. bifasciata, cylindrica, nigra, elytris flavis fasciis binis transversis undatis nigris, anten-

antennis brevioribus ferratis. T. 7. p. 664. t. 49. f. 17.

Fam. 3.

1084. Ch. rubra Liliorum, rubra, thorace tereti, çapite antennis pedibus abdomineque fubtus nigris. T. 5. p. 339.

Ch. merdigera. L. S. N. p. 599.

1085. Ch. cyanella, coeruleo-violacea, thorace tereti: lateribus gibbis. T. 5. p. 340.

Ch. cyanella. L. S. N. p. 600.

1086. Ch. Asparagi, oblonga, thorace tereti rubro: punctis duobus nigris, elytris flavo-palli) dis: maculis viridi-coeruleis nitidis. T. 5. p. 34L.

Ch. Asparagi. L. S. N. p. 601.

1087. Cb. melanopa, oblonga, viridi-coerulea niti-) da, thorace tereti pedibusque flavo-rufis. T. 5. p. 342.

Ch. melanopa. L. S. N. p. 601.

1088. Ch. sanguinea, oblonga, rubra, thorace elytrisque teretibus; antennis nigris basi rus! fis. T. 5. p. 355. t. 16. f. 16.

1089. Ch. unifasciata, oblonga, thorace tereti pedibusque rufis, capite elytrisque nigris: medio fascia longitudinali slava. T. 7. p.) 664. t. 49. f. 18, 19.

· Fam. 4.

1090. Ch. rusipes, saltatoria, ovata, eoerulea, capite thorace pedibusque rufis, antennis dimidio rufis fuscisque, elytris laevibus. T. 5. p. 343. t. 10. f. 11 — 13.

Ch. rufipes. L. S. N. p. 595.

1091. Ch. coeruleo-striata, saltatoria, ovata, coerulea, capite thorace antennis pedibusque rufis, elytris striatis. T. 5. p. 343. L 4

1002.

1092. Ch. oleracea, faltatoria, ovata, tota viridicoerulea, antennis nigris. T. 5. p. 344.

Ch. oleracea. L. S. N. p. 593.

race punctato virefcenti-coeruleo, elytris violaceis punctato friatis, pedibus rufis.

T. 5. p. 344.

1094. Ch. Hyofcyami, faltatoria, ovata, viridi-coerulescenti-aenea, elytris punctatis, pedibus rufis, femoribus posticis viridi-aeneis.

T. 5. p. 345.

Ch. Hyofcyami. L. S. N. p. 594.

1095. Ch. viridi-aurata, saltatoria, ovata, viridiaurata nitidissima, pedibus antennisque rufis, elytris punctatis. T. 5. p. 345.

Ch. Helxines, L. S. N. p. 594.

1096. Ch. viridi-coerulea, faltatoria, ovata, viridicoerulea nitidiffima, thorace laevi, antennis pedibusque rufis, femoribus posticis nigris. T. 5. p. 346.

1097. Ch. nitidula, faltatoria, ovata, elytris coeruleis seu viridibus, thorace aureo, antennis pedibusque russ, semoribus posticis nigris. T. 5. p. 347.

Ch. nitidula. L. S. N. p. 594.

1098. Ch. lineata, faltatoria, ovata, nigra nitida, elytris fascia flava longitudinali. Ch. fasciata. T. 5. p. 347.

Ch. nemorum. L. S. N. p. 595.

1099. Ch. fusca, faltatoria, subglobosa, obscure sufea nitida. T. 5. p. 348.

Ch. hemisphaerica. L. S. N. p. 595.

1100, Ch. metanocephala, faltatoria, pallide flava, capite abdomine femoribusque posticis nigris. T. 5. p. 348.

pallido, elytris rufis: fascia transversali coccinea, antennis pedibusque griseis. T. 5. p. 355. t. 16. f. 17. 18.

Ch. Surinamensis. L. S. N. p. 595.

elytris violaceis nitidis: fingulo maculis quatuor albis. T. 5. p. 356. t. 16. f. 19.

Ch. aequinoctialis. L. S. N. p. 596.

ruleis nitidissimis. T. 5, p. 357. t. 16. f. 20.

Ch. bicolor. L. S. N. p. 593.

1104. Ch. S. litere, faltatoria, griseo-flava, elytris fuscis: fascia longitudinali flexuosa albida.
T. 5. p. 357. t. 16. f. 21.

Ch. S. litera. L. S. N. p. 595.

69. COCCINEULA.

Fam. 1.

nullo. T. 5. p. 369.

C. impunctata. L. S. N. p. 579.

gris duobus. T. 5. p. 369.

C. bipunctata. L. S. N. p. 580.

2107. C. quinquepunstata, coleopteris rubris: punstis tribus magnis duobusque minimis. T. 5. p. 370.

C. quinquepunctata. L. S. N. p. 580.

2108. C. septempunstata, coleopteris rubris: puntis nigris septem. T. 5. p. 370. t. 10. f. 14—20.

C. fe-

C. feptempunctata. L. S. N. p. 581.

pteris maculis tribus magnis irregularibus, quatuor rotundis nigris. T. 5. p. 373.

C. Lin. Faun. Suec. No. 2271.

tis nigris novem. T. 5. p. 373.

C. novempunctata. L. S. N. p. 581.

punctis nigris decem in cruce directis, T.

C. decempunctata. L. S. N. p. 581.

1112. C. undecimpunctata, coleopteris rubris: punchis nigris undecim. T. 5. p. 375.

C. undecimpunctata. L. S. N. p. 581.

E113. C. tredecimpunctata, coleopteris rubris: punctis nigris tredecim. T. 5. p. 375.

C. tredecimpunctata. L. S. N. p. 582.

punctis quindecimpunctata, coleopteris rubris: punctis quindecim nigris flavo-marginatis. T. 5. p. 376. t. 10. f. 1 — 16.

C. ocellata. L. S. N. p. 582.

1115. C. rosea, coleopteris rubris roseis: punctis sedecim nigris, quibusdam connexis, thorace flavo: punctus nigris. T. 5. p. 378.

C. conglobata. L. S. N. p. 583.

treis: punctis viginti duobus thoracisque quinque nigris. T. 5. p. 379.

C. vigintiduopunctata. L. S. N. p. 582.

1117. C. vigintiduopunctata obscura, coleopteris obscure rubris: punctis viginti duobus nigris connexis. T. 5. p. 380.

C. vigintiquinquepunctata. L. S. N. p. 583.

1112.

1118. C. vigintiquatuorpunctata, coleopteris rufofuscis: maculis quatuordecim; quibusdam connexis punctisque decem nigris. T. 5.. p. 381.

C. vigintiquatuorpunctata. L. S. N. p 583.

1119. G. hieroglyphica, coleopteris flavo-rubris: fafciis irregularibus finuatis nigris. T. 5. p. 382.

C. hieroglyphica. L.S. N. p. 580.

1120. C. obliterata, coleopteris flavis: punctis fex nigris pallidis, thorace flavo-albicante punctis nigris. T. 5. p. 382.

C. obliterata. L. S. N. p. 584.

lis plurimis quadratis nigris connexis. T., 5. p. 383.

C. conglomerata. L. S. N. p. 583.

flice maculis binis oblongis fuscis. T. 5.
p. 383.

1123. C. maculata, ovata, coleopteris rubris: maculis magnis novem nigris, intermediis tribus in futuram positis. T. 5. p. 392. t. 16. f. 22.

Fam. 2.

lineis maculisque oblongis fordide albidis.

T. 5. p. 384.

C. oblongo-guttata. L. S. N. p. 584.

punctis quatuordecim albis. T. 5. p. 385.

C. quatuordecimguttata. L. S. N. p. 583.

1126. C. sedecimguttata, coleopteris luteis: pun-Etis albis sedecim. T. 5. p. 385.

C. fe-

C. fedecimguttata. L. S. N. p. 584.

1127. C. vigintiguttata, flavo-rubra feu nigra, coleopteris maculis magnis albis viginti. T. 5. p. 386.

C. vigintiguttata. L. S. N. p. 584.

C. tigrina. L. S. N. p. 586.

Fam. 3.

1128. C. bipustulata, coleopteris nigris: maculis duabus ovatis rubris, abdomine sanguineo.
T. 5. p. 387. t. 10. f. 21 — 25.

C. bipustulata. L. S. N. p. 585.

lis quatuor rubris, anterioribus lunatis, posterioribus rotundis. T. 5. p. 389.

C. quadripustulata. L. S. N. p. 585.

1130. C. fexpustulata, coleopteris nigris: maculis duabus magnis, quatuor minoribus rubris. T. s. p. 390.

C. fexpustulata. L. S. N. p. 585.

lis decempustulata, coleopteris nigris, maculis decem fulvis, anterioribus saepe connexis. T. 5. p. 390.

C. decempustulata. L. S. N. p. 585.

maculis quatuordecim aequalibus flavis.


T. 5. p. 391.

C. quatuordecimpustulata. L. S. N. p. 585.

culis decem albo-flavescentibus. T. 5.

C. pantherina. L. S. N. p. 585.

1134. C. tripusulata, coleopteris nigris: maculis tribus oblongis rubris. T. 5. p. 393. t. 16. f. 23.



- undatis coadunatis flavis. T. 7. p. 665. t. 48. f. 24.
- 1136. C. spbaeroidea, nigra, elytris singulis circulo elongatissimo slavo. T. 7. p. 665. t. 48. f. 25.

70. MVSCA.

Fam. 1.

- 1137. M. groffa, antennis fetariis, pilosa nigra, capite flavo, oculis fuscis, alis basi ferrugineis. T. 6. p. 21. t. 1. f. 1. 2.
- M. groffa. L. S. N. p. 991.
- magno pallide flavo nitido, thorace grifeo, abdomine rufo fascia dorsali nigra. T. 6. p. 23. t. 1. f. 3 5.
- 1139. M. major Larvarum, antennis setariis, pilosa nigra, thorace lineis longitudinalibus atris, abdomine maculis cinereis; major. T. 6. p. 24. t. 1. f. 6 8. T. 1. p. 196. t. 11. f. 22 24.
- M. Larvarum. L. S. N. p. 992.
- 1140. M. minor Larvarum, antennis setariis, pilosa nigra, thorace lineis longitudinalibus atris, abdomine maculis cinereis; minor. T. 6. p. 25.
- nigra, abdomine maris fasciis transversis atris, lateribus slavo-rusis. T. 6. p. 26.
- rea, thorace maculis rotundatis abdomineque

que maculis novem trigonis nigris. T. 6. p. 27.

M. pluvialis. L. S. N. p. 992.

- nigra, abdomine lateribus macula magna ferruginea, alis fuscis postice hyalinis. T. 6. p. 28. t. 1. f. 9. 10.
- 1144. M. rotundata, antennis fetariis, fubglabra, capite magno albido, thorace nigro lateribus albido, abdomine fubrotundo rufo: maculis quatuor nigris. T. 6, p. 29, t. 1, f. 11.
- M. rotundata. L. S. N. p. 991.
- 1145. M. cylindrica, antennis setariis, pilosa, cinereo-nigra, abdomine elongato cylindrico: medio ruso. T. 6. p. 30. t. 1. f. 12
- rea, abdomine elongato conico rufo, pedibus grifeo, flavis, alis-abdomine duplo longioribus. T. 6. p. 31. t. 1. f. 15 18.

M. ferrata. L. S. N. p. 993.

ruleo-nigra nitida capite rubro, alarum apice puncto fusco. T. 6. p. 32. t. 1. f. 19. 20.

M. vibrans. L. S. N. p. 996.

aenea nitidissima, capite nigro, alis versus apicem puncto nigro. T. 6. p. 33.

M. cynipsea. L. S. N. p. 997.

va, oculis viridi-aureis. T. 6. p. 31.

M. flava. L. S. N. p. 997.

II 50.

1150. M. gibbofa, antennis setariis, pilosa nigrocinerea, oculis rubris, thorace lineis quatuor abdomineque punctis nigris. T. 6. p. 35. t. 2. f. 1 — 5.

fea, occipite abdomine pedibusque rufoflavis, rostro retro-geniculato. T. 6. p. 38. t. 2. f. 19 — 22.

** alis maculatis, foeminae ano elongato.

1152. M. Arctii, antennis fetariis, pilosa, viridiflava, oculis aureis, alis fasciis quaternis transversalibus pallide suscis. T. 6. p. 42. t. 6—14.

M. folftitialis. L. S. N. p. 999.

ridi-grisea, oculis viridibus, antennis pedibusque flavo-testaceis, alis albis susceptates. T. 6. p. 46. t. 2. f. 15 — 18.

M. Hyofeyami. L. S. N. p. 998.

1154. M. Cardui, antennis setariis, pilosa nigra, capite antennisque rusis, alis albis: fascia slexuosa suscentia. T. 6. p. 49.

M. Cardui. L. S. N. p. 998.

dibus flavo-teftaceis, oculis viridibus, fcutello luteo, alis albis: falciis inaequalibus flexuosis susciss. T. 6, p. 50.

M. Cerafi. L. S. N. p. 998.

testacea, oculis viridibus, alis albis suscentiaris venisque savis. T. 6. p. 51.

M. Arnicae. L. S. N. p. 997.

.. Fam. 2.

gra, fronte flava, abdominis segmento se-

cundo albo pellucido, alis macula venisque fuscis. T. 6, p. 53, t. 3, f. 1 — 3.

M. pellucens. L. S. N. p. 989.

gra, fronte flava, alis basi flavo-testaceis.

T 6. p. 5.5.

M. meridiana. L. S. N. p. 989.

pite flavo, thorace nigro, abdomine fasciis flavis nigrisque, alis flavescentibus fuscomaculatis. T. 6. p. 56. t. 3. f. 4.

losa, thorace nigro, abdomine coeruleo nitente fasciis nigris, T. 6. p. 57.

M. vomitoria. L. S. N. p. 989.

1161. M. chrysocephala, antennis plumatis, pilosa, capite aureo-siavo, thorace nigro-violaceo, abdomine viridi-coeruleo nitente. T. & p. 60.

M. mortuorum. L. S. N. p. 989.

1162. M. Caesar, antennis plumatis, pilosa, viridi-nitens, pedibus nigris. T. 6. p. 61.


M. Caefar. L. S. N. p. 989.

1163. M. viridi-coerules, antennis plumatis, pilofa, thorace viridi-coeruleo nitente, abdomine coeruleo-violaceo, pedibus nigris. T. 6. p. 62.

M. cadaverina. L. S. N. p. 989.

1164. M. vivipara major, antennis plumatis, pilofa cinerea, oculis rubris, thorace lineis tribus nigris; abdomine maculis nigris cinerisque tesselato; major. T. 6. p. 63. t. 3. f. 5 — 18.

M. carnaria. L. S. N. p. 990.



1165. M. vivipara minor, antennis plumatis, pilofa cinerea, oculis rubris, thorace lineis tribus nigris, abdomine maculis nigris cinereisque tesselato; minor. T. 6. p. 70.

fa, thorace cinereo-nigro lineis obscuris, abdomine nigro-fusco maculis nigris: subtus pallide stavo-fusco, alarum basi fulva.

T. 6. p. 72. t. 4. f. 1 — 11.

M. domeffica, L. S. N. p. 990.

1167. M. pungens, antennis plumatis, pilofa, grifeo-cinerea nigro-maculata, rostro longo corneo porrecto. T. 6. p. 78. t. 4. f. 12

Conops calcitrans. L. S. N. p. 1004.

gra, abdomine flavo-testaceo: fascia longitudinali dorsali nigra. T. 6. p. 83.

gro-cinerea maculis nigris, thorace lineis quatuor nigris. T. 6. p. 84. t. 3. f. 19

M. maculata. L. S. N. p. 990.

race nigro, abdomine griseo hirsutissimo, alis basi suscis. T. 6. p. 85. t. 5. f. 1.

M. meteorica. L. S. N. p. 993.

1171. M. tentaculata, antennis plumatis, pilosa nigra, abdomine maculis nigris cinereisque, rostro tentaculis magnis slavescentibus ovatis depressis. T. 6. p. 86.

1172. M. testacea, antennis plumatis, pilosa, tota flavo-testacea, pilis nigris, oculis brunneis. T. 6. p. 87. 1173. M. flercoraria, antennis plumatis, pilofa, hirfutiffima, grifeo-flava, fronte rufa, alis puncto fuíco. T. 6. p. 88.

M. ftercoraria. L. S. N. p. 996.

1174. M. Fungerum, antennis oblongis plumatis, pilofa, corpore ovato brevi, thorace grifeo cinereo, abdomine pedibusque flavorufis. T. 6. p. 89. t. 5. f. 2 — 16.

fa, oculis viridi-nigris. T. 6. p. 96. t. 5.

f. 17.

1176. M. variegata, antennis plumatis, pilofa, grifeo-fulva, thorace punctis fuscis, oculis
obscuris, alis susco-maculatis. T. 6. p. 96.
t. 6. f. 1.

corpore brevi depresso viridi-aeneo, capite testaceo, oculis suscis. T. 6. p. 146. t. 29. f. 2.

Fam. 3.

1178. M. porcina, antennis fetariis, tomentofa, fufca, capite linea nigra nitida, thorace grifeo, abdomine antice maculis fulvis. T. 6. p. 99.

M. tenax. L. S. N. p. 984.

gra, capite thoraceque pilis viridi-flavis, abdomine fasciis quatuor luteis: prima majore interrupta. T. 6. p. 100. t. 6. f. 2.

M. florea. L. S. N. p. 984.

1180. M. pendula, antennis fetariis, tomentofa, nigra, capite flavo fascia nigra, thorace lineis quatuor longitudinalibus abdomineque fasciis tribus interruptis flavis. T. 6, p. 102.

M. pendula. L. S. N. p. 984.

1181. M. Ribefii, antennis setariis, tomentosa, thorace aeneo pilis flavescentibus, abdomine nigro: fasciis quatuor transversis flavis: prima interrupta. T. 6. p. 103. t. 6. f. 3—13.

M. Ribesii. L. S. N. p. 987.

1182. M. Rosae, antennis setariis, tomentosa, thorace aeneo, abdomine nigro: tribus paribus lunularum albicantum. T. 6. p. 108.
t. 6. f. 14 — 21.

M. Pyrastri. L. S. N. p. 987.

thorace aeneo, abdomine nigro: quatuor paribus macularum transversarum flavarum tr. 6. p. 113. t. 7. f. 1 — 7.

1184. M. bilienta, antennis setariis, tomentosa, thorace aeneo, abdomine nigro: alternatim sasciis lineisque transversis slavo-tessaceis: prima interrupta. T. 6. p. 116.

1185. M. mellina, antennis setariis, tomentosa, thorace aeneo, abdomine nigro: maculis octo tetragonis flavo-testaceis. T. 6. p. 117.

M. mellina. L. S. N. p. 986.

2186. M. citreo-fasciata, antennis setariis, tomentosa nigra, thorace lineis binis lateralibus scutelloque luteis, abdomine cingulis quatuor luteis interruptis. T. 6. p. 118.

M. festiva. L. S. N. p. 986.

nigra, corpore elongato depresso, thorace lutes maculato, abdomine cingulis quatuor,

tuor, scutello pedibusque flavis. T. 6, p. 119.

M. Menthastri. L. S. N. p. 987.

gra, corpore elongato cylindrico, abdomine maculis fex albidis, femoribus posicis davatis dentatis. T. 6. p. 120. t. 7. f. 8. 9.

M. pipiens. L. S. N. p. 988.

1189. M. fegnis, antennis setariis, tomentosa, corpore elongato depresso, thorace aenee, abdomine ruso extremitatibus nigro, femoribus posticis clavatis spinosis. T. 6. p. 121. t. 7. f. 10 — 12.

M. fegnis. L. S. N. p. 988.

1190. M. Vefpiformis, antennis setariis, tomentosa nigra, pedibus antennisque sanie, alis sulvo-variegatis, abdomine cingulis: luteis slternatim latis. T. 6. p. 123. t. 7. f. 13.


M. Vespiformis. L. S. N. p. 986.

1191. M. fasciolata, antennis setariis elongatis, tomentosa nigra, pedibus flavis, thorace maculis lateralibus, abdomine cingulis quatuor interruptis duobusque integris flavis. T. 6. p. 124. t. 7. f. 14. 15.

mentosa nigra, pedibus flavis, thorace maculis lateralibus, abdomine cingulis quatuor interruptis arcuatis flavis. T. 6. p. 125.

M. arcuata. L. S. N. p. 985.

1193. M. bicincla, antennis setariis elongatis, tomentosa nigra, abdomine cingulis duobus flavis,



flavis, alis macula nigricante. T. 6. p. 126. t. 7. f. 16. 17.

M. bicincta. L. S. N. p. 985.

1194. M. ruficandis, antennis fetariis, tomentofa nigra, fronte flava, abdominis apice villoliffimo fulvo. T. 6. p. 127.

M. fallax. L. S. N. p. 985.

mentofa, capite thoraceque aeneis: villis rufis, abdomine nigro: villis aureis, pedibus dilatatis flavo-rufis. T. 6. p. 128. t. 7. f. 18 — 20.

abdomine ovato brevi flavo, thorace nigro, capite rostrato conico. T. 6, p. 130. t. 7, f. 21 — 23.

Conops rostrata. L. S. N. p. 1004.

tosa, fusica, feutello rufo, abdomine maculis binis magnis cingulisque tribus flavotestaceis. T. 6. p. 145. t. 29. f. 1.

Fam. 4,

1198. M. Bembylina, antennis plumatis, tomentosa nigra, thorace abdominisque apice rusis, alarum basi fulva. T. 6. p. 133. t. 8. f. 1 — 3.

M. mystacea. L. S. N. p. 983.

mentosa nigra, fronte flava, thorace villis viridi-flavis, abdominis apice villoso ruso l. griseo. T. 6. p. 134. t. 8. f. 4 — 9.

M. mystacea, B. Lin, Faun. Suec. No. 1793.

M 3

bus, tomentofa nigra, capite thoraceque villis rufis, abdominis apice villofo grifeo.

T. 6. p. 138. t. 8. f. 10. 11.

M. intricaria. L. S. N. p. 985.

nigra, fcutello albido, capite antice thoraceque postice villis albis, abdominis apice villoso rufo, tarsis flavis. T. 6. p. 139.

M. Oeftracea. L. S. N. p. 985.

abdomine nigro: maculis binis lateralibus magnis cingulisque tribus flavo-testaceis.

T. 6. p. 140. t. 8. f. 12. 13.

M. nemorum. L. S. N. p. 984.

mentofa nigra, fronte flava: linea nigra, abdomine cingulis tribus flavis apice rule.

T. 6. p. 142. t. 8. f. 14.

M. Lappona. L. S. N. p. 983.

abdomine depresso aeneo, femoribus anticis grossis, tibiis antice unguiculatis. T. 6. p. 143. t. 8. f. 15 — 17.

71. STRATIOMYS.

nine fupra maculis fex lateralibus citreoluteis. T. 6. p. 151.

Musca Chamaeleon. L. S. N. p. 979.

mine fupra nigro: lineis fex lateralibus flavis. T. 6. p. 152. t. 9. f. I — 3.

Musca



Musca Microleon. L. S. N. p. 980.

ridi: fascia lata longitudinali undata nigra, pedibus flavis. T. 6, p. 154. t. 9. f. 4. 5.

Musca Hydroleon. L. S. N. p. 980.

72. NEMOTBLVS.

Fam. 1.

race nigro, abdomine flavescente supra nigro-punctata, pedibus flavis, alis susco-maculatis. T. 6. p. 162. t. 9. f. 6 — 9.

Musca scolopacea. L. S. N. p. 982.

ris, abdomine annulis flavo-testaceis, pedibus flavis, alis immaculatis. T. 6. p. 164.

1210. N. maculatus, grifeo-niger, antennis filatis fetigeris, abdomine annulis flavo-testaceis, pedibus flavis nigro-maculatis, alis macula flava apicibus fusca. T. 6. p. 165.

1211. N. rufus, antennis filatis fetigeris, abdomine rufo-flavo: foeminae nigro-maculato, pedibus rufis, alis maculatis. T. 6. p. 166. t. 9. f. 11 — 18.

1212. N. Vermileo, flavus, antennis filatis fetigeris, thorace striis quatuor abdomineque quinquefariam nigro-punctato, alis immaculatis. T. 6. p. 168. t. 10. f. 1 — 10.


Musca Vermileo. L. S. N. p. 982.

ne flavo-fulvo, pedibus flavescentibus, alis immaculatis. T. 6. p. 203. t. 29. f. 3 — 5.

Fam. 2.

- domine elongato conico nigro: annulis tribus femoribusque rufis. T. 6. p. 183. t. 9. f. 19 21.
- tars. N. flavipes, antennis cylindricis muticis, abdomine elongato conico atro nitido, pedibus rufo-flavis, alis maculatis basi flavis.

 T. 6. p. 185. t. 9. f. 22, 23.
- nuticis, abdomine elongato conico nigro: fasciis griseis, capite subtus lanigero albido. T. 6. p. 186. t. 11. f. 1 4.
- 1217. N. hirtus, flavo-fuscus, antennis cylindricis muticis, oculis aeneis, corpore elongato conico villis rufis fasciisque fulvis. T. 6. p. 187.
- muticis, corpore oblongo, tarsis fuscis, alis nigris. T. 6. p. 188. t. 11. f. 5. 6.
- 1219. N. fenestralis, niger, antennis cylindricis muticis, abdomine oblongo: fasciis quatuor albis, alis nigro-fuscis. T. 6. p. 189.
- Musca fenestralis. L. S. N. p. 981.
- 1220, N. Afdoides, niger, antennis cylindricis muticis, abdomine longo cylindrico; fegmento fecundo rufo-flavo, alis fuscis. T. 6. p. 204. t. 29. f. 6. 7.
- ticis, abdomine oblongo depresso: fegmento secundo stavo pellucido, alis susceviolaceis. T. 6. p. 205. t. 29. f. 8. 9.
- Musca illucens. L. S. N. p. 979.



Fam. 3.

- 1222. N. Hottentottus, antennis acutis, corpore lato nigro hirsutissimo: villis viridi-slavis, alis hyasinis costa exteriore suscis. T. 6. p. 190. t. 11. f. 7 10.
- Musca Hottentotta, L. S. N. p. 981.
- 1223. N. Maurus, antennis auctis, corpore lato nigro hirfuto, thorace lateribus villis flavoalbidis, abdomine fasciis villosis albis, alis dimidiato-nigris albisque. T. 6. p. 191. t. 11. f. 11. 12.
- Musca Maura. L. S. N. p. 981.
- gro hirfuto: lateribus villis nigris, ano fafeiculis binis albis, alis dimiato-nigris albisque. T. 6. p. 192. t. 11. f. 13.
- Musca Merio. L. S. N. p. 981.
- 1225. N. tigrinus, antennis acutis, corpore lato hirto rufescenti-atro albo-maculato, alis albis nigro-maculatis. T. 6. p. 206. t. 29. f. 11 17.

Fam. 4.

- corpore brevi conico viridi-aeneo, oculis aureis, pedibus pallide flavis. T. 6. p. 194. t. 11. f. 14 22. t. 12. f. 1 3.
- ris, abdomine oblongo depresso violaceocupreo, thorace viridi aurato, alis macula fusca. T. 6. p. 200. t. 12. f. 4.5.
- Musca cupraria. L. S, N. p. 994.

1228. N. flavo-geniculatus, antennis clavatis apice fetigeris, capite hirfutissimo, abdomine oblongo depresso viridi-aureo, pedibus nigris: geniculis slavis, alis slavo-suscis. T. 6. p. 201.

1229. N. auratus, antennis clavatis apice fetigeris, capite nudo, abdomine ovato brevi viridiaureo-nitido, femoribus nigris, tibiis teftaceis alisque hyalinis. T. 6. p. 202.

vatis apice fetigeris, corpore tereti longo, capite fulvo oculis rubris, alis fuscis pedibusque longissimis violaceis. T. 6. p. 207. t. 29. f. 14. 15.

Musca aequinoctialis. L. S. N. p. 995.

73. TABANVS.

Fam. I.

lis viridibus, fuscus, antennis lunulatis, oculis viridibus, tibiis flavis, abdomine lineis transversis maculisque trigonis pallide flavis. T. 6, p. 219. t. 12. f. 6—14.

T. bovinus. L. S. N. p. 1000.

lis viridibus: fasciis ternis purpureis, pedibus fuscis, abdominis lateribus macula magna rusa. T. 6. p. 220. t. 12. f. 15 — 22.


T. tropicus, L. S. N. p. 1001.

1233. T. maculatus, antennis lunulatis, oculis viridibus: fascia purpurescente unica, corpore griseo-cinereo-higroque variegato. T. 6. p. 221.

T. Bromius. L. S. N. p. 1001.



- lis viridibus: fasciis ternis purpureis, abdominis incisuris griseis. T. 6. p. 222.
- fis, oculis virescentibus, scutello rufo maeula nigra, pedibus ferrugineis. T. 6. p. 226. t. 30. f. s.
- T. calens. L. S. N. p. 1000.
- lunulatis pedibusque rufis apice nigris, alis hyalinis vitreis. T. 6. p. 227. t. 30. f. 2.
- 1237. T. occidentalis, fuscus, antennis lunulatis, abdomine lineis tribus fulvis, pedibus anticis nigris macula albida, reliquis antennisque fulvis. T. 6. p. 228. t. 30. f. 3.
- T. occidentalis. L. S. N. p. 1001.
- 1238. T. fervens, capite antennisque lunulatis flavis thorace fusco lateribus flavo, abdomine flavo: apice alisque fuscis. T. 6. p. 228. t. 30. f. 4.
- T. fervens. L. S. N. p. 1000.
- 1239. T. exaestuans, fuscus, antennis lunulatis, thorace griseo, abdomine lineis transversis griseis, tibiis albis apice nigris, alis hyalinis. T. 6. p. 229. t. 30. f. 5.
- T. exaestuans. L. S. N. p. 1000.
- latis, oculis flavo-aureis, pedibus viridibus, alis virescentibus: punctis costarum fuscis. T. 6. p. 230. t. 30. f. 6.
- T. mexicanus. L. S. N. p. 1000.



Fam. 2.


- 1241. T. pluvialis, antennis fubulatis, oculis viridibus: fasciis quinis undulatis purpureis, corpore susco cinereo, alis susco-maculatis. T. 6. p. 223. t. 13. f. 1. 2.
- T. pluvialis. L. S. N. p. 1001.
- 1242. T. coecutiens, antennis subulatis, oculis aureis purpureo-punctatis, abdomine maculis trigonis slavis, alis maculis tribus suscis.

 T. 6. p. 224. t. 13. f. 3 5.
- T. coecutiens. L. S. N. p. 1001.
- 1.243. T. variegatus, flavo-testaceus, antennis subulatis, thorace abdomineque fasciis longitudinalibus suscis, alis susco fasciatis. T. 6. p. 230. t. 30. f. 7. 8.

74. ASILVS.

Fam. 1.

- 1244. A. Bombilius, hirfutus niger, antennis muticis, abdomine postice albido-griseo, capite villis griseis. T. 6. p. 238. t. 13. f. 6—8.
- A. gibbofus. L. S. N. p. 1007.
- 1245. A. dorsalis, hirsutus niger, antennis muticis, thorace postice villis viridi-flavis. T. 6. p. 239. t. 13: f. 9.
- 1246. A. flavus, hirfutus niger, antennis muticis, thorace villis albidis, abdomine ovato villis flavo-rufis splendentibus. T. 6. p. 240. t. 13. f. 10 13.
- A. flavus. L. S. N. p. 1007.
- 1247. A. rufus, hiríutus niger, antennis muticis, alis nigricantibus, abdomine supra villis



rusis splendentibus. T. 6. p. 241. t. 13. f. 15 — 18.

A. gilvus. L. S. N. p. 1007.

1248. A. marginatus, fubhirfutus niger, antennis muticis, alis fuscis, halteribus flavis, abdominis incisuris villoso-flavescentibus. T. 6. p. 242. t. 14. f. 1.

A. marginatus. L. S. N. p. 1008.

1249. A. rusipes, niger glaber nitidus, antennis muticis, fronte alba, halteribus slavis, pedibus quatuor anticis fulvis. T. 6. p. 243. t. 14. f. 2.

Fans. 2.

1250. A. crabroniformis, fubhirfutus, antennis fetigeris, abdomine antice nigro, postice flavo-fulvo. T. 6. p. 244. t. 74. f. 3.

A. crabroniformis. L. S. N. p. 1007.

1251. A. cinereus, subhirsutus, griseo-fusco-nigricans, antennis setigeris, thorace fascia longitudinali nigra, pedibus suscis, abdomine elongato cylindrico. T. 6. p. 246. t. 14. f. 5 — 9.

B.:americanus. T. 6, p. 248. t. 14. f. 16, 11.

A. forcipatus. L. S. N. p. 1008.

1252. A. niger, subhirsutus, niger, antennis setigeris, tibiis halteribusque rusis. T. 6. p. 249. t. 14-f. 12.

1253. A. cylindricus, glaber, niger, antennis setigeris, abdomine elongato cylindrico, apice clavato, pedibus flavis, alis corpore brevioribus. T. 6. p. 249. t. 14. f. 13.

A. Oelandicus. L. S. N. p. 1008.

75. EMPIS.

longitudinalibus nigris, pedibus rufis, alis hyalinis. T. 6. p. 254. t. 14. f. 14 — 16.

E. livida. L. S. N. p. 1003.

1255. E. borealis, nigra, alis maximis ovatis obficure fuscis, pedibus rusis nigrisque. T. 6. p. 255. t. 14. f. 17 — 19.

E. borealis. L. S. N. p. 1003.

76. CONOPS.

1256. C. quadrifasciata, nigra, atennnis nigris, abdomine fasciis quatuor transversis apiceque slavis, pedibus russ. T. 6. p. 261. t. 15. f. 1 — 6.

C. aculeata. L. S. N. p. 1005.

1257. C. trifasciata, nigra, antennis nigris, abdomine fasciis tribus transversis flavis, pedbus slavis nigrisque, alis margine fuscis.

T. 6. p. 262. t. 15. f. 7. 8.

ferrugineis, abdomine fasciis fuscis flavisque, alis susco-maculatis. T. 6. p. 264.


C. macrocephala. L. S. N. p. 1005.

busque ferrugineis, abdomine antice petiolata, alis dimidiato fuscis. T. 6. p. 265.

77. BOMBYLIVS.

1260. B. variegatus, niger, villis griseis, alis dimidiato-fuscis et hyalinis. T. 6. p. 268. t. 15. f. 10. 11.

B, ma-



- B. major. L. S. N. p. 1009.
- punctatis, niger, villis fulvis, alis fuscopunctatis. T. 6. p. 269. t. 15. f. 12.
- B. medius. L. S. N. p. 1009.
- 1262. B. tabaniformis griseus, griseo-niger, fronte conica grisea, rostro longitudine corporis, abdomine fasciis griseis. T. 6. p. 270. t. 30. f. 9. 10.
- Tabanus rostratus. L. S. N. p. 999.
- 1263. B. tabaniformis rufus, fronte conica grisea, rostro longitudine thoraçis, abdomine rufo: fasciis binis albis apiceque nigro. T. 6. d. 272. t. 30. f. 11.
- Tabanus barbatus. L. S. N. p. 999.
- 78. HIPPOBOSCA.
- bus simplicibus. T. 6. p. 275. t. 16. f. s
- H. equina. L. S. N. p. 1010.
- 1265. H. avicularis, viridis, alis magnis hyalinis, unguibus appendiculatis. T. 6. p. 285. t. 16. f. 21 27.
- H. avicularis. L. S. N. p. 1010.
- 79. OESTRVS.
- 1266. Oë. intestinalis, fulvo-griseus, thorace fascia transversa nigra, alis maculatis, pedibus sulvis. T. 6. p. 292. t. 15. f. 13 21. et 23.
- OE. Bovis. L. S. N. p. 969.

antice posticeque villis griseis apiceque slavo fulvis. T. 6. p. 297. t. 15. f. 22.

Oë haemorrhoidalis. L. S. N. p. 970.

80. CVLEX.


1268. C. communis, nigro-fuscus, abdomine annulis cinereis. T. 6. p. 316. t. 17. f. 1 — 7.

C. pipiens. L. S. N. p. 1002.

81. TIPVLA.

Fam. 1.

- 1269. T. pratensis, griseo-susca, antennis filisormibus, alis pallide suscis immaculatis: costa marginali susca. T. 6. p. 339. t. 18. £ 12 18.
- 1270. T. rivosa, griseo-fusca carneo mixta, antennis setaceis brevioribus, alis albis: rivulis longitudinalibus suscis. T. 6. p. 340. t. 19. f. 1.
- bus, alis pallide fuscis: puncto fusco fasciaque obliqua alba. T. 6. p. 341.
- T. lunata. L. S. N. p. 972.
- 1272. T. fulvipennis, grisea, antennis filiformibus, abdomine subtus thoracisque lateribus slavo-fulvis, alis sulvis medio puncto nigro. T. 6. p. 343.
- ta, antennis filiformibus, pedibus rufis, femori-



moribus maculis binis nigris, alis fuscomaculatis. T. 6. p. 344.

- T. quadrimaculata. L. S. N. p. 971.
- bus rufis, alis fusco-alboque maculatis. T. 76. p. 344.
- T. hortorum. L. S. N. p. 971.
- bus nigris, abdominis fegmentis flavo-marginatis, alis fusco-alboque maculatis. T. 6. p. 345.
- thorace abdominisque lateribus luteo-maculatis, alis puncto venisque latis fuscis.
 T. 6, p. 346.
- T. variegata. L. S. N. p. 971.
- pite thoraceque citreo-nigro-maculato, abdomine flavo-testaceo: lineis nigro-punctatis. T. 6. p. 347. t. 19. f. 2 9.
- T. cornicina. L. S. N. p. 972.
- 1278. T. flavo fasciata, aterrima, abdomine fasciis transversis flavis, antennis filiformibus, pedibus punctisque alarum fuscis. T. 6. p. 349.
- T. crocata. L. S. N. p. 971;
- 1279. T. ichncumonea, atra, antennis filiformibus, abdömine antice pedibusque rufis, alis puncto nigro. T. 6. p. 350. t. 19. f. 10

T. atra-

- T. atrata. L. S. N. p. 972.
- 1280. T. replicata, fusca, antennis filiformibus, alis pallide fuscis: margine tenuiore recurvato. T. 6. p. 351. t. 20. f. 1 16.
- T. replicata. L. S. N. p. 973.
 - 1281. T. biemalis, nigro-fusca, antennis longis setaceis, alis amplissimis, pedibus longissimis. T. 6. p. 360. t. 21. f 1 5.
 - 1282. T. fungorum, rufo-fusca, antennis filiformibus simplicibus, abdomine ovato, coxis longissimis, tibiis spinosis. T. 6. p. 361. t. 22. f. 1 — 13.
 - 1283. T. Agarici seticornis, nigra, antennis filiformibus simplicibus, thorace ruso, pedibus flavis, coxis longissimis tibiis spinosis. T. 6. p. 367. t. 21. f. 6 13.
 - maris plumosis, abdomine pedibusque grifeis, costis alarum hirtis. T. 6. p. 372.t. 23. f. 3 12.
 - mosis, abdomine viridi apice nigro, alis hyalinis, pedibus griseis nigro-maculatis.


 T. 6. p. 378. t. 19. f. 12. 13.
 - bus: maris plumosis, abdomine fasciis nigris, alis hyalinis puncto nigro. T. 6. p. 379. t. 19. f. 14. 15.
 - T. plumofa. L. S. N. p. 974.

- plicibus, costis alarum villosis. T. 6. p. 380. t. 24. f. 1—14.
- 1288. T. crystallina, griseo-cinerea, antennis siliformibus: maris plumatis, corpore villoso, thoracis lateribus fascia pallide grisea. T. 6. p. 386.
- bus: maris plumatis, alis albis abdomine brevioribus: puncto nigro, pedibus anticis longioribus. T. 6. p. 387.
- naris plumatis, alis niveis totis. T. 6. p. 388. t. 22. f. 14 20. t. 23. f. 1. 2.
- 1291. T. clavata maculata, cinerea nigro-maculata, antennis clavatis: maris plumatis, alis albidis: maculis pallide nigris. T. 6. p. 394. t. 24. f. 15 19.

.. Fan. 2.

- natis, capite thoraceque supra nigris, abdomine maculis nigris, alis puncto susce.

 T. 6. p. 400. t. 25. f. 1 6.
- T. pectinicornis. L. S. N. p. 970.
 - dominis lateribus, pedibusque flavis, alis maculis duabus fuscis. T. 6, p. 402.
 - T. bimaculata. L. S. N. p. 972.




Fam. 3.

- ovatis hirsutis: costis tribus. T. 6. p. 404. t. 25. f. 7 21.
- T. juniperina. L. S. N. p. 977.
 - β. T. 6. p. 412. t. 26. f. 1 7. an varietas?
- 1295. T. Pini, nigro-fusca, antennis longis villoss nodosis, collari rubro, pedibus argenteis, alis ovatis hirsutis: costis tribus. T. 6. p. 417. t. 26. f. 8 19.
- 1296. T. Loti, nigra, antennis longis nodosis, alis ovatis hirsutis: costis tribus. T. 6. p. 420. t. 27. f. 1 5.
- nis nodosis, alis deslexis ovato-lanceolats hirsutissimis ciliatis immaculatis. T. 6.p. 422. t. 27. f. 6 9.
- T. Phalaenoides. L. S. N. p. 977.
- 1298. T. birta, hirfutissima nigro-cinerea, antennis nodosis, alis dessexis ovatis hirfutissimis ciliatis nigro-maculatis. T. 6. p. 424. t. 27. f. 10. 11.
- T. hirta. L. S. N. p. 977.
- antennis longis filiformibus nodofis. T. 7. p. 602. t. 44. f. 27. 28.

Fam. 4.

1300. T. Iobannis, atra, antennis brevibus fubulatis, pedibus foeminae rufis, alis puncto ni-



gro, tibiis anticis spina terminatis. p. 425. t. 27. f. 12 - 20.

T. Iohannis. L. S. N. p. 976.

1301. T. Marci nigra, atra tota, antennis brevibus fubulatis, alis margine exteriore nigris, tibiis anticis spina terminatis. p. 428.

T. Marci. L. S. N. p. 976.

1302. T. Marci futvipes, nigra, antennis brevibus fubulatis, femoribus rufis, alis albis, tibiis anticis spina terminatis, p. 429.

1303. T. flavicaudis, nigra, antennis brevibus subulatis; abdomine foeminae flavo, alis obfcuris, tibiis anticis spina terminatis. 6. p. 429.

T. brevicornis. L. S. N. p. 976.

1304. T. latringrum, nigra, antennis brevibus fubulatis, abdomine ovato, alis albis: costis duabus nigris, tibiis muticis. T. 6, p.

430. t. 28. f. I - 4.

1205. T. erythrocephala, nigra cinereo-albido-maculata, antennis brevibus fubulatis, corpore brevi, capite magno rubro. T. 6. p. 431. t. 28. f. 5. 6.

82; Coccvs.

1306. C. ovatus Ulmi, ovatus, albus fusco transverse striatus, Ulmi. T. 6. p. 436. t. 28. t. 7 --- 12.

N 3

C. Ul-

C. Ulmi eampestris. L. S. N. p. 740.

1307. C. rotundus Salicis, subrotundus, fuscus, linea dorsali nigra, Salicis. T. 6. p. 440. t. 28.
f. 13 --- 15.

C. Capreae. L. S. N. p. 741.

1308. C. farinosus Alni, ovatus, tomentosus, pallide fuscus, albo-farinosus, Alni. T. 6. p. 442. t. 28. f. 16 — 22.

1309. C. Galli, Calli coccinelliferi. T. 6. p. 447. t. 30. f. 12 — 18.

C. Cacti. L. S. N. p. 742.

1310. C. floccosus, testaceus, tomentosus, lamellis candidis margine imbricatis. T. 7, p. 604. t. 44, f. 26.

83. PVLEX.

1311. P. vulgaris, fusco-castaneus nitidus, probofeide corpore breviore. T. 7. p. 8. t. 1. f. 1 — 5.

P. irritans. L. S. N. p. 1021.

84. LEPISMA.

lindrico fquamofo, abdomine apice fetis tribus. T. 7. p. 14.

L. faccharina, L. S. N. p. 1012.

35, Po-



85. Podvra.

Fam. 1.

- 1313. P. arborea nigra, oblonga, nigra, antennis quatuor-nodiis, pedibus furcaque pallide fufcis. T. 7. p. 18. t. 2. f. 1 7.
- P. arborea. L. S. N. p. 1014.
- 13.14. P. arbores grifes, oblongs, grifeo-cineres... fignaturis nigris, antennis longis quatuornodiis. T. 7. p. 21. t. 2. f. 8 10.
- P. nivalis. L. S. N. p. 1013.
- 1315. P. aquatica nigra, aquatica, tota nigra, antennis quatuor-nodiis. T. 7. p. 23. t. 2. f.

 11 17.
- P. aquatica. L. S. N. p. 1014.
- 1316. P. aquatica grifea, aquatica, grifea, lineis dorfalibus nigris, antennis quatuor-nodiis.
 T. 7. p. 28. t. 2. f. 18 21.
- plumbeo nitido, antennis quatuor-nodiis, capite pedibusque grifeis. T. 7. p. 31. t. 3. f. 1 4.
- 1318. P. ambulatoria, terrestris nivea, antennis quatuor-nodiis, cauda bisida brevi extensa. T. 7. p. 33. t. 3. f. 5. 6.
- P. ambulatoria. L. S. N. p. 1041.

Fam. 2.

tennis longis fractis: articulis plurimis. T. 7. p. 35. t. 3. f. 7—14.

P. atra. L. S. N. p 1013,

86. TERMES.

1320, T. lignarium, albidum, oculis maculisque abdominalibus rufis. T. 7. p. 41. t. 4. f. I.


T. pulfatorium. L.S. N. p. 2015.

β. T. 7. p. 43, t. 4. f. 2,

2. T. 7. p. 44. t. 4. f. 3. 4.

- Obs. Var. y. alarum rudimenta gerere videtur, forte diversa species. Hymenopteris propinquum genus.
- 1321. T. capense, lasteum, antennis filiformibus, dentibus porrestis nigris, interdum alatum: alis diaphanis fusco-marginatis. T. 7. p. 47. t. 38: f. 1 4.
- Obs. Conf. Perlam fuscam et nasutam, Generosissimique Auctoris de illis sententiam. T. 7. p. 50.
- 1322. T. destructor, albidum, capite luteo, antennis filiformibus, alternis maxillis longitudine antennarum. T. 7. p. 50, t. 37. f. 1 8.
- T. fatale. L. S. N. p. 1015.

100



87. PEDIEVLVS.

- 1323. P. bumanus. T. 7. p. 62. t. 1. f. 6 10.
 - a. capitis, cinereus, thorace abdomineque far fcia interrupta nigra marginatis. T. 7. p. 67. t. 1. f. 6.
 - B. corporis, albidus totus immaculatus. T, 7, p. 67. t. 1. f. 7.
- P. humanus. L. S. N. p. 1061.
- abdomine tuberculis decem conicis marginalibus. T. 7. p. 68. t. 1. f. 11. 12.

28. RICINVS.

- longo margine nigro, capite magno: corniculis duobus obtufis flexibilibus. T. 7. p. 71. t. 4. f. 5 8.
- 1326. R. Emberizae, pallide fuscus, abdomine albefcente: maculis lateralibus fuscis, capite magno triangulari. T. 7. p. 74. t. 4. f. 9. 10.
 - B. T. 7, p. 79. t. 4. f. 14.
- 1327. R. Cornicis, albidus, fasciis dorsalibus transversis suscis, antennis brevissimis ad apicem capitis. T. 7. p. 76. t. 4. f. 11.
- P. Corvi Cornicis. L. S. N. p. 1018.
- 1328. R. Lari, grifeo albidus, oculis maeulisque capitis nigris, pedibus crassioribus. T. 7, p. 77. t. 4. f. 12.

Ng

P. Ster-

- P. Sternae Hirundinis. L. S. N. p. 1019.
- 1329. R. Mergi serrati, albidus, capite flavescente, corpore elongato. T. 7. p. 78. t. 4. f. 13.
- pite semiorbiculato: postice setis quatuor longioribus. T. 7. p. 79. t. 1. f. 15.
- 1331. R. Canis, capite angulato flavescente fuscopunctato, abdomine ovato albido marginibus serrato, thorace brevissimo. T. 7. ps 81. t. 4. f. 16.

gg. ACARVS.

Fam, I.

- 1332. A. domesticus, albus, maculis binis fuscis, corpore ovato medio coarctato: pilis lor gissimis, pedibus aequalibus. T. 7. p. 89, t. 5. f. 1 11.
- Obs. Hunc et binos sequentes sub A. Sirone comprehendit Ill. à Linné.

Fam. 2.

- 1333. A. Scabiei, fubrotundus, albus, pedibus rufescentibus brevibus: posticis quatuor seta longissima, plantis quatuor anticis sistulatis capitulo terminatis. T. 7. p. 94. t. 5. f. 12 14.
- A. exulcerans. L. S. N. p. 1024?
- 1334. A. farinae, oblongus, albus, capite rufefcente, pedibus conicis crassioribus aequalibus. T. 7. p. 97. t. 5. f. 15.

1335.

- que fuscis, violaceo-niger, capite pedibusque fuscis, corpore globoso-ovato. T. 7. p. 98. t. 5. f. 16 19.
- A. Ricinus. L. S. N. p. 1023.
- 1336. A. Reduvius, obovatus planus, corpore antice clypeo nigro rotundo, pedibus nigris.

 T. 7. p. 101. t. 6. f. 1 8.
- A. Reduvius. L. S. N. p. 1022.
- fali alba, geniculis pedum albidis. T. 7. p. 153. t. 37. f. 9 13.
- A. Americanus. L. S. N. p. 1028.
- #338. A. Rhinocerotis, fubrotundus planus, fuscus, maculis testaceis fusco-punctatis. T. 7. p. 160. t. 38. f. 5. 6.
- punctisque nigris, abdomine rufo. T. 7. p. 162. t. 38. f. 7.

Fain. 3.

- 1340. A. avicularum, elongatus, albus, abdomine fetis quatuor longissimis, pedibus quatuor posticis remotis. T. 7. p. 107. t. 6. f. 9
- 1341. A. Passerinus, pedibus tertii paris magnis et crasissimis. T.7. p. 109. t. 6. f. 12.
- A. Passerinus. L. S. N. p. 1023.
- 1342. A. Gallinae, ovatus, laevis, grifeus violaceomar-

marginatus, pedibus anticis longioribus. T. 7. p. 111. t. 6. f. 13. 14.

Fam. 4.

- 1343: A. Fucorum, pallide fuscus flavescens, macula dorsali triangulari obscura, pedibus anticis longioribus. T. 7. p. 112. t. 6. f. 15. 16.
- A. coleoptratorum, L. S. N. p. 1026,
- 1344. A. Muscarum, abdomine ruso, pedibus posticis longissimis filiformibus. T. 7. p. 114. t. 7. f. 1 — 3.
- A. Muscarum. L. S. N. p. 1025.
- 1345. A. squamosus, rubicundus, corpore pedibusque, squamis albidis techis. T. 7. p. 116. t. 7. f. 4.
- 1346. A. Phalangii, ovatus ruber, rostro porresto, pedibus longioribus. T. 7. p. 117. t. 7. f. 5. 6.
- 1347. A. parasiticus, oblongus ruber, rostro brevissimo sub capite pedibusque brevioribus, T. 7. p. 118. t. 7. f. 7. 8.
- 1348. A. Libellalae, globofus ruber, pedibus brevissimis, stigmate dorsali concavo. T. 7, p. 119. t. 7, f. 9—11.
- A. gymnopterorum. L. S. N. p. 1026.
- 1349. A. Culicis, globofus ruber, capite porrecto lateribus inflato, pedibus longioribus. T. 7. p. 120. t. 7. f. 12.

- 1350. A. Aphidis, ovatus ruber, oculis nigris, pedibus anticis extremo clavatis. T. 7. p. 122. t. 7. f. 13. 14.
- ovato supra convexo, subtus plano. T. 7.
 p. 123. t. 7. f. 15 19.
- A. vegetans. L. S. N. Tom. 3. p. 226.

Pam, 5.

- 1352. A. telarius, oblongus, albo-virescens seu flavescens, pedibus omnibus aequalibus. T. 7. p. 128. t. 7. f. 20 24.
- A. telarius. L. S. N. p. 1023.
- 1353. A. corticalis, fubrotundus, crustaceus, nitidus, pedibus pallide fuscis. T. 7. p. 131. t. 8. f. 1 4.
 - B. T. 7. p. 133. t. 8. f. 5.
- 1354. A. marginatus, ovatus, crustaceus, fusco-caftaneus nitidus, corporis lateribus margine plano-angulato. T. 7. p. 133. t. 8. f. 6.
- A. coleoptratus. L. S. N. p. 1023.

Fam. 6.

- 1355. A. Phalangoides, ovatus, obscure ruber, macula dorsali oblonga flavo-aurantia, pedibus longissimis. T. 7. p. 134. t. 8. f. 7
- 1356. A. bolofericeus, terrestris, ruber, ovatus depressus rugose-tomentosus, pedibus po-

flicis remotis. T. 7. p. 136. t. 8. f. 12.

A. holosericeus. L. S. N. p. 1025.

Fam. 7.

- 1357. A. caudatus, aquaticus, subrotundus, suscessivas, abdomine caudato cylindrico. T. 7. p. 139. t. 9. f. 1. 2.
- 1358. A. aquaticus ruber, aquaticus, ruber, corpore fubgloboso, tentaculis longis, pedibus approximatis. T. 7. p. 141. t. 9. f. 4—6.
 - β. T. 7. p. 144. t. 9. f. 7 10. an?
- A. aquaticus L. S. N. p. 1025.
- 1359. A. aquaticus globosus, aquaticus, rubro-sus, corpore globoso, tentaculis brevioribus, pedibus rubris, approximatis. T. 7. p. 146. t. 9. f. 11. 12.
- 1360. A. aquaticus maculatus, aquaticus, fuscus macula rubra, corpore globoso, tentaculis brevioribus crassis, pedibus viridi- griseis approximatis. T. 7. p. 147. t. 9. f. 13. 14.
- ovatus depressus, rugosus, capite conico producto, pedibus posticis remotis. T. 7. p. 149. t. 9. f. 15 20.
- 1362. A. aquaticus marginatus, aquaticus, subrotundus crustaceus niger, pedibus rusis, corporis lateribus marginatis. T. 7. p. 152. t. 11. f. 1.

50. PHALANGIVM.

1363. Ph. parietinum, corpore ovato, supra griseofusco, subtus albido, pedibus maculatis. T. 7. p. 166. t. 10. f. 1—14.

Ph. Opilio. L. S. N. p. 1027.

1364. Ph. cornutum, corpore ovato, supra griseofusco fascia nigra, subtus albo, tentaculis
longissimis, chelis cornutis. T, 7. p. 173.
t. 10, f. 12 — 15.

Ph. cornutum. L. S. N. p. 1028.

91. ARANEA.

Fam. 1.

1365. A. crucigera, retiaria, abdomine subgloboso fusco seu ruso: tuberculis duobus, cruce dorsali triplici albo-punctata. T. 7. p. 218. t. 11. f. 3 — 8.

A. Diadema. 'L. S. N. p. 1030.

1366. A. angulata, retiaria, abdomine ovato nigro: fupra tuberculis binis magnis conicis. T. 7. p. 221. t. 12. f. 1 — 15.

A. angulata. L. S. N. p. 1031.

1367. A. aurantio-maculata, retiaria, abdomine globoso flavo: venis fuscis maculisque aurantiis magnis foliaceis repadnis. T. 7. p. 222. t. 12. f. 16. 17.

boso virescente s. ruso, dorso maculis quatuor tuor magnis plurimisque minoribus niveis. T. 7. p. 223. t. 12. f. 18.

- 1369. A. cicatricosa, retiaria, abdomine globoso nigro-sasco punctis griseis, dorso maculis excavatis griseis. T. 7. p. 226. t. 12. f. 19.
- 1370. A. tuberculata, retiaria, abdomine fusco: nigro-alboque variegato, tuberculis binis dorsalibus convexis, T. 7. p. 226. t. 13. f. 1 — 15.
- abdomine postice conico: maculis binis laciniatis suscis. T. 7. p. 231. t. 13. f. 16
 - 1372. A. viridis punctata, retiaria, abdomine subgloboso viridi: punctis aliquot nigris, postice macula rusa. T. 7. p. 233. t. 141. 1 — 3.
 - A. cucurbitina. L. S. N. p. 1030.
 - 1373. A. fusca, retiaria, fusca maculis nebulosonigris, abdomine ovato, pedibus longissimis maculatis. T. 7. p. 235. t. 11. f. 9—12.
 - 1374. A. extensa, retiaria, abdomine elongato grifeo-fusco, pedibus longitudinaliter extensis.
 T. 7. p. 236. t. 19. f. 1.
- A. extensa. L. S. N. p. 1033.
- 1375. A. fasciculata, retiaria, abdomine oblongo untice gibbo, thoracis medio spinis duabus ereclis



erectis nigris, tibiis extremitate villosis. T. 7. p. 316. t. 39. f. 1 — 4.

clavipes. L. S. N. p. 1034.

- mine supra grisco: tuberculis lateralibus mollibus, subtus susca: fascia transversa albida. T. 7. p. 318. t. 39. f. 5.
- 77. A. triangulari-spinosa, retiaria, abdomine triangulari: spinis octonis, binis anticis horizontalibus, posticis duabus magnis divergentibus. T. 7. p. 321. t. 39. f. 9. 10.
- 78. A. elongato-spinosa, retiaria, abdomine oblongo supra rugoso: spinis octonis magnis, anticis sex erectis, posticis binis patentibus divergentibus. T. 7. p. 323. t. 39. f. 11. 12.

Fam. 2.

79. A. coronata, textoria, abdomine oblongoovato albo: annulo dorfali rubro. T. 7. p. 242. t. 14. f. 4 — 12.

redimita. L. S. N. p. 1032.


- 80. A. refupina sylvestris, textoria, abdomine ovato: maculis fasciisque angulatis suscisalbisque, pedibus immaculatis. T. 7. p. 245. t. 14. f. 13 22.
- 81. A. resupina domestica, textoria, abdomine ovato: maculis lateralibus flavo-albidis, pedibus nigro-maculatis. T. 7. p. 251.

montana. L. S. N. p. 1032.

- 1382. A. viridissima, textoria, viridis, abdomine oblongo flavescente. T. 7. p. 252. t. 18. f. 6 16.
- 1383. A. atrox, textoria, abdomine ovato fusco: fupra macula nigra oblonga flavedine cincta. T. 7. p. 253. t. 14. f. 24. 25.
- 1384. A. punctata, textoria, nigro-fusca nitida, abdomine globoso: punctis excavatis anterius sascia grisea. T. 7. p. 255. t. 15. f. 1.
- A. bipunctata. L. S. N. p. 1031.
- 1385. A. albo-maculata, textoria, nigro-fusca, abdomine globoso: fascia angulata maculique octo albis. T. 7. p. 257. t. 15. f. 2
- 1386. A. fenoculata, textoria, abdomine ovato-oblongo grifeo: fascia longitudinali laciniosa fusca, thorace susce. T. 7. p. 258. 4.15. f. 4 10.
- A. fenoculata. L. S. N. p. 1034.

Fam. 3.


- 1387. A. domestica, vestiaria, griseo-fusca, abdomine ovato tomentoso: maculis nigris marmorato. T. 7. p. 2646 t. 15. f. 11. 12.
- A. domestica. L. S. N. p. 1031.
- 1388. A. holosericea, vestiaria, griseo-murinà, abdomine ovato-oblongo villoso: bass subtus maculis binis flavescentibus. T. 7. p. 266. t. 15. f. 13 16.
- A, holosericea. L. S. N. p. 1034.



- 19. A. avicularia, vestiaria, hirsutissima, nigrofusca s. rusescens, plantis amplis tomentosis. T. 7. p. 313. t. 38. f. 8 — 10.
- avicularia. L. S. N. p. 1034.
- ovato flavo-grifeo: cinereo-nebuloso, pedibus maculatis, T. 7. p. 319. t. 39. f. 6. 7.

7am. 4.

- grifeo-fusco: fasciata, abdomine elongato grifeo-fusco: fascia longitudinali undata rufa, pedibus longissimis. T. 7. p. 269. t. 16. f. 1 8.
- 12. A. (lupus) littoralis, abdomine ovato nigro pedibusque grifeo-maculatis. T. 7. p. 274. t. 15. f. 17 — 24.
- 13. A. (lupus) paludosa, corpore oblongo fusco, thorace abdomineque fascia utrinque laterali alba, pedibus susciss. T. 7. p. 278. t. 16. f. 9 12.
- fimbriata. L. S. N. p. 1033
- 34. A. (lupus) marginata, corpore oblongo fusco, pedibus viridibus thorace abdomineque fascia utrinque laterali alba. T. 7. p. 281. t. 16. f. 13 15.
- 75. A. (lupus) ruricola, corpore ovato grifeo-fusco obscuro, thorace abdomineque antice fascia longitudinali rusescente. T. 7. p. 282.
 t. 17. f. 1. 2. t. 11. f. 13. 14.



Fam. 5.

- *396. A. (phalangium) Pini, grifeo-nigra, abdomine punctis duobus albis, pedibus fuscis nigro-maculatis. T. 7. p. 285. t. 17. f. 3 7.
- T397. A. (phelangium) albe-fasciata, nigra, abdomine oblongo: fasciis tribus albis transversis semicircularibus. T. 7. p. 287. t. 17. f. 8—10.
- A. fcenica. L. S. N. p. 1035,
- 1398. A. (phalangium) grossipes, nigra, capite antice lineis transversis albidis pilosis, pedibus anticis crassioribus. T. 7. p. 290. t. 17. f. 11 14.
- gno nigro: abdomine oblongo rufo: falciio nigris maculisque binis albis. T. 7. p. 293. t. 18. f. 1 5.
- 1400. A. (phalangium) undata, nigro-fusca, thorace margine griseo, abdomine oblongo: fascia lata longitudinali undata cinerea, pedibus anticis crassioribus. T. 7. p. 320. t. 39. f. 8.

Fam. 6.

- 1401. A. (cancroides) cierea, lutea, abdomine subrotundo plano: fascia utrinque rubra, pedibus quatuor posticis brevissimis. T. 7. p. 298. t. 18. f. 17 — 22.
- 1402. A. (cancroides) fusco-marginato, grifea s. fufca, abdomine ovato plano: fascia laterali nigro-

nigro-fusca lineaque albida. T. 7. p. 301. t. 18. f. 23. 24.

A. viatica. L. S. N. p. 1036.

1403. A. (cancroides) tigrina, abdomine obtuso plano albido: maculis nigris, pedibus quatuor posticis brevioribus. T. 7. p. 302. t. 18. f. 25.

A. laevipes. L. S. N. p. 1037.

Fdm. 7.

1404. A. aquatica, nigra f. nigro-fusca. T. 7. p. 303. t. 19. f. 5 — 13.

A. aquatica. L. S. N. p. 1036.

92. SCORPIO.

Fam. I.

1405. S. maurus, fenoculus, pectinibus octo-dentatis, manibus ovatis, cauda corpore breviore: aculeo simplici. T. 7. p. 337. t. 40. f. 1 — 8.

S. maurus. L. S. N. p. 1037.

1406. S. flavicaudis, senoculus, pectinibus novemdentatis, manibus ovatis angulatis striatopunctatis, cauda longitudine corporis, aculeo simplici pedibusque slavis. T. 7. p. 339. t. 40. f. 11 — 13.

Fam. 2.

1407. S. indus, octonoculus, pectinibus tredecimdentatis, manibus ovatis seabris, cauda O 3 corcorporis fere longitudine, aculeo simplici. T. 7. p. 341.

- S. afer. L. S. N. p. 1038.
- 1408. S. punclatus, octonoculus, pectinibus sedecim-dentatis, manibus elongatis: digitis filiformibus, cauda corporis longitudine: aculeo basi mucronato. T. 7. p. 343. t. 41. f. 1 — 4.
- 1409. S. europaeus, octonoculus, fuscus, pectinibus octodecim-dentatis, manibus elongatis: digitis filiformibus, cauda corpore longiore: aculeo basi mucronato. T. 7. p. 344, t. 41. s. 5.—8.
- **S.** europaeus. L. S. N. p. 1038.
- 1410. S. maculatus, octonoculus, fusco-maculatus, pectinibus octodecim-dentatis, brachiis manibusque longissimis subulatis: digitis sliformibus, cauda longissima: aculeo bas mucronato. T. 7. p. 346. t. 41. f. g. 10.
- S. americanus, L. S. N. p. 1038.
- 1411. S. teffaceus, octonoculus, teffaceo-flavus, pectinibus vigintiocto-dentatis, manibus oblongis: digitis filiformibus, cauda corpore longiore: aculeo fimplici. T. 7. p. 347. t. 41. f. 11.
- 8412. S. aufratis, octonoculus, fuscus, pedibus rusis, pectinibus triginta dentatis, manibus clongatis rusis: digitis siliformibus, cauda corpore longiore: aculeo basi mucronato. T. 7, p. 248. t. 41. f. 5.
- S. australis. L. S. N. p. 1038.

93. CHELIFER.

te, thorace chelisque obovatis fusco-castaneis. T. 7. p. 353. t. 42. f. 1 - 5.

Phalangium acaroides. L. S. N. p. 1028.

depresso, chelis elongatis. T. 7. p. 355. t. 19. f. 14. 15.

Phalangium cancroides. L. S. N. p. 1028.

94. ASTACVS.

Fam, 1.

1415. A. fluviatilis, thorace laevi, rostro supra dentato: basi utrinque dente unico, chelis maximis papilloso-scabris. T. 7. p. 365. t.

Cancer Astacus. L. S. N. p. 1051.

Fam. 2.

1416. A. strigosus, thorace depresso rugoso lateraliter aculeato, rostro acuto septemdentato, chelis spinosissimis, pedibus posticis filisormibus. T. 7. p. 393. t. 23. f. 1 — 4.


Cancer strigosus. L. S. N. p. 1052.

leato, chelis prismaticis elongatis: feriebus quaternis spinosis. T. 7. p. 398. t. 24.

Cancer norvegicus. L. S. N. p. 1053.

·O 🛦

Fam.



Fam. 3.

1418. A. Bernbardus, cauda molli recurvata, thorace laevi, pedibus chelisque muricatis scabris: dextra majore. T. 7. p. 405. t. 23. f. 5—13.

Cancer Bernhardus. L. S. N. p. 1049.

95. CANCER.

Fam. 1.

1419. C. ruricola, thorace laevi antice bidentato, pedibus depressis: articulis tribus ultimis spinosis: setis nigris. T. 7. p. 417. t. 25. f. 1 — 11. t. 26. f. 1 — 3.

C. ruricola. L. S. N. p. 1040.

- 1420. C. latipes, thorace orbiculato antice dentato: lateribus utrinque unispinoso, manibus ovatis muricatis, pedibus dilatato-foliaceis. T. 7. p. 425. t. 26. f. 4 7.
- vi, chela altera corpore majore, altera minima. T. 7. p. 430. t. 26. f. 12.

C. vocans. L. S. N. p. 1041.

Fam. 2.

1422. C. pelagicus, thorace lato utrinque unispinoso, lateribus utrinque octodentatis, fronte dentata, manibus elongatis multangulis, pedibus



dibus posticis dilatato-foliaceis. T. 7. p. 427. t. 26. f. 8 — 11.

C. pelagicus. L, S, N. p. 1042.

96. Monocylys.

Fam. 1.

1423. M. Pulex ramosus, brachiis dichotomis, cauda appendiculata inflexa, testa postice unispinosa. T. 7. p. 442. t. 27. f. 1—8.


M. Pulex. L. S. N. p. 1058.

- 1424. M. exspinosus, brachiis dichotomis, cauda fimplici inflexa, testa postice rotundata non spinosa. T. 7. p. 457. t. 27. f. 9 13. t. 28. f. 3 8.
- 1425. M. bispinosus, brachiis dichotomis, capite rostrato, cauda inflexa, testa postice bispinosa. T. 7. p. 463. t. 28. f. 3 8.
- 1426. M. Pediculus ramesus, brachiis dichotomis, cauda bisida rectiuscula exserta, pedibus nudis. T. 7. p. 467. t. 28. f. 9 13.
- M. Pediculus. L. S. N. p. 1058.
- 1427. M. elongatus, corpore elongato, brachiis dichotomis: fetis plurimis, cauda lateraliter exferta. T, 7. p. 470. t. 29. f. 1 — 4.

Fam. 2.

- testam. T. 7. p. 476. tr 29. f. 5 10.
- M. conchaceus. L. S. N. p. 1059.

Fam.



Fam. 3.

1429. M. quadricornis, cornubus quaternis mobilibus setaceis, corpore ovato, cauda longa recta cylindrica bisida. T. 7. p. 483. t. 29. f. 11. 12. t. 30. f. 1 — 9. Vorticella berberina p. 437.

M. quadricornis. L. S. N. p. 1058.

97. SQILLA.

1430. S. Afellus, aquatica, cauda rotundata: stylis binis bifurcis. T. 7. p. 496. t. 31. f. 1

Oniscus aquaticus. L. S. N. p. 1061.

1431. S. Entomon, marina, cauda longa subulata crustacea. T. 7. p. 514. t. 32. f. 1 — 10.

Oniscus Entomon. L. S. N. p. 1060.

1432. S. marina, corpore elongato femicylindrico, cauda oblonga aequali: apice truncata. T. 7. p. 523. t. 32. f. 11 — 14.


Oniscus marinus. L. S. N. p. 1060.

1433. S. Pulex, aquatica, corpore compresso, pedibus quatuor anticis chelatis, cauda setis sex bifurcis terminata. T. 7. p. 525. t. 33. f. 1 — 10.

Cancer Pulex. L. S. N. p. 1055.

1434. S. Mantis, marina, corpore elongato, thorace angulato, cauda lata depressa spinosa, pedibus anticis chelatis dentatis. T. 7. p. 533. t. 34. f. 1—10.

Can-



Cancer Mantis. L. S. N. p. 1654.

1435. S. Balaenae, corpore ovali depresso: fegmentis distinctis, pedibus cheliferis: tertii quartique paris linearibus muticis. T. 7. p. 541. t. 42. f. 6 — 10.

Oniscus Ceti. L. S. N. p. 1060.

98. ONISCVS.

1436, O. Armadillo. T. 7. p. 546. t. 35. f. 1. 2. L. S. N. p. 1062.

tus, cauda stylis duobus conicis articulatis.
T. 7. p. 547. t. 35. f. 3 — 10.

O. Afellus. L. S. N. p. 1061.

1438. O. convexus, ovalis convexus immaculatus, cauda stylis duobus conicis articulatis. T. 7. p. 553. t. 35. f. 11.

An praecedentis varietas?

99. Scolopendra.

1439. S. forcipata, rufo-fusca, pedibus utrinque quindecim. T. 7. p. 557. t. 35. f. 12—16.


S. forcipata. L. S. N. p. 1062.

1440. S. flava, flava, capite pedibusque utrinque LIV. rufis. T. 7. p. 561. t. 35. f. 17—20.

S. electrica. L. S. N. p. 1063.

1441. S. morsitans, pedibus utrinque XXI. posterioribus spinosis. T. 7. p. 563. t. 43. f. 1—5.


S. mor-



- S. morsitans. L. S. N. p. 1063.
- 1442. S. ferruginea, pedibus utrinque XXII. posterioribus longissimis bispinosis. T. 7. p. 568. t. 43. f. 6.
- S. ferruginea. L. S. N. p. 1063.

100. IVLVS.

- 1443. I. penicillatus, corpore oblongo: fasciculis squamosis, cauda penicillo albo, pedibus utrinque XII. T. 7. p. 572. t. 36. f. 1—8.
- Scolopendra lagura. L. S. N. p. 1062.
- tudinalibus rufis, pedibus utrinque C. 7. p. 578. t. 36. f. 9 22.
- 1. terrestris. L. S. N. p. 1065.
- XXXI, segmentis corporis clypeolis planius culis marginatis. T. 7. p. 586. t. 36. f. 23 26.
- I. complanatus. L. S. N. p. 1065.
- 1446. 1. indus, cylindricus, fuscus, pedibus russ utrinque CX. T. 7. p. 588. t. 43. f. 7 — 9.
- L indus. L. S. N. p. 1065.



• •

.

40.

.



.

.

•

.

,

Stern Code Code Code

